

中国古医籍整理丛书

伤寒金匱

29

国家中医药管理局

中医药古籍保护与利用能力建设项目

伤寒续论

清·张璐撰
付笑萍 李淑燕 校注



中国古籍整理丛书

伤寒续论

清·张璐 撰

付笑萍 李淑燕 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒续论/ (清) 张璐撰; 付笑萍, 李淑燕校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3027 - 8

I. ①伤… II. ①张… ②付… ③李… III. ①《伤寒论》—注释 IV. ①R222. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310975 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河市鑫金马印装有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710 × 1000 1/16 印张 16.25 字数 123 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3027 - 8

*

定价 49.00 元

网址 [www. cptcm. com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln. net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 [http://e. weibo. com/cptcm](http://e.weibo.com/cptcm)

淘宝天猫网址 [http://zgzyycbs. tmall. com](http://zgzyycbs.tmall.com)

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李昱 武东 李秀明 张成博

委员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡烈

(上海市) 张怀琼 季光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)

项目专家组

顾问	马继兴	张灿理	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				

前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识 and 人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之轴，城市尤甚。何哉？盖则西医铃声、光、电技术向于 20 世纪发展极速，中医则难见其进。二则国人惊羨西医之“立竿见影”，遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境：其若干医法正负效应相若，其或负远逾于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心一身非如中世纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已向中国医学之理念“靠拢”矣，虽彼未必知中国医学何如也。惟其不知中国医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中国之认识人体不为伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，当一须继承，一须创新。继承则必深研经典，微清流弊，复及纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，审问之，笃行之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以建成当代中医理论。欲达于斯境，或为百年计。予恐西医既已醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医西医深度融合，形成 21 世纪之新医学，届时“制高点”将在何方？吾人于此转折之机，能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，非指一习见之书、千古权威之作；就医界整体言之，所传所承自应当医籍之全部。盖后世名医所著，乃其秉诸前人所述，总结终生行医用药经验所得，自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可言传言承。虽前此 50 余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。嗣 20 载再兴整理、出版之潮，由所罕见之要籍千余部陆续问世，洋洋大观。

今复有“中医药古籍保护与利用能力建设”之工程，集九省市专家，历时五载，整理出版自唐迄清医籍，都400余种，凡中医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治、医案医话、推拿本草，俱涵盖之。

噫！璐既知此，能不胆其愧乎！是集刻印医籍，自古有之，然孰与今世之盛且精也！自今而后，中国医家及患者，得览医典，当自谓人海有归息之矣！中华民族之屡经灾难而奋起，乃今未来之永续，当担之也，自今以后已可不啻出转精手！典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬

目 序

中医学是中华民族在长期生产生活中实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学学术传承数千年来最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医学学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀民族文化的重要举措，不仅能够全面推动中医药的有效传承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

相信这项工作一定能够做好，嘉惠后世，福泽绵长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王陇德

二〇一四年十二月

马序

新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自1958年始，国务院先后成立了一届古籍整理出版规划小组，分别由齐世铭、李一氓、王希仲担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第二次规划中医药古籍整理即纳入其中。1982年9月，卫生部下发《1982—1990年中医古籍整理出版规划》，1983年1月，中医古籍整理出版办公室正式成立，保证了中医古籍整理出版规划的实施。2002年2月，《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。其后，又陆续制定了国家古籍整理出版“十五”和“十一五”重点规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一马行中古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过3000万

元，影印抢救濒危珍、贵、孤本中国古籍 1640 余种，并开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010 年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，这是继 1982—1986 年第一批、第二批重要中医古籍整理工程的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立前未出版过的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的一流完成，项目组特别成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版、印刷的审定工作。专家组中的许多成员虽逾古稀之年，但老当益壮，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新、言传身教，培养一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和研究机构建设，全面提升了我中医药古籍保护与利用能力。

作为项目组成员之一，我深感中医药古籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医药古籍整理不坠任重的意义。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中青一代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作的将来会越来越美好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月

校注说明

一、张璐及《伤寒缙论》

张璐（1617—1699），字路平，晚号石山老人，明末清初医家。张璐自少壮至老年行医60余年，勤奋不倦，积累了丰富的临床经验，一生著述甚多。其著《伤寒缙论》以论证《伤寒论》原文为主，具体例证基本皆袭喻昌《尚论篇》，从条文层次、病状、与方等多方面探讨《伤寒论》，综合各家之论，对各家之论多有同友说明，补前贤之未备，并参以己见。该书语言朴实无华，通俗易懂，为后世研究《伤寒论》提供了借鉴。

二、版本源流及底本、校本的选择

《伤寒缙论》一书传世版本较多。经考证主要有：清康熙六年丁未（1667）刻本、清康熙甲申刻本、清同治辛卯刻本，日本文化元年甲子（1804）思庵堂刻本亦由香港收。清光绪二十一年甲午（1894）上海图书集成书局借印本。清光绪二十一年丁未（1907）上海书局有印本。清抄本。1925年上海商务书局有印本、民国上海广益书局有印本等版本等。

本次校注以清康熙六年丁未（1667）刻本为底本（简称“底本”）。该本既系初刻，又系足本，版式尚严，文字清楚，内容完整，故作为此次校注的底本。以日本文化元年甲子（1804）思庵堂刻本为主校本（简称“文化本”）。在康熙本之旧量有很多刻本，但从内容、版式、字体等方面考察分析，这均只是康熙本的再版修订本，且书又漫漶，错误较多，而文化本以较完整且康熙本更有优势，错误较少，故用文化本为主校本。

本。以清康熙重刻本（此书目录见“校注后记”）、清同德堂刻本（简称“同德堂本”）、1925年上海锦章书局石印本（简称“锦章书局本”）等诸本为参校本。

三、校注的原则、体例及方法

1. 原书表示文字顺序的“左”“右”径改为“下”“上”；“丸”与“圆”为避讳字关系时，“圆”径改为“丸”；“已上”意即“以上”，均不再出注。

2. 原书段落较长的，根据内容重新分段，凡作者的按语均另起一行。

3. 原书多处“一内全”或其他因家之义，一般不出校注，但若影响理解文义者，则出注说明。

4. 为阅读方便，原书仲景之文用黑体；张璐之文用宋体。张璐所做的注音或注解，仍然保留，用仿宋。

5. 张璐等引《伤寒论》原文，一般不出注，或因因据版本不同，文字有所出入，故未出注。

6. 对原书疑难字同，笔略注释；生僻字、疑难字采用汉语拼音和直音相结合的方法注音。

7. 原书对文字异同，出注说明；异体字、古字（俗体字径改，原书作者注释中出现的异体字，如“𦵏、𦵏”等，予以保留）。对于不规范药名，如“黄耆”径改为“黄芪”等。

8. 原书卷上、卷下之首有“长归张璐路王论次，男吟诞先，仲飞等参订，自是李璋理愈较正”等语，今一并删去。

9. 原书表示“脏”“腑”之义的“藏”“府”未做改动。

10. 原书目录后另有正方目录，今并入目录正方下。

序 言

六月夏日炎炎，大地一片火，大地人也灼热，老少清凉不得，得一手方惠霞¹、王公岷²，俾手执笔，为路³先生作一序⁴。路⁵论子，因感与一衰年困心⁶，支床⁷起，奈时不理，有所抽发⁸。于是遂⁹，予王公岷先生作，又言去日本吴会¹⁰，论识路¹¹先生，何深行履¹²，修世¹³。与又读先生自序，知其二十年广求密搜，读方书¹⁴，多在杂图¹⁵，多岐¹⁶。罗，里¹⁷妙心！直可以与子¹⁸立言。天下之一家学术，名得实大，外合中离，且其作先传¹⁹，自传²⁰，自注²¹，果然。彼如医道及与水衣食，人所谓有其司²²者也，有而行²³。路²⁴理心²⁵十年十二成，摩²⁶得²⁷悟²⁸后言，此言实地，且于一切人无名求利，冥²⁹求己，以³⁰论³¹之方也。名大³²，³³成³⁴，传³⁵乘³⁶，本³⁷六³⁸，³⁹行⁴⁰，⁴¹者⁴²，⁴³者⁴⁴，⁴⁵者⁴⁶，⁴⁷者⁴⁸，⁴⁹者⁵⁰，⁵¹者⁵²，⁵³者⁵⁴，⁵⁵者⁵⁶，⁵⁷者⁵⁸，⁵⁹者⁶⁰，⁶¹者⁶²，⁶³者⁶⁴，⁶⁵者⁶⁶，⁶⁷者⁶⁸，⁶⁹者⁷⁰，⁷¹者⁷²，⁷³者⁷⁴，⁷⁵者⁷⁶，⁷⁷者⁷⁸，⁷⁹者⁸⁰，⁸¹者⁸²，⁸³者⁸⁴，⁸⁵者⁸⁶，⁸⁷者⁸⁸，⁸⁹者⁹⁰，⁹¹者⁹²，⁹³者⁹⁴，⁹⁵者⁹⁶，⁹⁷者⁹⁸，⁹⁹者¹⁰⁰，¹⁰¹者¹⁰²，¹⁰³者¹⁰⁴，¹⁰⁵者¹⁰⁶，¹⁰⁷者¹⁰⁸，¹⁰⁹者¹¹⁰，¹¹¹者¹¹²，¹¹³者¹¹⁴，¹¹⁵者¹¹⁶，¹¹⁷者¹¹⁸，¹¹⁹者¹²⁰，¹²¹者¹²²，¹²³者¹²⁴，¹²⁵者¹²⁶，¹²⁷者¹²⁸，¹²⁹者¹³⁰，¹³¹者¹³²，¹³³者¹³⁴，¹³⁵者¹³⁶，¹³⁷者¹³⁸，¹³⁹者¹⁴⁰，¹⁴¹者¹⁴²，¹⁴³者¹⁴⁴，¹⁴⁵者¹⁴⁶，¹⁴⁷者¹⁴⁸，¹⁴⁹者¹⁵⁰，¹⁵¹者¹⁵²，¹⁵³者¹⁵⁴，¹⁵⁵者¹⁵⁶，¹⁵⁷者¹⁵⁸，¹⁵⁹者¹⁶⁰，¹⁶¹者¹⁶²，¹⁶³者¹⁶⁴，¹⁶⁵者¹⁶⁶，¹⁶⁷者¹⁶⁸，¹⁶⁹者¹⁷⁰，¹⁷¹者¹⁷²，¹⁷³者¹⁷⁴，¹⁷⁵者¹⁷⁶，¹⁷⁷者¹⁷⁸，¹⁷⁹者¹⁸⁰，¹⁸¹者¹⁸²，¹⁸³者¹⁸⁴，¹⁸⁵者¹⁸⁶，¹⁸⁷者¹⁸⁸，¹⁸⁹者¹⁹⁰，¹⁹¹者¹⁹²，¹⁹³者¹⁹⁴，¹⁹⁵者¹⁹⁶，¹⁹⁷者¹⁹⁸，¹⁹⁹者²⁰⁰，²⁰¹者²⁰²，²⁰³者²⁰⁴，²⁰⁵者²⁰⁶，²⁰⁷者²⁰⁸，²⁰⁹者²¹⁰，²¹¹者²¹²，²¹³者²¹⁴，²¹⁵者²¹⁶，²¹⁷者²¹⁸，²¹⁹者²²⁰，²²¹者²²²，²²³者²²⁴，²²⁵者²²⁶，²²⁷者²²⁸，²²⁹者²³⁰，²³¹者²³²，²³³者²³⁴，²³⁵者²³⁶，²³⁷者²³⁸，²³⁹者²⁴⁰，²⁴¹者²⁴²，²⁴³者²⁴⁴，²⁴⁵者²⁴⁶，²⁴⁷者²⁴⁸，²⁴⁹者²⁵⁰，²⁵¹者²⁵²，²⁵³者²⁵⁴，²⁵⁵者²⁵⁶，²⁵⁷者²⁵⁸，²⁵⁹者²⁶⁰，²⁶¹者²⁶²，²⁶³者²⁶⁴，²⁶⁵者²⁶⁶，²⁶⁷者²⁶⁸，²⁶⁹者²⁷⁰，²⁷¹者²⁷²，²⁷³者²⁷⁴，²⁷⁵者²⁷⁶，²⁷⁷者²⁷⁸，²⁷⁹者²⁸⁰，²⁸¹者²⁸²，²⁸³者²⁸⁴，²⁸⁵者²⁸⁶，²⁸⁷者²⁸⁸，²⁸⁹者²⁹⁰，²⁹¹者²⁹²，²⁹³者²⁹⁴，²⁹⁵者²⁹⁶，²⁹⁷者²⁹⁸，²⁹⁹者³⁰⁰，³⁰¹者³⁰²，³⁰³者³⁰⁴，³⁰⁵者³⁰⁶，³⁰⁷者³⁰⁸，³⁰⁹者³¹⁰，³¹¹者³¹²，³¹³者³¹⁴，³¹⁵者³¹⁶，³¹⁷者³¹⁸，³¹⁹者³²⁰，³²¹者³²²，³²³者³²⁴，³²⁵者³²⁶，³²⁷者³²⁸，³²⁹者³³⁰，³³¹者³³²，³³³者³³⁴，³³⁵者³³⁶，³³⁷者³³⁸，³³⁹者³⁴⁰，³⁴¹者³⁴²，³⁴³者³⁴⁴，³⁴⁵者³⁴⁶，³⁴⁷者³⁴⁸，³⁴⁹者³⁵⁰，³⁵¹者³⁵²，³⁵³者³⁵⁴，³⁵⁵者³⁵⁶，³⁵⁷者³⁵⁸，³⁵⁹者³⁶⁰，³⁶¹者³⁶²，³⁶³者³⁶⁴，³⁶⁵者³⁶⁶，³⁶⁷者³⁶⁸，³⁶⁹者³⁷⁰，³⁷¹者³⁷²，³⁷³者³⁷⁴，³⁷⁵者³⁷⁶，³⁷⁷者³⁷⁸，³⁷⁹者³⁸⁰，³⁸¹者³⁸²，³⁸³者³⁸⁴，³⁸⁵者³⁸⁶，³⁸⁷者³⁸⁸，³⁸⁹者³⁹⁰，³⁹¹者³⁹²，³⁹³者³⁹⁴，³⁹⁵者³⁹⁶，³⁹⁷者³⁹⁸，³⁹⁹者⁴⁰⁰，⁴⁰¹者⁴⁰²，⁴⁰³者⁴⁰⁴，⁴⁰⁵者⁴⁰⁶，⁴⁰⁷者⁴⁰⁸，⁴⁰⁹者⁴¹⁰，⁴¹¹者⁴¹²，⁴¹³者⁴¹⁴，⁴¹⁵者⁴¹⁶，⁴¹⁷者⁴¹⁸，⁴¹⁹者⁴²⁰，⁴²¹者⁴²²，⁴²³者⁴²⁴，⁴²⁵者⁴²⁶，⁴²⁷者⁴²⁸，⁴²⁹者⁴³⁰，⁴³¹者⁴³²，⁴³³者⁴³⁴，⁴³⁵者⁴³⁶，⁴³⁷者⁴³⁸，⁴³⁹者⁴⁴⁰，⁴⁴¹者⁴⁴²，⁴⁴³者⁴⁴⁴，⁴⁴⁵者⁴⁴⁶，⁴⁴⁷者⁴⁴⁸，⁴⁴⁹者⁴⁵⁰，⁴⁵¹者⁴⁵²，⁴⁵³者⁴⁵⁴，⁴⁵⁵者⁴⁵⁶，⁴⁵⁷者⁴⁵⁸，⁴⁵⁹者⁴⁶⁰，⁴⁶¹者⁴⁶²，⁴⁶³者⁴⁶⁴，⁴⁶⁵者⁴⁶⁶，⁴⁶⁷者⁴⁶⁸，⁴⁶⁹者⁴⁷⁰，⁴⁷¹者⁴⁷²，⁴⁷³者⁴⁷⁴，⁴⁷⁵者⁴⁷⁶，⁴⁷⁷者⁴⁷⁸，⁴⁷⁹者⁴⁸⁰，⁴⁸¹者⁴⁸²，⁴⁸³者⁴⁸⁴，⁴⁸⁵者⁴⁸⁶，⁴⁸⁷者⁴⁸⁸，⁴⁸⁹者⁴⁹⁰，⁴⁹¹者⁴⁹²，⁴⁹³者⁴⁹⁴，⁴⁹⁵者⁴⁹⁶，⁴⁹⁷者⁴⁹⁸，⁴⁹⁹者⁵⁰⁰，⁵⁰¹者⁵⁰²，⁵⁰³者⁵⁰⁴，⁵⁰⁵者⁵⁰⁶，⁵⁰⁷者⁵⁰⁸，⁵⁰⁹者⁵¹⁰，⁵¹¹者⁵¹²，⁵¹³者⁵¹⁴，⁵¹⁵者⁵¹⁶，⁵¹⁷者⁵¹⁸，⁵¹⁹者⁵²⁰，⁵²¹者⁵²²，⁵²³者⁵²⁴，⁵²⁵者⁵²⁶，⁵²⁷者⁵²⁸，⁵²⁹者⁵³⁰，⁵³¹者⁵³²，⁵³³者⁵³⁴，⁵³⁵者⁵³⁶，⁵³⁷者⁵³⁸，⁵³⁹者⁵⁴⁰，⁵⁴¹者⁵⁴²，⁵⁴³者⁵⁴⁴，⁵⁴⁵者⁵⁴⁶，⁵⁴⁷者⁵⁴⁸，⁵⁴⁹者⁵⁵⁰，⁵⁵¹者⁵⁵²，⁵⁵³者⁵⁵⁴，⁵⁵⁵者⁵⁵⁶，⁵⁵⁷者⁵⁵⁸，⁵⁵⁹者⁵⁶⁰，⁵⁶¹者⁵⁶²，⁵⁶³者⁵⁶⁴，⁵⁶⁵者⁵⁶⁶，⁵⁶⁷者⁵⁶⁸，⁵⁶⁹者⁵⁷⁰，⁵⁷¹者⁵⁷²，⁵⁷³者⁵⁷⁴，⁵⁷⁵者⁵⁷⁶，⁵⁷⁷者⁵⁷⁸，⁵⁷⁹者⁵⁸⁰，⁵⁸¹者⁵⁸²，⁵⁸³者⁵⁸⁴，⁵⁸⁵者⁵⁸⁶，⁵⁸⁷者⁵⁸⁸，⁵⁸⁹者⁵⁹⁰，⁵⁹¹者⁵⁹²，⁵⁹³者⁵⁹⁴，⁵⁹⁵者⁵⁹⁶，⁵⁹⁷者⁵⁹⁸，⁵⁹⁹者⁶⁰⁰，⁶⁰¹者⁶⁰²，⁶⁰³者⁶⁰⁴，⁶⁰⁵者⁶⁰⁶，⁶⁰⁷者⁶⁰⁸，⁶⁰⁹者⁶¹⁰，⁶¹¹者⁶¹²，⁶¹³者⁶¹⁴，⁶¹⁵者⁶¹⁶，⁶¹⁷者⁶¹⁸，⁶¹⁹者⁶²⁰，⁶²¹者⁶²²，⁶²³者⁶²⁴，⁶²⁵者⁶²⁶，⁶²⁷者⁶²⁸，⁶²⁹者⁶³⁰，⁶³¹者⁶³²，⁶³³者⁶³⁴，⁶³⁵者⁶³⁶，⁶³⁷者⁶³⁸，⁶³⁹者⁶⁴⁰，⁶⁴¹者⁶⁴²，⁶⁴³者⁶⁴⁴，⁶⁴⁵者⁶⁴⁶，⁶⁴⁷者⁶⁴⁸，⁶⁴⁹者⁶⁵⁰，⁶⁵¹者⁶⁵²，⁶⁵³者⁶⁵⁴，⁶⁵⁵者⁶⁵⁶，⁶⁵⁷者⁶⁵⁸，⁶⁵⁹者⁶⁶⁰，⁶⁶¹者⁶⁶²，⁶⁶³者⁶⁶⁴，⁶⁶⁵者⁶⁶⁶，⁶⁶⁷者⁶⁶⁸，⁶⁶⁹者⁶⁷⁰，⁶⁷¹者⁶⁷²，⁶⁷³者⁶⁷⁴，⁶⁷⁵者⁶⁷⁶，⁶⁷⁷者⁶⁷⁸，⁶⁷⁹者⁶⁸⁰，⁶⁸¹者⁶⁸²，⁶⁸³者⁶⁸⁴，⁶⁸⁵者⁶⁸⁶，⁶⁸⁷者⁶⁸⁸，⁶⁸⁹者⁶⁹⁰，⁶⁹¹者⁶⁹²，⁶⁹³者⁶⁹⁴，⁶⁹⁵者⁶⁹⁶，⁶⁹⁷者⁶⁹⁸，⁶⁹⁹者⁷⁰⁰，⁷⁰¹者⁷⁰²，⁷⁰³者⁷⁰⁴，⁷⁰⁵者⁷⁰⁶，⁷⁰⁷者⁷⁰⁸，⁷⁰⁹者⁷¹⁰，⁷¹¹者⁷¹²，⁷¹³者⁷¹⁴，⁷¹⁵者⁷¹⁶，⁷¹⁷者⁷¹⁸，⁷¹⁹者⁷²⁰，⁷²¹者⁷²²，⁷²³者⁷²⁴，⁷²⁵者⁷²⁶，⁷²⁷者⁷²⁸，⁷²⁹者⁷³⁰，⁷³¹者⁷³²，⁷³³者⁷³⁴，⁷³⁵者⁷³⁶，⁷³⁷者⁷³⁸，⁷³⁹者⁷⁴⁰，⁷⁴¹者⁷⁴²，⁷⁴³者⁷⁴⁴，⁷⁴⁵者⁷⁴⁶，⁷⁴⁷者⁷⁴⁸，⁷⁴⁹者⁷⁵⁰，⁷⁵¹者⁷⁵²，⁷⁵³者⁷⁵⁴，⁷⁵⁵者⁷⁵⁶，⁷⁵⁷者⁷⁵⁸，⁷⁵⁹者⁷⁶⁰，⁷⁶¹者⁷⁶²，⁷⁶³者⁷⁶⁴，⁷⁶⁵者⁷⁶⁶，⁷⁶⁷者⁷⁶⁸，⁷⁶⁹者⁷⁷⁰，⁷⁷¹者⁷⁷²，⁷⁷³者⁷⁷⁴，⁷⁷⁵者⁷⁷⁶，⁷⁷⁷者⁷⁷⁸，⁷⁷⁹者⁷⁸⁰，⁷⁸¹者⁷⁸²，⁷⁸³者⁷⁸⁴，⁷⁸⁵者⁷⁸⁶，⁷⁸⁷者⁷⁸⁸，⁷⁸⁹者⁷⁹⁰，⁷⁹¹者⁷⁹²，⁷⁹³者⁷⁹⁴，⁷⁹⁵者⁷⁹⁶，⁷⁹⁷者⁷⁹⁸，⁷⁹⁹者⁸⁰⁰，⁸⁰¹者⁸⁰²，⁸⁰³者⁸⁰⁴，⁸⁰⁵者⁸⁰⁶，⁸⁰⁷者⁸⁰⁸，⁸⁰⁹者⁸¹⁰，⁸¹¹者⁸¹²，⁸¹³者⁸¹⁴，⁸¹⁵者⁸¹⁶，⁸¹⁷者⁸¹⁸，⁸¹⁹者⁸²⁰，⁸²¹者⁸²²，⁸²³者⁸²⁴，⁸²⁵者⁸²⁶，⁸²⁷者⁸²⁸，⁸²⁹者⁸³⁰，⁸³¹者⁸³²，⁸³³者⁸³⁴，⁸³⁵者⁸³⁶，⁸³⁷者⁸³⁸，⁸³⁹者⁸⁴⁰，⁸⁴¹者⁸⁴²，⁸⁴³者⁸⁴⁴，⁸⁴⁵者⁸⁴⁶，⁸⁴⁷者⁸⁴⁸，⁸⁴⁹者⁸⁵⁰，⁸⁵¹者⁸⁵²，⁸⁵³者⁸⁵⁴，⁸⁵⁵者⁸⁵⁶，⁸⁵⁷者⁸⁵⁸，⁸⁵⁹者⁸⁶⁰，⁸⁶¹者⁸⁶²，⁸⁶³者⁸⁶⁴，⁸⁶⁵者⁸⁶⁶，⁸⁶⁷者⁸⁶⁸，⁸⁶⁹者⁸⁷⁰，⁸⁷¹者⁸⁷²，⁸⁷³者⁸⁷⁴，⁸⁷⁵者⁸⁷⁶，⁸⁷⁷者⁸⁷⁸，⁸⁷⁹者⁸⁸⁰，⁸⁸¹者⁸⁸²，⁸⁸³者⁸⁸⁴，⁸⁸⁵者⁸⁸⁶，⁸⁸⁷者⁸⁸⁸，⁸⁸⁹者⁸⁹⁰，⁸⁹¹者⁸⁹²，⁸⁹³者⁸⁹⁴，⁸⁹⁵者⁸⁹⁶，⁸⁹⁷者⁸⁹⁸，⁸⁹⁹者⁹⁰⁰，⁹⁰¹者⁹⁰²，⁹⁰³者⁹⁰⁴，⁹⁰⁵者⁹⁰⁶，⁹⁰⁷者⁹⁰⁸，⁹⁰⁹者⁹¹⁰，⁹¹¹者⁹¹²，⁹¹³者⁹¹⁴，⁹¹⁵者⁹¹⁶，⁹¹⁷者⁹¹⁸，⁹¹⁹者⁹²⁰，⁹²¹者⁹²²，⁹²³者⁹²⁴，⁹²⁵者⁹²⁶，⁹²⁷者⁹²⁸，⁹²⁹者⁹³⁰，⁹³¹者⁹³²，⁹³³者⁹³⁴，⁹³⁵者⁹³⁶，⁹³⁷者⁹³⁸，⁹³⁹者⁹⁴⁰，⁹⁴¹者⁹⁴²，⁹⁴³者⁹⁴⁴，⁹⁴⁵者⁹⁴⁶，⁹⁴⁷者⁹⁴⁸，⁹⁴⁹者⁹⁵⁰，⁹⁵¹者⁹⁵²，⁹⁵³者⁹⁵⁴，⁹⁵⁵者⁹⁵⁶，⁹⁵⁷者⁹⁵⁸，⁹⁵⁹者⁹⁶⁰，⁹⁶¹者⁹⁶²，⁹⁶³者⁹⁶⁴，⁹⁶⁵者⁹⁶⁶，⁹⁶⁷者⁹⁶⁸，⁹⁶⁹者⁹⁷⁰，⁹⁷¹者⁹⁷²，⁹⁷³者⁹⁷⁴，⁹⁷⁵者⁹⁷⁶，⁹⁷⁷者⁹⁷⁸，⁹⁷⁹者⁹⁸⁰，⁹⁸¹者⁹⁸²，⁹⁸³者⁹⁸⁴，⁹⁸⁵者⁹⁸⁶，⁹⁸⁷者⁹⁸⁸，⁹⁸⁹者⁹⁹⁰，⁹⁹¹者⁹⁹²，⁹⁹³者⁹⁹⁴，⁹⁹⁵者⁹⁹⁶，⁹⁹⁷者⁹⁹⁸，⁹⁹⁹者¹⁰⁰⁰，¹⁰⁰¹者¹⁰⁰²，¹⁰⁰³者¹⁰⁰⁴，¹⁰⁰⁵者¹⁰⁰⁶，¹⁰⁰⁷者¹⁰⁰⁸，¹⁰⁰⁹者¹⁰¹⁰，¹⁰¹¹者¹⁰¹²，¹⁰¹³者¹⁰¹⁴，¹⁰¹⁵者¹⁰¹⁶，¹⁰¹⁷者¹⁰¹⁸，¹⁰¹⁹者¹⁰²⁰，¹⁰²¹者¹⁰²²，¹⁰²³者¹⁰²⁴，¹⁰²⁵者¹⁰²⁶，¹⁰²⁷者¹⁰²⁸，¹⁰²⁹者¹⁰³⁰，¹⁰³¹者¹⁰³²，¹⁰³³者¹⁰³⁴，¹⁰³⁵者¹⁰³⁶，¹⁰³⁷者¹⁰³⁸，¹⁰³⁹者¹⁰⁴⁰，¹⁰⁴¹者¹⁰⁴²，¹⁰⁴³者¹⁰⁴⁴，¹⁰⁴⁵者¹⁰⁴⁶，¹⁰⁴⁷者¹⁰⁴⁸，¹⁰⁴⁹者¹⁰⁵⁰，¹⁰⁵¹者¹⁰⁵²，¹⁰⁵³者¹⁰⁵⁴，¹⁰⁵⁵者¹⁰⁵⁶，¹⁰⁵⁷者¹⁰⁵⁸，¹⁰⁵⁹者¹⁰⁶⁰，¹⁰⁶¹者¹⁰⁶²，¹⁰⁶³者¹⁰⁶⁴，¹⁰⁶⁵者¹⁰⁶⁶，¹⁰⁶⁷者¹⁰⁶⁸，¹⁰⁶⁹者¹⁰⁷⁰，¹⁰⁷¹者¹⁰⁷²，¹⁰⁷³者¹⁰⁷⁴，¹⁰⁷⁵者¹⁰⁷⁶，¹⁰⁷⁷者¹⁰⁷⁸，¹⁰⁷⁹者¹⁰⁸⁰，¹⁰⁸¹者¹⁰⁸²，¹⁰⁸³者¹⁰⁸⁴，¹⁰⁸⁵者¹⁰⁸⁶，¹⁰⁸⁷者¹⁰⁸⁸，¹⁰⁸⁹者¹⁰⁹⁰，¹⁰⁹¹者¹⁰⁹²，¹⁰⁹³者¹⁰⁹⁴，¹⁰⁹⁵者¹⁰⁹⁶，¹⁰⁹⁷者¹⁰⁹⁸，¹⁰⁹⁹者¹¹⁰⁰，¹¹⁰¹者¹¹⁰²，¹¹⁰³者¹¹⁰⁴，¹¹⁰⁵者¹¹⁰⁶，¹¹⁰⁷者¹¹⁰⁸，¹¹⁰⁹者¹¹¹⁰，¹¹¹¹者¹¹¹²，¹¹¹³者¹¹¹⁴，¹¹¹⁵者¹¹¹⁶，¹¹¹⁷者¹¹¹⁸，¹¹¹⁹者¹¹²⁰，¹¹²¹者¹¹²²，¹¹²³者¹¹²⁴，¹¹²⁵者¹¹²⁶，¹¹²⁷者¹¹²⁸，¹¹²⁹者¹¹³⁰，¹¹³¹者¹¹³²，¹¹³³者¹¹³⁴，¹¹³⁵者¹¹³⁶，¹¹³⁷者¹¹³⁸，¹¹³⁹者¹¹⁴⁰，¹¹⁴¹者¹¹⁴²，¹¹⁴³者¹¹⁴⁴，¹¹⁴⁵者¹¹⁴⁶，¹¹⁴⁷者¹¹⁴⁸，¹¹⁴⁹者¹¹⁵⁰，¹¹⁵¹者¹¹⁵²，¹¹⁵³者¹¹⁵⁴，¹¹⁵⁵者¹¹⁵⁶，¹¹⁵⁷者¹¹⁵⁸，¹¹⁵⁹者¹¹⁶⁰，¹¹⁶¹者¹¹⁶²，¹¹⁶³者¹¹⁶⁴，¹¹⁶⁵者¹¹⁶⁶，¹¹⁶⁷者¹¹⁶⁸，¹¹⁶⁹者¹¹⁷⁰，¹¹⁷¹者¹¹⁷²，¹¹⁷³者¹¹⁷⁴，¹¹⁷⁵者¹¹⁷⁶，¹¹⁷⁷者¹¹⁷⁸，¹¹⁷⁹者¹¹⁸⁰，¹¹⁸¹者¹¹⁸²，¹¹⁸³者¹¹⁸⁴，¹¹⁸⁵者¹¹⁸⁶，¹¹⁸⁷者¹¹⁸⁸，¹¹⁸⁹者¹¹⁹⁰，¹¹⁹¹者¹¹⁹²，¹¹⁹³者¹¹⁹⁴，¹¹⁹⁵者¹¹⁹⁶，¹¹⁹⁷者¹¹⁹⁸，¹¹⁹⁹者¹²⁰⁰，¹²⁰¹者¹²⁰²，¹²⁰³者<

也。—— 得少非多，请充一论、扶方点转—— 勾天头—— 大地真伤，
众+得个聪明；寒里受热，众生又得个清凉—— 俾的明之，存乎
其人。守之不失，亦登智域²！序。

康熙丁未³东湖⁴通家⁵弟倪长玕⁶拜手⁷言

1. 关键

2. 守之不失，亦登智域：遵照医理而不违背，也可以算得上智慧了

3. 丁未：康熙六年（1667）。

4. 东湖：今浙江省嘉兴市平湖市区域东

5. 通家：犹世交

6. 倪长玕：字伯屏，明末清初嘉兴平湖人，崇祯十年丁丑科进士，后
简居不仕

7. 拜手：古代的一种跪拜礼。行礼时，跪下，两手合拢到地，头靠在
手上。亦称“拜首”。古代男子跪拜礼的一种。跪后两手相拱，俯头至手

叙

夫以「周礼」，以医学为民之业，以五谷五药养其形，以五色、五气、五声视其生死、调之以九针之要、参之以卜筮之动，而识「中」之职，隶诸大官。故其书于是乎专，后世司无专职，家无专字。岐伯、黄帝之教，久失其真。其书虽传，皆为后人附托。惟汉张仲景《伤寒论》一书为千百年来「不桃」之祖¹，特其章句篇帙，不无散系，「王」氏、「戎」氏相起而漫次²其文，因又作言其司，颠倒得会，而仲景之意一时「治奉议」作「活人书」，叔微³《类证》、自证歌⁴，叔微急括⁵，而仲景之意由晦即「全生」⁶《类要》⁷、《准绳》⁸等书，学者咸奉为指

1 两：反复诊察。

2 识（zhì 志）：记、

3 不桃（tāo 桃）之祖：不迁入桃庙的祖先。一般指创业之祖。比如创立某种事业而受到尊崇的人。桃，古代帝王远祖的祠堂。

4 漫次：随意编排次序。

5 奉议：朱奉议，宋代医学家朱肱，字翼中，号无求子，晚号大隐翁。元祐三年（1088）进士，授奉议郎。故后人亦称朱奉议。撰《南阳活人书》，或称《类证活人书》。

6 叔微：即南宋医学家许叔微，字知可，曾为翰林学士，官至集贤殿学士，故人称其“许学士”，撰《普济本事方》（又名《类证普济本事方》）《伤寒百证歌》等书。

7 隐括：亦作“隐括”，指吃原有的文章、著作加以剪裁改写。

8 全生：即《全生指迷方》，又名《济生全生指迷方》，书名，三卷，宋代于潜著。

9 类要：即《伤寒类要全书》，明代吴绛著。

10 准绳：即《证治准绳》，书名，四十四卷。明代王肯堂著。

者，究未能推衍其理，而仲景之意终晦于天下。近吾友喻嘉言氏，慨众蒙昧之支离，嗣正传之榛芜²，取方中行³《伤寒论重加注释，作为《理论》，垂凡仲景之旨较若列眉⁴，如书晦者之不寒而自明。甲辰⁵秋，余年家⁶张子路不过娄东⁷，携原书⁸一册，示余，大受仲景之书，别为次第，合古今百家之言，析而不择，出其心裁，增以世说，于伤寒句篇帙之有伦⁹，而仲景千百年来晦之意，益彰明较著，尤言友遥感矣。余何敢之跃然喜，辄转告之邑戚某白也，思嘉言虽妓，不得一见其书，而与张子上下其论，相说以言也。昔白虎宗¹⁰许胤宗，戎巧其著书，胤宗曰：“医者意也，非言¹¹解，且不能言也。”今张子以一十年之学力，著书数十万言，真谓世而相感，始知发伯、仲之得聚有¹¹之宜，其非济世利民之统¹¹，

1 喙：鸟兽的嘴。此指言论、理论。

2 榛芜：草木丛杂。此指烦琐累赘。

3 方中行：即方有执，明代伤寒学大家，字中行，号九山山人，撰《伤寒论条辨》。

4 较若列眉：非常明白。“较”，明显；列眉，两眉对列，谓真切无疑。

5 甲辰：即明崇祯十七年（1644）。

6 年家：原指同年参加科举考试并一同考上的人叫同年。明末以后，任吏通局，不论有无年谊，概称年家。

7 娄东：江苏太仓。

8 伦：次序。

9 许胤宗：南朝梁至唐代人，以医术著名，精通脉诊，用药灵活变通，不拘一法。

10 有熊：黄帝的国号，代指黄帝。

11 统：世代相承的系统。此指先河。

而岂《周官》疾医之专守一职也耶！张子将付剞劂^①，余患后学，余漫书数言，弁其首^②。

康熙乙巳^③春王^④娄东年家弟胡周鼎^⑤题

① 剞劂（jùe 机绝）：雕版，刻印。此指出版。

② 弁其首：放在前面。弁，书籍或长篇文章的序文、引言。

③ 乙巳：清康熙四年（1665）。

④ 春王：正月。按《春秋》体例，鲁十二公之元年均应书“春王正月公即位”，有些地方因故不书“正月”二字，后遂以“春王”指代正月。

⑤ 胡周鼎：明末清初人，字其章，号尚臣，崇祯十三年中进士，娄东（今江苏太仓）人。撰《葵锦堂集》。

序伤寒绪二论密庵李模^①撰

医，其以已病也。久之有书，所以已病之病也。卜士一措指^②陈腐，无古执方，不惟不足以断春阳，而^③致秋在陨落^④。于是乎，书不充已病而适以病民^⑤，书乃引甚^⑥。盖形气之禀受不齐，时地之感应各异，病之来也不一，其传变也无定，不得已求之古人之书。而古人立言又复深隐其义，诘屈^⑦其义，苟不神而明之，几何其不自误以误人耶？

伤寒家自推仲景，固不啻为金科玉律。然往往理以文晦^⑧，法以意迁^⑨，浅学曲信^⑩，穿凿穿凿^⑪。王叔和窜次^⑫，戕无已附会支离，如治丝而益棼^⑬。以后，赵以德^⑭、方有执、喻嘉

① 李模：生卒年不详。字子木，号灌溪，一说号密庵。南直隶苏州府吴县（今属江苏）人，明代天启乙丑（1625）进士，曾任广东东莞县（今东莞）令、监察御史、南京国子监典籍等职，后引疾辞官，杜门里居。

② 下士：古代医师称谓，指最次一等。

③ 措指（jùnzhí 俊直）：摘取。措，拾取；指，拾取；摘取。

④ 嘘春阳……陨落：意谓不能治愈疾病，反而会给病人带来更多的痛苦。嘘，熏炙；翻，反而。

⑤ 适以病医：只是使医生病。适，刚巧，恰巧；病医，使医生有问题。

⑥ 诘屈：文词艰涩难读。

⑦ 理以文晦：其理论因文辞深奥而隐晦难懂。

⑧ 法以意迁：法则因为理解不同而改变。

⑨ 曲儒：浅陋迂腐的儒生。

⑩ 臻堂奥：达到高深的境界。臻，到；堂奥，即登堂睹奥。喻含义深奥的意境或事理。

⑪ 棼（fén 坟）：通“紊”。纷乱；紊乱。

⑫ 赵以德：即赵良仁，元末明初医家。字以德，号云居。撰《金匱方衍义》。

言述为发明¹，各存具体，终非全豹。下手此者，甘辛失当，补泻违宜，用以福民生而赞化育²，有复难矣。路上来了，敏思超俗，复为伦匹³，其于仲景之学，耽咀⁴已有年，慨然曰：“古人往矣，而岐言不彰，后学之罪也。读古人书不能明其秘奥，发其幽深，寻其条贯，吾负古人多矣。”爰是取仲景所著及行哲所述，既参玩，更复审思，既法古，仍出己见，觚缕⁵校雠⁶，篇成。一第⁷一绪⁸一论，如次第之不可淆乱也，则厘⁹之；如语块之不可混于他理也，则分其之；如主伤寒、类伤寒之皇用千里也，则疏明贯列¹⁰之；如诸家书语之最瑜杂出也，则发¹¹一第¹²列¹³约存之；如不正一大计之并见也，则方潜返本而显示之。一第¹⁴与¹⁵之正宗，绪¹⁶百家之涉论，如¹⁷东注，如¹⁸日中是，一第¹⁹在旧古人心印²⁰灿然²¹罗列，反复错举²²，前后二十余载，凡²³易稿百十始就，岂非为仲景之功臣，实为万世书之鸿宝²⁴。是书也，吾知古人无不可已之病，亦无有病而不可行之

1 发明：阐发说明。

2 赞化育：帮助化生长育。

3 复（xiòng 凶，去声）为伦匹：超然不俗，无与伦匹。复，还。

4 耽咀（jǔ 举）：沉迷研究。咀，品味；研究。

5 觚（luó 罗）缕：详细而有条理地叙述。觚，繁，琐细。

6 校雠（jiàochóu 叫稠）：即校勘。谓考订书籍，纠正讹误。

疏明贯列：简要明确地排列。

7 发（shān 山）：删除。

8 绪（zuǎn 纂）：继承。

9 厘：整理；叙述。

10 心印灿然：思想明显。

11 铅槧（qiàn 欠）：铅粉笔和木板，古人用以书写的工具，借指著作板勘。槧，古代以木削成用作书写的版片。

12 寿世：使世人长寿。

13 鸿宝：道教修仙炼丹之书，泛指珍贵的书籍。

人，皆人下霍然起色，张子之有见于斯道，固不伟欤！漆园叟^①之言曰：夫唯病病，是以不病^②。

吾于张子则更进一解^③云：

路玉表弟孤高绝伦，性不入时。少好古学，诗宗晚唐，其
 诗之清峭，如孤松之独立，如幽兰之自芳，如寒梅之自开，如
 乐为之序，付之梨枣^④，庶后之学者不患于无传，病者不苦于
 难^⑤，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，
 吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，
 吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，吾知其言，
 然哉？

康熙丙午^⑥曲辕文枬^⑦书并识

① 漆园叟：即庄子，先秦哲学家，道家代表人物之一。

② 夫唯病病是以不病：语出老子《道德经·七十一章》，意谓知道自己的错误之处，不去犯同样的错误这是高明的。

③ 解：文体的一种。此句以上为李模撰。

④ 梨枣：李模之号。

⑤ 梨枣：旧时刻版印书多用梨木或枣木，故以“梨枣”为书版的代称。

⑥ 筠：忠实；一心一意。

丹铅：指点勘书籍用的朱砂和铅粉，后借指校订之事。

⑦ 无虚晷（guǐ 鬼）：没有虚度光阴。晷，时间。

⑧ 宪副：清代都察院副长官左副都御史别称，监察史的副手。

⑨ 克绍：能够继承。克，能够。绍，继承。

⑩ 丙午：康熙五年（1666）。

⑪ 文枬：明末清初人。字曲辕，号溉菴，长洲（今江苏苏州）人。为文从简之子，文征明之玄孙，邑庠生。能诗，工书、画，甲申（1644）后奉亲隐居寒山，耕植以终。大江以南称文章节义之士，门人私谥端文先生。

伤寒缙绪二论自序

古未闻仲景氏之子者，后代不乏名彦，而释仲景之文日多，而仲景之真传亦日散。人皆逐其歧路，而莫或溯其宗本。一人伤寒一理，入手稍歧，未尝不易知自能正，守其糟粕，则愈趋愈远，乃至人异其指，家异其宗，不能相承，不可穷尽，理则茫然，无足怪者。余自幼迄今，遍读伤寒书，见诸家之多歧而不一己，往往掩卷叹曰：仲景书不可以不释，不释则世久而失传；它不可以多释，多释则辞繁而易乱。用是斟酌密谛，经历岁时，苦思得真，不敢妄发一言。十年来，靡刻不以此事为崇崇焉。后得《白论》一书，详论内外二论，又复广求秘本，反复详玩，初犹扞格难通，久之，忽有所悟，始觉同之所谓多歧者，率归一理。又久之，豁然手一理，与仲景之法，了无毫发异。人然后又可叹世之见其糟粕，而不知其精微

1 何辨：扩充引申

2 易知简能：语出《周易·系辞上》：“乾以易知，坤以简能。”谓易知易从

3 指：旨意；含义

4 密谛：佛教指微妙而真实的法门。此谓真实无谬的道理。

5 暑雨祁寒：语出《尚书·君牙》：“夏暑雨，小民惟曰怨咨，冬祁寒，小民亦惟曰怨咨，厥惟艰哉。”后以之作为怨嗟生计艰难之典。祁，大。

6 内外：疑指吕复的《伤寒内外编》，佚。《中国医籍考》卷三十三方论（十一）：“汪琥曰：王日休有《伤寒秘遗》，盛启东有《六经证类》，吕沧洲有《内外编》。张氏‘缙绪二论’中，每节取其语，及访其书，又秘而不传。”

7 编：书

8 扞（han 汗）格：互相抵牾

者，当不止一人。安得有人为聘其条贯，正其晦蒙，如披云见日，岂非古修一大愉快哉！昔王安道^①尝有志大编而未果，至今犹力能昔。因是不揣庸陋，勉图排纂^②。自将叔和篇叙失序处，一一次第，订六经，一正离合，一正结替，一正语类，并序、论、得等之似伤寒者，分隶而注释之。大都博采众长，贯以己意，使读者豁然且一，不致尔我迭见^③，眩惶^④与心目也。继又节取后贤之作，分列冬里、春温、疫疔及类证。大证、细证之辨，各为^⑤一论。绪^⑥一论^⑦者，祖仲景之文；智者，理诸家之纷纭而清出之，以复仲景之去，正明其源流。而与仲景之文相得彰彰，无牵掣^⑧而曲释^⑨，自可显然不晦，庶无负三十年苦心书成授梓^⑩，请正于世之讲仲景之学者。

康熙丁未且月^⑧石顽张璐识

自恨^⑨周蕃书

- ① 王安道：元代末年医家，撰《医经溯洄集》。
- ② 排纂：编排。
- ③ 尔我迭见：指各种不同观点多次出现或不断出现。
- ④ 眩惶：迷惑；迷乱。
- ⑤ 为：辅助。
- ⑥ 牵掣曲释：增加错误的解释。
- ⑦ 授梓：交付雕板。谓付印。
- ⑧ 且月：农历六月。
- ⑨ 自恨：周蕃之字。人称周黄头，长洲（今江苏苏州）人。

伤寒续论二论采用诸书

《灵枢》《素问》《难经》

《玉函经》《金匮要略》

《中藏经》《脉经》《甲乙经》

宋氏《伤寒》、《千金方》、王太仆《内经注》、孙兆《口诀》

成无己《伤寒注解》、《明理论》

庞安常《仲景补亡论》、朱奉议《活人书》

许叔微《伤寒百证》、许弘《内台方论》

赵嗣真《伤寒论》、张子和《儒门事亲》

刘河间《伤寒标本》、葛维《伤寒直格》

马宗素《伤寒医鉴》、戴同父《疫疠方论》

洁古《要略》、东垣《十书》

罗谦甫《卫生宝鉴》、《制药秘旨》

朱丹溪《伤寒辨疑》、赵以德《金匱衍义》

滑伯仁《医说》、《医按》、戴复庵《证治要诀》

刘宗厚《玉机微义》、王日休《伤寒补遗》

王安道《读伤寒论宣明论原病式说》

盛启东《医林黄冶》、《伤寒六经证辨》

陶节庵《伤寒六书》、朱玉符《全生集》

马玄台《素问注》、邵元伟《医学纲目》

虞天民《医学正传》、薛立斋十六种

赵养葵《医贯》、吕沧州《伤寒内外编》

方中行《伤寒条辨》、郑虚菴《女科万金方》

王肯堂《证治准绳》、李时珍《本草纲目》

张介宾《类经》、张三锡《医学六要》
江纂南《名医类按》、吴绶《伤寒缟要》
唐恕斋《原病集》、吴鹤皋《医方考》
吴又可《瘟疫论》、周慎斋《三书》
《观舌心法》、陈长卿《伤寒五法》
董橘斋《伤寒秘要》、戈存橘《补天石》
李士材《沙篆》、《伤寒括要》、《顺生微论》
喻嘉言《尚论篇》、《寓意草》、《法律》、《语录》
施笠泽《祖剂》、张卿子《参伤寒论》
张隐庵《注金匱要略》、《伤寒宗印》
卢子繇《疏钞金匱》、陆丽京《医林新论》

目 录

卷 上

太阳上篇
太阳中篇	六
太阳下篇
阳明上篇	四
阳明下篇	四六
少阳篇	六四
太阴篇	七
少阴上篇	七七
少阴下篇	八七
厥阴篇	九

卷 下

藏府经络篇
合方并药篇	六
温病篇
杂篇
脉法篇	四六
伤寒例	六七
上 方	七四
桂枝汤	七四
小建中汤	七五

桂枝加葛根汤	一七五
桂枝加桂汤	一七五
桂枝加芍药汤	一七六
桂枝加大黄汤	一七六
桂枝加厚朴杏仁汤	一七六
新加汤	一七六
桂枝去桂加茯苓白术汤	一七七
桂枝去芍药汤	一七七
桂枝去芍药加附子汤	一七七
桂枝加附子汤	一七七
桂枝甘草汤	一七七
救逆汤	一七七
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	一七八
桂枝麻黄各半汤	一七八
桂枝二麻黄一汤	一七八
桂枝二越婢一汤	一七八
当归四逆汤	一七九
当归四逆加吴茱萸	一七九
生姜汤	一七九

茯苓桂枝白术甘草汤	
.....	一七九
茯苓桂枝甘草大枣汤	
.....	一七九
茯苓甘草汤
	一七九
炙甘草汤
	一七九
茯苓汤
	一八
大青龙汤
	一八
小青龙汤
	一八
葛根汤
	一八
葛根加半夏汤
	一八二
麻黄杏仁甘草石膏汤	
.....	一八二
麻黄连翘赤小豆汤	
.....	一八二
麻黄升麻汤
	一八三
麻黄附子细辛汤	...
	一八三
麻黄附子甘草汤	...
	一八三
小柴胡汤
	一八四
大柴胡汤
	一八四
柴胡桂枝汤
	一八四
柴胡桂枝干姜汤	...
	一八四
柴胡加芒硝汤
	一八五
柴胡加龙骨牡蛎汤	
.....	一八五
四逆散
	一八五

调胃承气汤
	一八五
大承气汤
	一八六
小承气汤
	一八七
调经承气汤
	一八七
抵当汤
	一八七
抵当丸
	一八七
泻心汤
	一八七
泻心丸
	一八七
泻心散
	一八七
泻心丸
	一八七
泻心散
	一八八
泻心散
	一八八
大陷胸汤
	一八八
大陷胸丸
	一八八
小陷胸汤
	一八八
十枣汤
	一八九
大黄黄连泻心汤	...
	一八九
附子泻心汤
	一八九
干姜泻心汤
	一八九
甘草泻心汤
	一八九
半夏泻心汤
	一九〇
黄连汤
	一九〇
葛根黄芩黄连汤	...
	一九〇
厚朴生姜甘草半夏	
人参汤
	一九〇
干姜黄连黄芩人参汤	
.....	一九一
灵夏汤
	一九

旋覆代赭石汤	一九一
赤石脂禹余粮汤	一九一
桃花汤	一九一
四逆汤	一九二
四逆加人参汤	一九二
茯苓四逆汤	一九三
通脉四逆汤	一九三
通脉四逆加猪胆汁汤	一九三
白通汤	一九四
白通加猪胆汁汤	一九四
附子汤	一九四
白术附子汤	一九四
甘草附子汤	一九四
芍药甘草附子汤	一九五
理中丸及汤	一九五
桂枝人参汤	一九五
甘草干姜汤	一九五
乌梅丸	一九六
五苓散	一九六
猪苓汤	一九七
瓜蒂散	一九七
白散	一九七
梔子豉汤	一九七

梔子甘草豉汤	一九八
梔子生姜豉汤	一九八
梔子厚朴汤	一九八
梔子干姜汤	一九八
梔子浆皮汤	一九八
枳实栀子豉汤	一九八
黄芩汤	一九九
黄芩加半夏生姜汤	一九九
芍药甘草汤	一九九
白朮汤	一九九
白朮加人参汤	一九九
竹叶石膏汤	二〇〇
甘草汤	二〇〇
桔梗汤	二〇〇
文蛤散	二〇〇
猪苓汤	二〇〇
小建中汤	二〇一
芍药汤	二〇一
黄芩汤	二〇一
白朮汤	二〇一
牡蛎泽泻散	二〇二
烧裨散	二〇二
古今分两	二〇三
校注后记	二〇五

总 书 目

医 经

内经博议

内经精要

内经津液

灵枢提要

素问提要

素灵微蕴

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅注

素问灵枢类纂约注

清儒《内经》校记五种

勿听了俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学洞原

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书证治要言合璧

伤寒金匱

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒潜论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解

伤寒论集注（徐亦）

伤寒论集注（熊寿试）

伤寒微旨论

伤寒溯源集

伤寒启蒙集稿

伤寒尚论辨似

伤寒尚论辨似

张卿子伤寒论

金匮要略正义

金匮要略直解

高注金匮要略

伤寒论大方图解

伤寒论辨证广注

伤寒活人指掌图

张仲景金匮要略

伤寒六书纂要辨疑

伤寒六经辨证治法

伤寒类书活人总括

订正仲景伤寒论释义

张仲景伤寒原文点精

伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微

卡响经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

脉学指南

四诊脉论人个

翻注脉诀规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直诀

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释正参证治

针灸推拿

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙伸针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本草

药鉴
药镜
本草汇
本草便
去古录
食品集
十医本草
山居本草
长沙药解
本经经释
本经疏证
本草分经
本草正义
本草汇纂
本草汇纂
本草发明
本草发抉
本草约言
本草求原
本草明览
本草详节
本草洞诠
本草真诠
本草通玄
本草集要
本草辑要
本草纂要
识病捷法

药性纂要
药品化义
药理近考
食物本草
见心斋药录
分类草药性
本经序疏要
本经续疏证
本草经解要
青囊药性赋
分部本草妙用
本草二十四品
本草经疏辑要
本草乘雅半偈
生草药性备要
芷园臆草题药
新刻食鉴本草
类经证治本草
神农本草经赞
神农本经会通
神农本经校注
药性分类主治
艺林汇考饮食篇
本草纲目易知录
汤液本草经雅正
新刊药性要略大全
叔景堂改订注释寒热温平药性赋

方书

医便

卫生编
袖珍方
仁术便览
古方汇精
圣济总录
众妙仙方
李氏医鉴
医方丛话
医方约说
医方便览
乾坤生意
悬袖便方
救急易方
程氏释方
集古良方
摄生总论
辨症良方
活人心法（朱权）
卫生家宝方
寿世简便集
医方大成论
医方考绳愆
鹤峰普济方
饲鹤亭集方
内症经验方
思济堂方书
济世碎金方
揣摩有得集
啜斋急应奇方

乾坤生意秘韞
简易普济良方
内外验方秘传
名方类证医书大全
新编南北经验医方大成

临证综合

医级
医悟
丹台玉案
玉机辨症
古今医诗
本草权度
弄丸心法
医林绳墨
医学碎金
医学粹精
医宗备要
医宗宝镜
医宗撮精
医经小学
医卒元戎
医家四要
证治要义
松崖医径
扁鹊心书
素仙简要
慎斋遗书
折肱漫录
丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温 病

伤寒论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

江因通考

解围元藪

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痰疔论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

女科百问

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝笈

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝笈

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

彤园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治
妇科秘笈全书
宋氏女科撮要
茅氏女科秘方
节斋公胎产医案
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论
幼科折衷
幼科指月
个幼心略
保婴方
保婴撮要
活幼口议
活幼心书
小儿病源方论
幼科医学指南
痘疹活幼心法
新刻幼科百效全书
补要相珍小儿方论
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科
外科真詮
枕藏外科
外科明隐集
外科集验方
外证医案汇编

外科百效全书
外科活人定本
外科秘授著要
疮疡经验全书
外科心法真验指掌
片石居疡科治法辑要

伤 科

伤科方书
接骨全书
跌打大全
全身骨图考正

眼 科

目经大成
目科捷径
眼科启明
眼科要旨
眼科阐微
眼科集成
眼科纂要
银海指南
明目神验方
银海精微补
医理折衷目科
证治准绳眼科
鸿飞集论眼科
眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生记 纂

修龄要指

香食润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

二二二

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

曾峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

崑园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志
医学读书附志

综合

元汇医镜
平法寓言
寿芝医略
杏苑牛春
医林正印
医法青篇
医学五则
医学汇函
医学集成
医经允中
医钞类编

证治合参
宝命真论
活人心法（刘以仁）
家藏蒙筌
心印绀珠经
雪潭居医约
嵩厓尊生书
医书汇参辑成
罗氏会约医镜
罗浩医书二种
景岳全书发挥
新刊医学集成
存身小补家藏
胡文焕医书三种
铁如意轩医书四种
脉药联珠药性食物考
汉阳叶氏丛刻医集二种

卷 上

太阳上篇

既在二阳，则有传经直中之异；在二阳，则有在经在府之分。而太阳更以伤寒篇，风伤卫，营卫俱伤为大关键¹。改篇中分论风邪营卫甚多，不敢漫议。一条²即犯本坏证，是已篇语，分求各自为篇，却但不伤营和之阳，并不若《句论》之是文。虽热条例于伤寒去中，至于释义，则所言独开生面，裁取皆于诸家，读者毋以拾唾前人为诮³也。

病有发热恶寒者，发于阳也。无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈。以阳数七阴数六故也。

此条以有热无热，而分病同病之大端，一言阳证受病，则恶寒发热；阴证受病，则无热恶寒。《句论》以风伤卫气为阳，寒伤营者为阴，亦与篇见。发于阳者七日愈，阳，奇数也，阳证有余，故六日则足六气，余热不能尽散。发于阴，言阴才凉可愈，阴，偶数也，阴证不足，故六日则足六气，则证可身暖而愈也。

上条统论阴阳受病之原

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

脉浮者，邪气并于卫表也。头项强痛者，太阳经脉上至于头也。恶寒者，虽发热而恶寒不止，非无热也。以始热证未

1 关键：锁匙，比喻关键。

2 诮（qiào 窍）：责备；讥讽。

3 大端：主要方面。

泄，故脉但浮不缓耳。

太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。

上条但言脉浮恶寒，并未言其风恶营卫。此条即言脉浮缓，发热汗出，以言其乃风伤卫也。风为阳，从卫而入。然卫阳者卫外而为固也，今卫疏，故自汗出而脉缓。

太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发。阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

阳浮同前，即与卫强营弱同义。阳浮者，阳邪入卫，脉必外浮。阳性本热，风又善行，所以发热其捷。不待郁闭自发也。阴弱者，言无邪助，比卫不足，脉必内沉。阴弱不能内守，卫疏不乃外固，所以致汗自出，不待郁闭自出也。汗出既多，则营虚为矣。啬啬恶寒，内气馁也。淅淅恶风，外体疏也。恶风本有不恶寒者，世俗相传，谓伤寒恶风，伤风恶寒，误人多矣。翕翕发热，乃气郁阳遏之热，比伤寒之壮热不同。鼻鸣者，阳气上壅也。干呕者，阳邪上逆也。若外邪不解，势必传里。鼻鸣干呕便是传入阳明之候。是以亟为传，不尔是不传也。故用桂枝汤解肌表之固本，自与发汗解里同可之法，见于角立也。

太阳病，头痛发热，汗出恶风者，桂枝汤主之。

太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。

外证未解，曾服过发汗药可知。

太阳病，发热汗出者，此为营弱卫强，故使汗出。欲救邪风者，宜桂枝汤。

卫得邪助而强，营无邪助，故为弱也。

① 角立：对立。

病人藏无他病，时发热自汗出而不愈者，此为卫气不和也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤主之。

中无宿病，而表中风邪，汗出不愈者，必是卫气不和之故，设入于营，则里已近矣，未可安然^①称无病矣。时发热者，有时发热，有时不热，故先于未发热时，用解肌之法也。

病常自汗出者，此为营气和。营气和者外不谐，以卫气不共营气和谐故尔，以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈，宜桂枝汤。

此明中风病，所以卫受邪风，营反汗出之理，见营气不和，以卫受风邪，不能内与营气和谐，汗但外泄，虽是汗出，复宜发汗，使风邪外出，则卫不强而与营和矣。

太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。

桂汤反烦，必服与药不如法，本发汗药药力，肌表未开，徒用引动风邪，漫无出路，势必内入而生烦也。中风未传变者，舍桂枝解肌，别无善法，故药后仍服桂枝汤以愈。今虽不用刺法，此义不可不讲。

内经^②云：服桂枝汤反以不解，本汤加羌、辛、藁本，通其督脉者愈，即是刺风池、风府之意。

内经云：“有热汗出而身热者，风也。汗出而烦满不解者，厥也。”病名风厥，言烦满不解，必致传入阴经而发热厥也。

太阳病，头痛，至七日已上自愈者，以行其经尽故也。若

① 安然：安定貌；平安貌。

② 内编：疑为吕复《伤寒内外编》中的《内编》。

欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

针足阳明，言刺冲阳，使邪阳并却，不犯他界也。他经为不然。盖阳明中土，万物所归，无复传之地也。或言伤寒多在六七日时头痛不止者，一经言“七日太阳病衰，头痛少愈”，盖邪其病六日犹在太阳，至七日向始衰也。所谓“七日来复”者，言邪气乘虚而入，而人之正气流行，六日则尽六经，至七日复有受邪之经，正气内复，邪气得以外解也。若七日不愈，则邪其势盛，必欲再传可也，非必尽邪。盖太阳，一日阳明，六日传尽六经之为准则也。

风家表解而不了了者，十二日愈。

风邪虽去，而阳气之抗邪，未得遽止。俟十二日行周一经，则余邪尽出，必自愈矣。当静养以需，不可喜功干事也。

太阳病，外证未解者，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤主之。

下之为逆，不独指变结胸等证而言，即三阴坏病，多由误下所致也。

太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈，浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故知在外，当须解外则愈，宜桂枝汤主之。

虽已下而脉仍浮，表证未变者，当急解其外也。

大病脉浮大，问病者，言但使鞭耳，设利之为大逆，硬为实，汗出而解，何以故？脉浮当以汗解。

脉浮为邪在表，其人大便虽数日不行，不是虚也。设里实燥结，必腹胀硬满，又不得不从证下之，以其证急也。即如

1 虞：担心；忧虑。

和明也。有“脉浮而大，心下反硬，有热属，藏者攻之，不令发汗”一条，以其硬属藏攻邪藏，不以心下反硬，不令发汗心下力陷分，脉浮为表邪，而反发汗也。此与病人津液干枯，大便但硬而无痛苦，亦不攻于结而攻邪，只宜小建中汤多啖枣饴以和之，表邪热除而津回，大便自通矣。不得已用导法可也，设误用承气攻之，则表邪内犯，攻为大逆，与寸口脉浮大，而医反下之，此为大逆同意，是皆凭脉不凭证也。

欲自解者，必当先烦，乃有汗而解，何以知之？脉浮，故知汗出解也。

人坦郁然汗自出作，人身肤间汗作，气机之动也。气机动，则其脉必与口相应，故脉浮口邪重于表，才得汗出，而外邪尽从汗解。设脉不以浮应，则不能作汗，其证即为内入之候，又在言外矣。

桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与也。常须识此，勿令误也。

凡伤寒之脉证，不可误用桂枝汤，以中有芍药收敛邪，漫无出路，留连肉腠，贻患无穷，故为首禁。

凡服桂枝汤吐者，其后必唾脓血也。

桂枝辛甘，本有发散，服之反吐，其人里热素盛可知矣。里热更盛桂枝，更热而反吐也，盖里热，亦为收敛，故必唾脓血也。

酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

酒客里热之最，酒客喜辛，里热持苦药中，才扶升邪，必增渴逆，而以辛甘之药不可用，则制其里以撤其热，辛苦以清其热，自不待言矣。后人不知，每以葛根为酒客所宜，殊不知又

犯太阳经之大禁也。

上为桂枝汤三禁。

已上风伤卫

太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。

凡伤寒必恶寒发热，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧，或未发热者，寒邪初入，尚未郁而为热也。但景岳恶寒体痛呕逆，又未发热，恐误认作中阳虚之证，早于发汗之先，自持此语以司之。

病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也。身大寒反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

恶寒为寒在表，或身热恶寒，为热在皮肤，寒在骨髓者，皆误也。而《活人书》以此为表里言之，并伸景论，但分皮肤骨髓而不以表里者，盖以皮为表、骨为里者，主于外可充于身者也。骨曰髓府，方可言里。寸无皮肤即骨髓之上，外邪言浅之分。寸沉即皮肤之下，外邪言深之分，与经络言表、脏言里之例不同。凡言有表里之人，感邪发热，热邪言浅，不惟沉寒，故外法反欲得近衣，此言热在皮肤，寒在骨髓，为用了景论之一字于旺盛未热之人，或言各症感邪之初，寒未变热，阴邪因其伏热，内凝于外，热郁于内，故内填而不欲近衣，此所谓寒在皮肤，热在骨髓，为用了凉药矣。一友之问，表证正和，此仲景不言之妙。若以皮肤为表，骨髓为里，则麻黄汤证，骨节疼痛，其可名为有表复有里之证耶。

伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传。颇欲吐，若躁烦，脉数急者为传也。伤寒二三日，阳明少阳证不见者为不传也。

此条言邪欲传不传之候，以此消息，盖言起中焦，以寒邪伤营，必脉紧无汗，故欲传则欲吐，躁烦，脉数急也。若风伤

里，则自汗脉缓，故欲传，但有下咽而无汗，亦无躁烦脉数急之例也。

太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。

人身之阳，既不得宣越于外，则必壅遏于内，故令作喘。寒邪闭郁，故令脉紧耳。汗者自之反，汗为营，营法则腠理闭塞，虽热而不汗，故以麻黄汤重剂发之。《内经》所谓“开于腠，体若燔炭，汗出而散”是也。麻黄发汗最猛，故以桂枝监制之，甘草和之，杏仁润下以止喘逆也。方后者云“不可啜热”者，伤寒邪迫于里，本不能食，若强与食，反增其剧也。

脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。

脉浮而紧，当用麻黄。若浮而不紧，虽有似乎中风，然有汗无汗迥异，故不复言栝枝耳。至于浮数，其邪虽热已极，亦宜麻黄发汗无疑也。

伤寒发汗，解半日许，复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤主之。

一系汗后表证，风邪未入里也，言改用栝枝汤者，一以邪传卫分，一以营虚不能复任麻黄也。

伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗。若头痛者必衄，宜栝枝汤。

六七日不大便，明系里热，虽有热以汗之，更无汗出，故言头痛，必是阳明热甚，可与承气汤。然但言可与，不明言大小，其旨原不在下，不过借此以证有无里热耳。若小便清者，为里无热，邪未入里可知，则不可下，仍当散表，以头痛有热，寒邪拂郁于经，势必致衄。然无身疼目赤，是邪气亦不为重，

故不用麻黄汤桂枝，以散营中之邪热，则邪亦得解散矣。

太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗，麻黄汤主之。服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解，所以然者，阳气重故也。

世本“麻黄汤主之”，在“阳气重故也”下，今正之。

服药已微除，复发烦者，余邪未已也。目瞑烦剧者，热盛于里，故直照安卧时为证，则余邪随汗而解。以汗后复证，故为阳气重也。盖言汗后复证，而热邪仍未尽，所以麻黄汤散其未尽之邪，于是也。若果邪热不尽，为“阳乃解”，宁从何在？答：八九日不解，则热邪伤血已甚，虽已汗其汗，而营分之热不止尽除，故必致衄，然后得以尽其余热也。将何以目瞑，以次邪役血而上，故知已证乃解。盖全篇言“阳邪伤营血外衄，而外言明证”，又云，“阳气盛则自汗，阴气盛则目瞑”，以阳邪并于阴，故为阴盛也。

太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。

衄血成流，则邪热随血而散，今自患无汗也。设不言衄，当以麻黄汤发之，发之而邪解，则不衄矣。发之而余邪未尽，必仍衄而解。

伤寒，脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。

脉浮紧，当以汗解，无汗而邪郁于里不解，故致衄，衄必血出不流，此邪热不得发泄，则必不解，故以麻黄汤汗之，今汗则无血也。

但云：“衄家不可发汗”，“亡阳者不可发汗”，以久衄血已多，故不可发汗复夺其血也。此言衄血不止，热毒凝结而成衄，故宜发其汗，则热得泄而衄自止矣。

伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。衄家不可用

建中汤，以甜故也。

邪气内传而心悸，则气内击而心虚，将来邪与相搏，必致危困，急用建中补正祛邪，以免内入之患。又因心悸乃水饮停蓄，颇为心气不宁，故复以甘药之。在表乃身热在里，反禁甜味恋膈耳。

按：小建中本桂枝汤，风伤卫药也，中间但加饴糖芍以缓其脾，使脾胃行其津液，则营卫自和，即命之曰建中，其旨微矣。

脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之，假令尺中迟者，不可发汗，何以知其然？以营气不足血少故也。

尺中脉迟，不可用麻黄发汗，当与建中补之，和之可邪解，不必发汗，鼓不鸣，不好多击，候尺中有力，乃与麻黄汗之可也。

脉浮数者，法当汗出而愈，若下之而身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解，所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便自汗出愈。

误下身重心悸，虽脉仍浮数，亦不可复发其汗。良久脉微，为里则空虚，无为成也。脉浮而数，热邪已甚，将欲作干也，反误下之，致汗出内外皆虚，当以身重心悸，当与建中补其津液，必自汗而愈。

伤寒，头痛，翕翕发热，形象中风，常微汗出自取者，下之益烦，心中懊懊如饥，发汗则致疼，身虽难以屈伸，熏之则发黄，不得小便，久则发咳唾。

此名阳明之人，未表而里，小邪汗而反热而渴，有似中风之状，发故药中，使复当理中气以除其渴，则表邪乃得解散。设有下证，明证之利小便为主，若是用正汗而下法夺之，便有如上变证也。

伤寒，发热头痛，微汗出，发汗则不识人，熏之则喘，不得小便，心腹满，下之则短气，小便难，头痛项强，加针则衄。

阳虚多火之人，才感外邪，便发热头痛倍常，即辛凉发散药中，使自保其阳气。设用辛热止发汗药，非散反结，邪人弥甚，遂致项强不识人也。在汉唐以下论白，于无若是之时，于

已上寒伤营

寸口脉浮而紧，浮则为风，紧则为寒，风则伤卫，寒则伤营，营卫俱病，骨节烦疼，当发其汗也。

太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出，恶风者，不可服，服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也，以真武汤救之。

宗印：无后六字，日本作“大青龙汤主之”，今依《尚论》改正。

天地郁蒸，得雨则和，人身郁蒸，得汗则解。大青龙证，为其身中原有微汗，寒邪郁闭，不能透出肌表，由是而发烦躁，与麻黄汤证之无汗者迥殊，故用之发汗以解其烦躁也，所以暴病便见烦躁，信为营卫俱伤无疑。此方宗为不得汗者取旨，若汗出之烦躁，全非郁蒸之比，其不借汗解甚明，加以恶风脉微弱，即是少阴证之比。若脉浮弱于里，是风而不烦躁，即是太阳中风之证，皆与此汤不相宜也。设用此汤，于不致筋惕肉瞤而速其阳之亡耶？

按：误服大青龙亡阳，即当用四逆汤回阳，乃置而不用，更推重真武一汤以救之者，其义何居？盖真武者，北方司水之神，龙惟借

1 宗印：即《伤寒论宗印》，书名 八卷 清代医家张志聪撰

水，可能变化。设真武不与之水，青龙不能奋然升天可知矣，故方中用茯苓、白术、芍药、附子，行水收阴醒脾崇土¹之功，多于回阳，名为真武汤，乃收拾分驰离绝之阴阳，互镇于少阴北方之位，全在收拾其水，使龙潜而不能见也。设有一毫水气上逆，龙即遂升腾变化，纵独用附子、干姜以回阳，其如魄汗不止，何哉？人身阳根于阴，其亡阳之证，乃少阴肾中之真阳飞越耳，真阳飞越，亟须镇摄归根，阳既归根，阴必翕然²从之，阴从则水不逆，而阳不孤矣，岂更能飞越乎？

伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，小青龙汤发之。

世本作大青龙汤发之，从《内编》改正。

按：前条“脉浮紧，身疼，不汗出而烦躁”，皆寒伤营之候，惟烦为风伤卫，反以“中风”二字括其寒证，处方全用麻黄汤，加石膏以解内烦，姜、枣以和营气也。此脉浮缓，身不疼，皆风伤卫之证，惟身重为寒伤营血，然乍有轻时，不似伤寒之身重而烦躁。骨节腰脊，亦无少阴之身重但欲寐，昼夜俱重也。身重者，寒也，乍轻者，风也，虽营卫并伤，实风多寒少，反以“伤寒”二字括其风证，处方用桂枝加麻黄以散寒。盖营卫郁热，必作渴引饮，然始病邪热未实，水不能消，必致停饮作咳，故先用半夏以涤饮，细辛、干姜以散结，五味以收津，恐生姜辛散，领津液上升，大枣甘温，聚水饮不散，故去之。发之者，发散风水之结，非大发汗也。仲景又申明无少阴证者，以太阳与少阴合为表里，其在阴精素虚之人，表邪不俟传经，早从膀胱袭入肾藏者有之，况两经夹阴等证，临病犹当细察，设少阴不亏，表邪安能飞渡，而见身重欲寐等证耶？故有少阴证者，不得已而

1 崇土：重视脾胃

2 翕然：和顺貌

行表散，自有湿经散邪，两相增旺之法，岂可竟用青龙，立铲孤阳之根乎？

伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

此即言卫安营卫散邪，与表里之气相搏，则伤其卫。卫人所居之位，或上或下，或表或里，各证不同，而证方总同，但有一证，即见，即水证之证，便用小青龙汤散邪去水，不啻如大青龙兴云致雨之意也。

若微利者去麻黄，加薤白如鸡子大，熬，令赤色。若渴者，去半夏，加栝蒌根二两。若喘者，去麻黄，加附子一枚炮。若小便不利少腹满，去麻黄，加茯苓四两。若噎者，去麻黄，加杏仁半升，去皮尖。

本方主发散，故用麻黄。若主利水，多去麻黄，而加行水药也。薤白利水，水去利自止。喘者，水邪之气相搏于里，故去麻黄而加附子。

伤寒，心下水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之。服汤已，渴者，此寒去欲解也。

世本“小青龙汤主之”在“寒去欲解也”下，错简²也。

风寒犯水饮于里，卫阳人有汗而营卫未和，故不渴。服汤后，营卫俱和，故反渴。盖卫阳与营阴未得复，是为“去湿”之证，所以服汤后不必复与，应当静候卫阳自和。

咳而微喘，为水饮泛滥，今水去而渴，与水逆而渴不同。

已上营卫俱伤。

咽喉干燥者，不可发汗。

2. 错简：指古书中文字次序错乱。

其人言家津液素乏，所以心中干燥，若不慎而发其汗，重夺津液，则大其虚而脉数也。此与言中出外，似同而异，此戒发汗以夺阳明之津，彼戒发汗以夺少阴之血也。

淋家不可发汗，发汗必便血。

淋家膀胱素伤，更汗则愈扰其血，故从溺而出也。

疮家虽身疼痛，不可发汗，发汗则疼。

疮家其表素虚，营血暗耗，更发其汗，则生肌若虚，内血不营，必致疼也。

衄家不可发汗，汗出必额上陷脉急紧，直视不能瞬，不得眠。

久患衄家，清阳之气素伤，更发其汗，以虚其表，则与邪之逆脉之陷，故其额上不止生汗，不得眠。前目与衄皆和明之分也。此与“色白，脉浮紧，不发汗，因致衄者”，实为异脉，不可不辨。

亡血家不可发汗，发汗则寒栗而振。

血亡则阳气亦无伤，故其脉必微而迟，所以不发热而反寒栗也。

汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已，阴疼。

汗多者，重发其汗，则心液之部伤，则心神恍惚，膀胱之血亦伤，而便已阴疼也。

咽中闭塞，不可发汗，发汗则吐衄，气欲绝，手足厥冷，欲得蜷卧，不能自温。

其人言战汗素多，故咽中闭塞，汗之则气欲绝，自无所依，即吐血，厥冷，蜷卧，非四逆汤温经回阳可拟也。

1 眦(zì 字)：眼角。

咳而小便利，若失小便者，不可发汗，汗出则四肢厥冷。

咳而小便大者，属膀胱寒也。发汗必传少阴，而成四肢逆冷矣。

诸脉得数动微弱者，不可发汗，发汗则大便难，腹中干，胃燥而烦。

脉数而微，此为难者，乃表证自汗，汗之更耗其津，必胃干烦躁也。

诸逆发汗，病微者难差，剧者言乱，目眩者死。

诸逆发汗，言凡有偏胜之人，阴血本虚，若误用汗剂重夺其血，则逆者必重，重者转剧，逆者言乱目眩，以肝执牛风，风主眩晕故也。

咽喉干燥，不可发汗，常器之¹云与小柴胡汤。石顽曰宜小建中。叶家不可发汗，发汗必便血，常云猪苓汤。石顽曰本上黄芪建中。喻家不可发汗，王日休云小建中加黄芪，常云麻黄汤，桂枝加芍药汤。石顽曰温风发疹，桂枝加芍药汤。喻家不可发汗，叶家云黄芪建中，李时珍曰，加犀角。吕沧州云小建中加葱豉，误汗自汗者不治。王阳家不可发汗，常云小柴胡加芍药。石顽曰黄芪建中，麻黄汤，芍药桂枝汤加芍药。王日休云不可发汗，喻家云甘草干姜汤。孙兆云黄芪建中加葱豉。误汗自汗，炙甘草汤。按今言不可汗，此言大

1 常器之：即常頔士。宋代医家。

2 王日休：明代医家。撰《伤寒补遗》，后代。

3 吕沧州：即吕复，元明间医家，字元甫，号沧州。撰《长沙伤寒十辨》等书。

4 喻安常：即喻安时。宋代医家，自号藜水道人。撰《伤寒总病论》等书。

5 孙兆：北宋医家。撰《伤寒方》等书。

小便者，不可发汗，郭云：冬甘草汤，当汗即汗，有汗止未汗甘草汤加葱豉，以汗为度，当汗四逆，汗后小便又数，但冬甘草汤。诸脉行数动（胃者），不可发汗，郭云：小建中汤。王云：误汗则脚硬者，冬甘草汤。汗家重发汗，小便已而疼者，盖云：汗后余粮散。王云：用与余粮，亦有汗，生白术、赤小豆等分，捣筛蜜丸弹丸大，水煮日二服。

已上宿病禁汗例

太阳病欲解时，从巳至未上。

凡病在血分之证，必从其气分之土。土旺者，亥时已，故从巳午未之王时而病解。

上条太阳经自解候。

1. 郭白云：即郭雍，宋代医家，字子和，号白云。撰《伤寒和论》。

2 王：通“旺”。《素问·至真要大论》：“治其王气，是以反也。”

太阳中篇

中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入即吐者，名曰水逆，五苓散主之，多饮暖水，汗出愈。

伤寒原有汗，以其有汗也，延至日久，不行解肌之法，汗出愈多，有汗亡阳，表证不罢，转属阳明，邪入阳明，饮水则吐者，名曰水逆，与热邪相结于胃，故饮水格而不入也。表证虽罢，胃中犹热，当于胃表俱解，以阳明之证为战为汗散之时，以通调水道，则大热自化，津液得全矣。

发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。

水药不得入口为逆，言水逆也。若更发汗，必吐下不止者，以其原有蓄积未散，发汗徒伤胃中阳气之气，必致下利，若更发汗，则水饮上承而方寸湿，下泄而为泄利矣。凡发汗后胃寒，不独桂枝当禁，所以大引水止之证，不用表药，若五苓散以导水，服后虽犹热所以取汗，以胃气平表之证也。

太阳病，发汗后大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和为愈。若脉浮小便不利，微热消渴者，与五苓散主之。

太阳病，发汗发汗，致津液内化，胃中不和，水反于水，若水入不化，转属阳明，与无汗证相异于表矣。脉浮不沉，桂枝，有以发汗为禁，然热邪得水，反不愈，乃为表证未去，所以邪既还表，其热未散，所以小便不利，水饮内停，也。府热全具，故不单解而从两解也。

发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

发汗数日，脉浮数，则津液内化，转属阳明，里证已具，中散同化，所以用五苓散其内，而解其外，盖本用桂枝，桂枝

枝，从可推矣。

凡方中用一“桂”字，不分桂枝、肉桂者皆然，非独此也。

病在阳，应以汗解之，反以冷水濯之，若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散，若不差者，与五苓散。

此条曰“小阳病”，曰“反以冷水”，不可解。盖表邪不从表散，反灌以水劫其邪，必欲出汗，未入少阴之际，或犯太阳之本，故以芍药分主一按；又喻为邪气未入，中气未虚，欲欲饮水而反不渴者，其邪仍在。盖水与邪气孰多孰少未定，以其未入于里得汗出，故意欲饮水，然邪当在之中，未入于里，故反不渴，故与不用发汗收引芍药，使邪气变热，必致大渴引饮也，所以“反以冷水”云。“意欲饮水不渴者，反欲得下之”，可知文蛤散治阳分水劫也。按文蛤不在少阴之际，亦犯太阳之本，当与五苓散无疑。

身热皮粟不解，欲引衣自覆，若以水濯之洗之，益令热不得出，当汗而不汗更烦，假令汗出已，腹中硬，与芍药二两，如上法。

身热皮粟不解，欲引衣自覆者，此热在皮肤，邪在表也，法当汗出而解，反以水洗之，致令邪气内陷不出，汗止而反更热，似若面仍不解，似于邪气少阴之证，皮一又言反不解，盖邪定在少阴，故与五苓散和芍药之证，盖以芍药，有腹中反硬者，此又以五苓与芍药和之证。但芍药为药，与不用小建中，而反与芍药。又云“知下法”，何如？盖少阴与同气内陷，邪在少阴之证，当与小建中和之，误用承气下之，致邪内陷之腹硬，盖以桂枝加芍药和之。五苓利水，芍药引邪内陷之腹硬，仍用五苓加芍药和之。盖芍药不引手桂枝，芍药已。“知下法”，

者，言即入于先前所服之药内也。

伤寒，汗出面渴者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草汤主之。

汗出面渴者用五苓散，以邪气犯本，必小便不利也。若汗出不渴，则小便不利，以邪热浸淫，欲犯膀胱，而犹未全犯本也，故用桂枝汤主之。五苓散中之一，少示表里之意，为合剂耳。

太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸。小便少者，必苦里急也。

小便利者，以饮水过多，水与邪争，必心下悸也。小便少者，必苦里急，以是邪热足以渴水，故指为里证已急也。观上条“不渴者，茯苓甘草汤主之”，治法具矣。

已上风伤卫犯本

太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。

邪热搏结，在于膀胱，以邪热内传心火，故其人如狂，见心证不狂，有邪于外，以血方结，不似阳邪内传之狂越也。且自下者，邪热不结，故下。若少腹急结，则膀胱之血虽蓄而不行，当先解外乃可攻，其证法亦不同，必用桃仁加入承气以泻血热，仍加桂枝分解邪，即如五苓、大柴胡同表里同义。

太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所

以然者，以太阳随经瘀热在里故也，抵当汤主之。

此条之证，较前条更重，且六七日表证仍在，药力不先解其外耶？又岂为攻里药中不兼加祛瘀耶？以脉微而沉，反不结胸，知邪不在上焦而在下焦也。若少腹硬满，小便自利，则其人之发狂者，为血蓄下焦无疑，故下六日自愈。盖邪结于下，则用陷胸以条饮，邪结少腹，则用抵当以逐血，设于此去，则少腹所结之血，既不能气上行，更何药可破其坚卒哉！

太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。

血证为重证，抵当方重药，恐人当用而不敢用，故重申其义。言身黄、脉沉结、少腹硬三者，本为蓄血之证，然只见此，尚与黄相邻，必其人如狂，小便自利，为血证无疑。设小便不利，乃热结膀胱，无形之气结，为发黄之候也。其小便自利，则膀胱之气化行，虽与少腹结满者，元阳为有形之蓄血已。

伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。

之证为无者，恐前条之不足也，者即重言证之，与太阳病丸同意。

已上寒伤营犯本。

太阳下篇

太阳病二日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与也，观其脉证，知犯何逆，随证治之。

桂枝汤用过了日久，其证不解，是之坏病，是与过汗不解之病无别，仲景止言二日，未言言过今日久不解也。言病坏病者，言误汗吐下温针，病仍不解，表证已罢，邪气入里，不可复用桂枝也。设桂枝证尚在，不得谓之坏病矣。至于过汗不解，不但二日传之不尽，即十余日二十一日尚有传之不尽者，其邪犹在。言证已，故仲景主以大柴胡汤，柴胡汤言可同司邪气，随证治之，可解其热也。《金要略》云：七日太阳病表，大柴胡汤。可见太阳二下，有行之七日已上者。大柴胡汤言证多下，则邪明少阳亦可治，过二下复无解者矣。若谓六经传次，复传太阳，必无是理，盖有传过一经已系于里发热者，比于气内复，但邪出外自解，必不复传也，已有从少阳受传于里，复从皮毛出入太阳之事耶？

太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。

此不以司水与气治而治其甚者之大也。汗出最多，而热不退，则邪未去而阳气已大伤。心下悸者，水气上悸，头眩者，水气上冒，身瞤动者，水气上冲，振振欲擗地者，水气上冲，故以真武汤主之。

太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

大发其汗，致阳气不能卫外，汗出不止，故“发水汗”之方已。恶风者，表阳大虚，乃风邪袭也。小便难者，津液小，而不下泄，即阳气不化，而津液之气化不行也。四肢微

急、难以平伸者，过汗亡阳，筋脉失养，兼袭虚风而增其勾急，故加附子于桂枝汤内，温经散寒。用桂枝汤者，和在表之营卫加附子者，和在表之阳气，本非阳虚，是不同证也。

发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两，人参三两，新加汤主之。

此本桂枝证，误用麻黄，反伤营血，阳气暴虚，故脉又沉迟而身痛也。此脉沉迟与尺迟大异，尺迟乃阳气素虚，此六部皆沉迟，为发汗后虚，故仍用桂枝和营，加芍药敛阴，生姜散邪，人参辅正，名曰新加汤，明非桂枝旧法也。

发汗后腹胀满者，厚朴生姜甘草半夏人参汤主之。

此下腹胀为实，以邪气乘虚入里也。此本桂枝证，误用麻黄发汗，津液外泄，脾胃气虚，阴气内结，壅而为满，故以补脾和胃降气涤饮为治也。

发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

汗本心之液，发汗后脐下悸者，脾气虚而肾气发动也，明系阴邪留者，欲作奔豚之证，肾邪欲上凌心，故脐下先悸。取用茯苓桂枝，直趋肾界，预伐其邪，则中宫始得宁静耳。

发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。

发汗过多，误用麻黄也，误汗伤阳，胸中阳气暴虚，故叉手冒心，虚而欲得按也。本桂枝证，故仍用桂枝甘草汤，以芍药助阴，姜枣行津，汗后阳虚，故去之。

未持脉时，病人叉手自冒心，师因教试令咳而不咳者，此

1 中宫：指脾胃

必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗，虚，故如此。

此小人在阳虚之一端也，阳虚耳聋，与少阳传经耳聋迥别，承宜固阳为要也。又手冒心，加之耳聋，阳虚极矣。尝见汗后阳虚耳聋，诸医施治，不出小柴胡加钱，屡服愈甚，必大剂参附，庶可挽回也。

太阳病，当恶寒发热，今自汗出，不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之故也。一、二日吐之者，腹中饥，口不能食。三、四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

吐法之法，解散肌表风邪，全不伤动脾胃，若舍此而妄有吐法，口中亦有发酸之义，所以不恶寒发热，而反见吐病也。

一日病在太阳，吐之则腹中饥，口不能食，二、四日病在阳明，吐之则不喜糜粥，欲食冷食，皆胃气受伤之故也。然朝食暮吐，脾中之真阳亦伤，而不能消谷，故为小逆。

关上脉细数者，明系吐伤阳气所致。尝见外感之脉，人迎细弱，而气口连寸反滑数，人于人理者，以其曾经涌吐伤胃，胃气上乘于肺故也。

太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。

此以吐而伤胃中之阳，故内烦不欲近衣，虽呈虚烦之证，较关上脉细数而成虚热，朝食暮吐，脾胃两伤者稍轻，虽不致逆，医者能无过乎？

太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不可与之。

误下而阳邪内陷，然无包络，但仍上冲阳位，则可从表里两解之法，故以桂枝汤加于前方误用之药内，则表邪外出，里

邪内出，即用桂枝加大黄汤之互辞也。若不汗津，则里已受邪，不可与桂枝明矣。

太阳病下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。若微恶寒者，去芍药，方中加附子汤主之。

误下脉促胸满，无下利不止汗出等证。但胸满不解，未成结胸，故仍用桂枝散邪。去芍药者，恐其复随阳邪下入腹中已。脉促虽表邪未尽，然误下与汗不解，所以误下而损其胸中之阳也，加以微恶寒，则开胃中之真阳亦损，而重可用事矣，故去芍药之药，加附子以回阳也。设微见汗出恶寒，则阳虚已著，上邪邪上盛之比，足量不言汗出，然由微恶寒，合上条胸满观之，则必有汗出，暗伏汗出之机，故于去芍药方中加附子，真免阳脱之变，可见阳虚则恶寒矣，又可见汗不出之恶寒即非阳虚矣。至若桂枝证误下，下利不止，汗出而汗出，不恶寒者，则又邪并阳明之府矣。

太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。喘家作桂枝汤加厚朴杏子仁。

表邪因误下上逆，而见微喘，故仍用桂枝宣表，加厚朴杏子以下其气。若下利不止，而加亡气喘急者，乃是上争下夺，倾危之象，非桂枝所宜也。

按：寒伤营则喘，风伤卫则咳，此本风伤卫证，因误下而引风邪入犯营分，故微喘也。其寒伤营无汗证，亦有咳者，乃发热引饮水蓄之故，否则营卫俱伤之证耳。

太阳病下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也。脉浮者必结胸也，脉紧者必咽痛，脉弦者必两胁拘急，脉细数者头痛不止，脉沉紧者必欲呕，脉沉滑者协热利，脉浮滑者必下血。

脉促为阳邪上盛，反不结聚于胸，则阳邪未陷，可犹药从

表出矣，故为欲解也。脉浮者必结胸，即指促脉有串之，见促脉时承之以言，故之语也。“浮”字其下四句，言白系必胃痛，言而弦为胃拘急，言而数必太阳未止，皆太阳之脉，故主病亦在太阳之本。一段脉弦而紧，则邪气已入阴分，但入而未深，仍欲作吐，其无结胸证可待证，方可知矣。只因论中省用一个“促”字，三个“浮”字，后之读者遂眩，或谓紧者必一物，至少四，承之以言，此言为阳邪入阴，而主下利，奇阳助阳邪正在等分，扰其直而主下血也。夫太阳误下之脉，主病皆在阳在表，即有沉紧沉滑，亦不得以里同名之也。

按：脉促不结胸者为欲解，可知里不受邪矣。若脉促胸满者，桂枝去芍药，微恶寒者，加附子，及后“并病¹”例中葛根黄芩黄连汤证，亦是太阳之邪，因误下而陷于阳明所致。又厥阴例中脉促手足厥逆用灸一法，乃阳邪陷于阴分，则知脉促为阳邪郁伏，不与正气和谐之故，不当与结代浑称也。

王日休云：太阳误下之以后八证，其脉促，不结胸者为欲解，不必药，脉浮者必结胸，桂枝去芍药汤。脉紧者必当加甘草汤。脉弦者必胃拘急，小柴胡加桂枝。脉数者太阳未止，宜用四逆汤。脉沉紧者必欲吐，甘草干姜汤加黄芩。脉沉滑者内结利，白术芍药汤。脉下利者必下血，芍药甘草汤加秦皮。

太阳病，先下之而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒，冒家汗出自愈。所以然者，汗出表和故也。得里未和，然后复下之。

冒者，神识不清，似有物蒙蔽其外，所以必须得汗自出，未尝当用药也。得里未和，视其便利否，再一分解其邪。若

1 并病：见本书下卷《合病并病篇》。

论用药，表无过建中，里无过大柴胡、五苓矣。

或云又手自心口已，胃力妄过，胃中清习气伤，故又手自心，必补气以助其作汗，宜小建中倍芍药，芪附服乃差。若尺中迟弱者，更加熟附子一两分，可见昏冒耳昏，非大剂温补不能取效也。

太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解。但阴脉微者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤主之。

病久不解，不过入阳入阴之一途，脉既阴阳俱停，初九偏阳，可以解矣，犹必先振栗，始得汗出而解，庶可知也。设不振栗，则邪不正传之于表，而九从得汗可知也。然既云阴阳俱停，则在无脉与脉俱微处，今阴阳俱不显著也，亦既阴阳俱停，其传表传里未可预定。所以太阳脉微者，方是邪不能传表，当从汗之而解。但阴脉微者，方是邪不能传里，当从下之而解。此其故甚可思也。若于邪正不传之时，则阳脉微者当补其阳，阴脉微者当补其阴矣，岂有反汗之而伤其阳，下之而伤其阴哉？

太阳病，二日不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也。反下之，若利止，必作结胸，未止者，四日复下之，此作协热利也。

日不能卧，但欲起，阳邪熨盛，逼处于心膈，扰乱不已，所以知其心下必结，然但是欲结之象，尚未至于结也。若其人脉微弱者，此本素有停饮积于心膈之分，适与外邪相结，外邪方熨，其不可下明矣。反下之，若利止，则邪挟乘虚入膈，

1 逼处：紧靠；邻接。

必与邪气上结。若利未止，因复下之，使邪邪不复上结，亦将差几错，因势利导之法。但邪热从表解极易，从里解极难。协热下利，热不尽，其利漫无止期，亦危道也。

大下之后复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利必自愈。

凡病若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。

其人已亡津液，复强责其小便，况亡津液之气化不行，转增满硬胀喘者甚多，故宜以不治治之。

已上风伤卫坏证。

发汗后不可更行桂枝汤，汗出面喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤主之。

发汗后饮水多者必喘，以水灌之亦喘。

本条伤寒麻黄汤证，乃误用桂枝汤因之，其不得泄，气逆变喘。然有大热者，悉兼里证，若无大热，为表邪实证可知，乃与麻黄汤除去桂枝而加石膏。去桂枝者，恐复助营热，已误不可再误也。加石膏者，用以泄营中之热也。至于内饮水多，外有水灌，皆足以致邪由表而内，不独误行桂枝汤为然也。

下后不可更行桂枝汤，若汗出面喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

易桂枝以石膏，少变麻黄之法，以治误汗面喘，当矣。误下而喘，亦以桂枝方戒，而不越北方者，何耶？盖中风伤寒，一从桂枝，一从麻黄，分途异治，由中风之误下而喘者，用子朴杏仁加入桂枝汤中，则伤寒之误下而喘者，用石膏加入麻黄汤中，两不移易之定法也。

伤寒五六日，大下之后，身热不去，心下结痛者，未欲解

也，栀子豉汤主之。

发汗，若下之，而烦热，胸中窒者，栀子豉汤主之。

发汗，吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反覆颠倒，心中懊恼，栀子豉汤主之。

若少气者，栀子甘草豉汤主之。

若呕者，栀子生姜豉汤主之。怱、忡同

胸中窒者，窒比结证也较轻也，虚烦不得眠，即下条“卧起不安”之互辞也。反覆颠倒，心中懊恼，乃邪甚于虚，由余邪阻遏，不能传散，无可奈何之状也。此时将汗之手一下之手，和之手，温之手。仲景巧用栀子豉汤，涌载其余邪于上，使汗而尽传无余。然虚无形之虚烦，用此为宜。若语上实烦，仲景别有玉蒂散，岂非栀子证也。乃因汗吐下后，胸中阳气不足，最虚之处，便是客邪之处，若一气暴上，余邪不尽，则仲景原有炙甘草一法，宁敢妄涌以犯虚虚之戒？

伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。

胸中不烦，即里证已具之实也。烦而不满，即表证未罢之虚也。今胸有之，且卧起不安，则是邪在胸表腹里之间，故取栀子以快其胸中之邪，而合厚朴。根实以泄腹中之满也。

伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。

丸药大下之，徒伤其中，而不能荡涤其邪，故栀子合干姜用之，亦温中散邪之法也。

凡用栀子豉汤，病人旧有微溏者，不可与服之。

旧有微溏，则大肠易动，服此不但不能涌涌，反为下泄也。

伤寒，脉结代，心动悸者，炙甘草汤主之。

或问炙甘草汤一证，但言脉结代心动悸，并不言从阳证见

何由，皆服何药而发。第其方，不出乎益养真阴，回阳固本，其和营散邪之剂，必家其人胃气素虚，所以汗下不解，胃气转伤，真阴耗竭，遂致心悸脉代，与水口心悸之候，似是而非。水口候心悸代，加之以治，则胃气虽方，而有品物伏留，故其方直心，与阳相背，所以动悸不止耳。邪留不解，因已大方，汗至小发在也，和营散邪，乃方合去。方中大参、甘草，补益胃气，桂枝、姜枣，调和营卫，麦冬、生地、阿胶、麻仁，润燥养血，复脉定心，尚恐药力不及，更用清酒以协助药力。津液枯竭之人，服乃一便秘涩之药，其麦冬、生地、酒，必耗元之化源，麻仁、阿胶，专主大药之粘约，免致为虚泉竭，火燥血枯，此仲景救阴退阳之特识也。

伤寒，发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。

伤寒发汗已，热邪虽发，何由反黄身目为黄。所以然者，胆胃持重，适在驱邪之里，故尔发黄也。里者，在内之通称，非谓寒湿深入在里。盖身目主由驱邪，与黄府无关也。于寒湿中求之，即下文三法也。

伤寒瘀热在里，身必发黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。

伤寒之邪，得湿而不行，所以热瘀身中而发黄，故用外解之法。设谓“里”字，岂有邪在里而反治其表之理哉。

伤寒身黄发热者，栀子檗皮汤主之。

热已发生于外，汗与内寒不同，正当随热势清解其黄，使不留于肌表之间。此条热瘀在里，故用栀黄发之。此条发热在

2. 乐 (shuò 硕): 侵入。此指耗伤

1. 此条黄证

表，反不用麻黄者，言身重之证，难于得热，热则其势外出而不内入矣。所谓于寒湿中求之，不可泥伤寒之定法也。

伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。小便当利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

色黄鲜明，其方一剂之热无甚。小便不利，腹微满，乃湿邪之本证，不得因此指为伤寒之里证也。方中用大黄者，取仿茵陈栀子，建导引里热之力，以利小便，非利下也。然二便有偏阻者，有因湿邪不利而方中无方不利者，如第明而不更衣，十日无苦，渴者与大黄散一条，非里热扶津液下渗膀胱所致大便枯燥不利也。盖因里热郁结，小便不利，致表微满，故少与大黄，同水道功，并通下焉，则二便俱得通利，有里热势杀，得以分解矣。

或问仲景既云身重，而用药又皆祛里热之味，其故何耶？盖始本以湿袭于肌表，久之则气郁复，则郁发可为热矣。若混“寒”字，全失移寒化热之义。

下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。

误汗亡阳，误下亡阴，故内外俱虚。虽不出方，其用附子回阳，人参益阴，已有成法，不必赘也。

下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。

日多躁扰，夜则安静，盖阳不亡，邪阳尚可回矣。无表证自

1 更衣：古时指大、小便的通称。

2 余（shai 晒）：同或；吹止。

脉沉微，与太阳之邪已尽矣。以下后复发汗，抗其虚阳，故用附子、干姜以温补其阳，不用四逆者，恐汗节愈胃故也。即汗止，小便数，四肢厥，此也，用干姜、甘草以温胃复阳，不用四逆者，恐附子峻下故也。

发汗病不解，反恶寒者，虚故也，芍药甘草附子汤主之。

未汗而恶寒，邪盛而表实，已汗而恶寒，邪甚而表虚，和虚则恶寒，宜用附子以实之。然既发汗不解，可知其热犹在也。热在面别无他证，自是阳虚之热，又当用芍药以收阴，此营卫两虚之救法也。

发汗后恶寒者，虚故也。不恶寒但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。

恶寒者，汗出营卫皆虚，故用法以收敛固阳而和其营卫。不恶寒者，汗出表气未虚，反加恶热，更津亡胃实可知，故用法以正实而和平。然曰“与”，似大有药量，其不当径行攻下中虚津液，从可知矣。

伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里。后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。

下利清谷，阳气内微也。身体疼痛，表邪外盛也，云当急救其在里之微阳，俟其清便调和，则在里之阳已复，而身痛不止，明是营卫不和所致，又当急救其表，使外邪仍从外解。夫救里与攻里入渊，若攻里，必须先表后里，惟在里之阳寒极盛，恐阳气暴脱，不得不急救其里也。厥阴篇：下利腹胀，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，是互此意。

① 厥阴篇：见本书上卷。

病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。

病发热头痛者，太阳伤寒，脉反沉者，其人本虚，或病后阳气弱也，虽脉沉体虚，以其有发热表证，而用解肌药，犹不为差，反加身疼者，此阳虚为甚可知，宜与四逆汤以阳散寒，不解表而表解矣。盖太阳居犹为肾之府，肾中阳气同盛，势必传出于府，故宜四逆以清阳复阳。倘服四逆后，脉变浮数，仍身疼头痛热不退者，此里得药助，邪邪外散之候，仍少用桂枝汤佐其作汗，更不待言。

已上寒伤营坏证。

太阳病，得之八九日如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不可吐，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗更下更吐也，面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，为自初至今之证。下文乃是以后拟与防变之辞，分作二节看：其人不可吐，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈，此一节乃表和证，而脉微者，邪气微衰也，阴阳相等，脉证皆同，同安之兆，可不待汗而欲愈。若脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更汗更下更吐也，此一节宜与证之一面上反有热色者，未欲解也，以不能得小汗出，其身必痒，桂枝麻黄各半汤，此一节必待汗而解也。

本节类似小柴胡证，故以不可吐清便自可证之。次节虽脉微

1 宜：锦章书局本作“必”

恶寒，正于小建中加黄芪，以一分二，司升一，以司升合之²。后节“面色反有热色”，言表邪未尽，故宜各半，不可与“面合赤色”比类而观也。

太阳病发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可复发其汗，宜桂枝二越脾一汤。

“无阳”与无津液之句并，言胃阳亡，阳为阳气，无阳为胃衰，故不可更汗，然言阳亡而冬不解，故取桂枝汤以言风邪，反汗之一以言郁热。越脾者，有言之辛凉以化胃之郁热，则热化津生而阳气发越，可以任其自复也。世本作“越婢”，言原为小姑，比之女婢。若此用“越”字又误。字使不义矣，今从《外台方》正之。

服桂枝汤大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法。若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

此风多阳分之证，服桂枝汤，言反自汗其汗，汗反大出，脉反洪大，似乎风邪再盛，故仍以桂枝汤和之。若其风邪之故立解矣，若多如前，日再发，此邪未全解，故方微加麻黄，故略兼治寒而汗出必愈也。

此条前半与《伤寒论》第22条同。《伤寒论》第七条件之“大烦渴”一句，言大烦渴，则其能饮水，故为伏气，非经证也。日即止也。

且此方与各方之品不殊，其药分一与异，其药量仅一分，可见仲景于差多差少之间，分毫不苟也。

服桂枝汤或下之，仍头项强痛，翕翕发热无汗，心下满微

2 候分：分毫。

3 候(yōu 悠)：相当于“呵”。

痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

治风而重其水，所以不解白术、茯苓，则在表之风未除，而在里之水饮上逆，故反加芍药用白术、茯苓为主治。去桂枝者，已误不可复用也。

张锡驹曰：症饮停水，故芍药半反，可见此证误以胃虚，故无汗耳。

此条看似常例，所以知为太阳表证尚在，全重在芍药反也。

发汗若下之，病仍不解烦躁者，茯苓四逆汤主之。

此条与龙胆证发汗下而转增烦躁也。误汗则汗邪入表虚，误下则亡阳正里虚，阴阳俱虚，邪独不解，故生烦躁，用此汤以救之。白术为亡阳，茯苓为虚，故用干姜、附子大药以回阳，茯苓、人参入心以解烦也。

人不亡阳之烦躁，与发汗后之烦躁，绝异千里，不亡阳之烦躁，不沉脉，按人青龙，乃有亡阳之证，是谓发汗后之烦躁，即不误在药，已误在汗矣。

伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。

此条与龙胆证发汗下而转增烦躁也。心下逆满，气上冲胸，风邪持饮；起则头眩，乃起则头眩，心下逆满，气上冲胸，水邪入内，亦可其饮也。脉沉紧，曰紧，邪在胃中，若白饮，以强留其外，水邪在胃，故水邪，反是伤动经，有身为振振之患。

1 张卿子：即张隐村。明末清初名医，字和子，号树猷。撰《张卿子伤寒论》等书。

2 运动：使……动。

矣。遇此等证，必兼涤饮散邪，乃克有济，小青龙本证，全是此意。但始病重在风寒两受，不得不乎在表，此吐下后复汗，外邪已散，止存饮中之邪，故以桂枝加入制饮药内，使饮中之邪尽散，津液得以周布而意养其经脉也。至若吐下后重发汗太过，亡阳证逆烦躁，或仍发热心悸，头眩身重动，振振欲擗地者，又属真武汤证，非此汤可能治也。

伤寒吐下后发汗，虚烦，脉甚微，八九日心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动惕者，久而成痿。

此即上条之证，而明其增重者，必致发也。曰虚烦，曰脉甚微，则津液内亡，求上条之脉无紧力不可得矣。曰心下痞硬，曰胁下痛，较上条之心下逆满更甚矣。曰气上冲咽喉，较上条之冲高更高矣，此皆误饮上逆之故。逆而不已，上冲头目，因有眩冒有动，则不但身为振振，其颈项间，上则即同胡秦之矣，则气上入高巅，则头愈重而益振振矣。上盛下虚，则是必先烦矣，此证虽于心下逆满，气上冲胸之日，茯苓桂枝白术甘草汤早已用力矣。

伤寒八九日，风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，与桂枝附子汤主之。若其人大便硬，小便自利者，去桂枝加白术汤主之。

风湿相搏，止是流入关节，身疼极重，而并无疼痛渴等证，见邪留之邪，难犯胃而截府之界也。不呕者，上无表邪也，不渴者，内无热积也，加以脉浮虚而涩，则为风湿搏于躯壳无疑，故用桂枝附子，疾弛经络水道，以桂枝散表之风，附子逐经之湿，迅扫而分渴之也。其小便利，大便坚，为津液不足，故去

① 克：能够。

桂枝之辛散，而加白术以助津液也。

风湿相搏，骨节烦疼掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

风则上先受之，湿则下先受之，二者至两相搏聚，注经络，流关节，游行体躯壳之间，无处不到，莫无处不可也。于中短气一证，乃汗多汗闭，阳气大伤之证，故用甘草、附子、白术、桂枝为剂，以复阳而分解内外之邪也。

伤寒脉浮，自汗出，小使数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤欲攻其表，此误也，得之使嗽。咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。若嗽愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤。若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。

此阳虚营卫俱伤，误用桂枝，治风恶寒，治表虚里之受湿也。脉浮自汗，证为在表之风邪，自小便数，心烦，为邪又在里，加以微恶寒，则在里为里邪，更加脚挛急，则里邪逆事矣，乃用桂枝独治其表，为阳愈虚，阴愈无制，故得之使嗽也。桂枝误矣，麻黄、青龙更可知也。咽中干内凝，为无攻表之理，甘草干姜汤复其阳者，即所以救其寒也。嗽愈足温，不但不必平寒，且虑前之辛热有伤其阴，而是乎转铜¹，故随用芍药、甘草以和润，而伸其脚。设胃气不和而谵语，则胃中津液为热所耗，故少与调胃承气汤以和胃而止其谵语，多与则为下而和矣。若不知此证之不可汗，而重发其汗，复加烧针，则阳之亡者必速，亡阳，阴之无制者必致犯上无等，此则用四逆汤以回

1 逮（dài 代）：到

2 铜：同“耗”

3 逮：到

其阳，尚恐不胜，况可兼阴为治乎？

此证始终只是大阳，其脉浮且大为阳证，两脚重而不温，乃阳气素下虚，至于心腹小便数，不独真阳亏虚，而真阴亦亏，所以才用阳旦，遂变厥逆也。

阳旦：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语，师言：夜半手足当温，两脚当伸。后如师言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮则为风，大则为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病证象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经亡阳故也。厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结，谵语烦乱，更饮甘草干姜汤。夜半阳气还，两足当热，胫当微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸，以承气汤微溲，则止其谵语，故知病可愈。

阳旦者，桂枝加黄芩之剂，本治冬温之的一方也。以其心烦，小便数，有似冬温，所以与之一。因其人阳气素衰，所以行汤使厥已。若重发汗，或烧针者，误上加误，亡阳之汤不能回其阳矣。此证既象阳旦，又云按法治之，即是按冬温之法也，所以病入得之便数。明明误在黄芩，助其阴寒，若单投桂枝，何至是耶？故仲景即行阳旦之法以救其失，观“增桂令汗出”

语，岂不昭昭乎？阳旦不足，更加附子温经，即阳中干，阳明内结，谵语烦乱，皆不为意。且重饮甘草干姜汤，以俟夜半阳回是热，后果如言，岂非先有所试乎？惟黄芩入口而便数，未几即以桂、附、干姜尾其后，固知其家必不久，所以可西夜半手足当温，起谵语。阳旦、热证相错，其证重芍药甘草汤可知。

1 的（dī 敌）：此指标准

2 互（hù 互）：冻结

故才得足温，即便以和阴为务，何其审！哉

已上营卫俱伤坏证

太阳中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常度，两阳相重灼，其身发黄，阳盛则欲衄，阴虚则小便难，阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还，腹满，微喘，口干，咽烂，或不大便，久则谵语，甚者不得眠，手足躁扰，捻衣摸床，小便利者，其人可治。

风，阳也，火，亦阳也。邪风更被火热助之，则有气血流溢，所以失其常度，举身为证。然邪客于阳位者，当或可从阳解，可从汗解，至于阳邪深入阴分，势必灼尽津液，所以剂颈以下，不能得汗，口干咽烂，脏焦咽促，身体枯燥，小便难，大便难，手足扰动，捻衣摸床，乃大邪内攻，直可亡尽之象，非药力所能胜者，必其人小便尚利，阴未尽伤，阳气未绝，犹能气化，泽水不枯，始得行邪阳散亡之法，故家已言“阴阳俱虚竭”语，遂谓小便利者，阴未尽伤，则阳犹在手，是决可药力回阳，大失经旨。不知此证当察其血，以存阴之一法，尚恐不可，况可助阳以复其阳乎？且夫汗乃营卫主事，不下垂于阴，所以剂颈以下不能得汗。设见衄血，则邪从阳解，头汗目无汗，身没有汗，则邪从汗解，又不固矣。若条大邪深入必亡白之一证，亦谓身体枯燥而不得汗，必致亡阳，没有汗，更不当有汗，岂有得汗而又加重亡阳之理哉。又岂有阳身无汗，而头汗为亡阳之理哉？

太阳病二日，烦躁，反覆其背，而大汗出，火热入胃，胃

1 审：详细；司主

2 圊（qīng 青）血：大便下血

中水竭躁烦，必发谵语，十余日振栗，自下利者，此为欲解已，故其汗从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数而反不数，及多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也，

火邪入胃，十余日不得汗，忽从腰以下下利者，火邪从大肠下合，其候本为欲汗，然与不得汗者，以其从腰以下不得汗，邪虽下走，终不外出，故不得汗也。上条从腰以下不得汗，其势重，此条从腰以下不得汗，其势较轻。足下恶风者，邪虽邪在下，小便不得，见邪邪同排与汗也，与不得汗同，所以大便亦硬，谷气下利之下利为大势急者，火势衰大则利止也。反呕者，邪欲从口出也，欲失溲者，邪欲从阴出也，十余日欲解之时，胃火既戕，小便当数复不数，此津液竭也，受下利因津竭，则久利之大便秘出，大便出多，则小便之当数者始数矣。身重之时邪热既散而不得汗，则腰以下之得汗，亦可得矣。得汗为胃分之阳邪尽从外解，然后身重以下之阴气得止而反大热，身重以上之阴气得下而反足心热，欲解之候有如此，火邪助者为何如哉。

太阳病，以火重之不得汗，其人必躁，到经不解，必清血，名为火邪。清、圈同。

火邪入胃，胃中多水液者，必合于下利，若胃中少津液之人复受火邪，则必加重其不汗，身重躁入胃平为清血也。若火邪不解，得以入于胃中，灼其津液，则邪邪不尽，其胃即必无止期，故申之曰火邪，示人以治火邪正不治其血也，

微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦躁，追虚逐实，

1 奔：清康熙重刻本作“速”。

血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。

脉微而数，无复多热之证也。此谓灸之，则虚者益虚，热者益热，不至伤残不止耳。

烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从小腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两。

奔豚者，气邪也，主方为邪，作桂能伐，所以用桂一倍，加入桂枝汤中，以外解风邪，内泄阴气也。

形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火者必谵语，弱者发热，脉浮解之，当汗出愈。

形作伤寒，东垣所谓身力感寒是也。以其人本虚，故脉不弦紧而弱。弱者，津液本少，不能胜邪也。被火者谵语，火气伤阴，阳神昏乱也。弱者发热，更伤阴面也。被火后脉不数疾而反浮，知邪未入里，犹宜汗以和表，则火邪亦得外散矣。没见数疾，当兼分利渗泄，具见言外。

太阳伤寒者，加温针必惊也。

言发汗，言自得之，言其热，言灸于心，引热邪上通神明，必致惊惶神乱也。

脉浮宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下重而痹，名火逆也。

外邪挟火势上逆，而不下通阴分，故重而痹也。

脉浮热甚，反灸之，此为实，实以虚治，因火而动，必因燥唾血。

热证为表实，反以火治其热，热增而阴上行，故因燥而唾血也。

1 惊（bei 惊）：昏乱，怔忡矣。

伤寒脉浮，反以火迫劫之，亡阳必惊狂，起卧不安者，桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤主之。

火迫阳浮，起卧不安者，大邪入心，神明扰乱也。人仲最主救其表，何桂枝方反去芍药，加蜀漆龙骨牡蛎等药？盖邪在表，当求之于阳，桂枝汤主之也，今反去芍药之阴药，加蜀漆龙骨牡蛎之性最急者，以急扫其阳浮之邪，更加龙骨牡蛎以镇固阴中之怯也。

火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。

此证误汗又误，虽无阳狂与阴，然烦躁则少阴之证，亦真阳欲亡之机，故用桂枝以解其外，龙骨牡蛎以安其内。不用芍药者，以中气邪未全一也，无取芍药以益耗散也。

营气微者，加烧针则血流不行，更发热而躁烦也。

营虚之人，即有少伤营，营卫俱内陷，少阴少建中和以之，故不得用重药。青龙发汗，汗针药不可用，况烧针乎？设误用烧针劫汗，则阳得大邪，必随汗全亡分，故曰“加烧针则血流”，少阴热于少阴，不能内荣，故曰“不行”。所以卫愈旺而营愈衰，更加发热躁烦，势所必至也。

发汗太多亡阳不分营卫，以大方向邪，亡阳同证，治此者，但当救阴为主，不必问其风寒营卫也。

已上火逆证。

阳明上篇

阳明病，在一阳之时，用在外者，当表证，然阳明人不能食，仍不能食之乎，然犹犹泥中耳，盖又不必其大寒也，但以大寒为未足，汗自出者，可用桂枝汤。无汗脉浮者，可用麻黄汤。少汗脉沉者，可用承气汤。脉长而大者，可用葛根汤。分证表里之妙，必从脉证求之，脉长而大者，可用葛根汤。人并且可以汗之，故以承气汤为力高。其有证虽有一阳之时，而其中九在不能食为证者，不能食为得表。大都能食者皆可攻下，但有反急之脉，惟是胃弱不能食者，乃有扶虚里、扶热里之不同。所以用白芍、发汗，少阴白脉迟，当用理中。恶寒则畏寒，恶寒，不大便而恶寒，当用承气汤了，不可初于府病为阳，概用寒下，而禁用温剂也。

阳明病，若能食，名中风。不能食，名中寒。

风为阳，阳能清谷，故能食。寒为阴，阴不能清谷，故不能食。言邪入阳明，已至中焦胃土受食之处，言寒一证，似难分辨，惟能食不能食差有据耳。

伤寒三日，阳明脉大。

阳明气血俱多，故其脉长而大。

脉浮大，应发汗，医反下之，此为大逆。

阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。

阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

此二条言风邪入阳明，未为太深，故内用桂枝汤。且，则风邪仍从卫分而出，用麻黄汤发汗，则寒邪仍从营分而出，实一证而治法不同，盖之全在于脉证。风邪之热传于阳明，

自汗已多，则反去，可知迟在表邪之脉传至里也，发热已甚，则紧去而浮在，此皆邪气在经之证。若传入于里，则迟者必数，滑者必实矣。设不数不实，定为胃虚不能攻下之证也。

阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人必咽痛，若不咳者，咽不痛。

此胃热与风邪上攻之证，以风主主动故也。风邪攻胃，胃气上逆，则咳。咽喉者，胃之系，故其属咽也，故必咽痛，当伏葛根枝口本甘草汤以散风邪，祛胃热。若胃气不逆则不咳，咽亦不痛也。

阳明病法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。

此胃热协邪居于皮肤之证也，言久虚者，谓所以不能透出肌表之故，宜用桂枝汤以助卫气为主之，非谓当用补也。

阳明病，反无汗而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。

阳明无汗而咳，手足厥者，得之营卫俱伤，而邪热入深也。然小便利，则邪热不在内而在外，不在下而在上，故当必苦头痛，仍宜小青龙主之。若不咳不呕而小便利者，邪热必从水道而出，岂有逆攻巅顶之理哉？

阳明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

欲水不欲咽，知邪入血分，血为清，故不能咽水也。阳明之脉起于鼻，血得热而妄行，必由清道出也。

脉浮发热，口干鼻燥，能食者则衄。

能食，知邪不在里而在经，故必衄。

阳明病，脉浮而紧者，必潮热，发作有时，但浮者必盗汗出。

脉弦紧有潮热者，太阳之邪欲入阳明之时而未入也。邪虽未入，而潮热之证已形矣。脉但浮而余证未出者，太阳之邪尚传少阳之经而未传也，经虽未传，而盗汗之证已见矣。盖少阳气血俱少，本不主汗，以其邪热在里，迫津外出，而阳明内热自出，故不得中。余证未出，胃气不和，因表证皆，引邪热得以透出，所以盗汗虽为少阳证而实不外乎阳明也。

阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差，外不解，过十日，脉续浮者，与小柴胡汤，脉但浮无余证者，与麻黄汤，若不尿，腹满加哕者不治。

此条阳明中风之证居七八，而中寒之证亦居二三。观本文不得汗及身重等语，其义已见也。此证与太阳证相类，以太阳之脉证证之未定，而少阳之证亦未定，是邪欲入之证，而身重等，不能传故也。太阳证之证，必先于表传里，里传则反出，表邪传里，清其里气也。其里气不传者，不传于里也。身重，不能传，邪无从入也。仲景于此证中特举一不传之妙理，予与九人在生，言不出其所言者为何事，曰：身重浮大而短气反逆，连腹都满者，邪不传也。胁下及心痛，乃中久按之气不通者，邪不传也。鼻干，不得汗，嗜卧，表里俱困，乃至一身及面目悉黄者，邪不传也。小便难，有一块，身重等，皆热以盛，上下通旁入，邪不传也。耳前后肿，刺之小差者，曰邪不传，乃致外扶其邪亦不散，但其邪小差也。外不解，可经十

1 挈(qiè切)：提出；指出

2 穷：处境恶劣

日，留连极矣。所谓“万物所归，无复传”者，原为大事，孰知阳邪归之而不传，反成如此危候耶？要知阳邪之邪，乘于太阳，去自少阳，所以脉洪大者，与小柴胡多推其邪，使邪自少阳去路也。脉但浮无余证者，与直黄多推其邪，使邪还太阳去路也。若不大，微，身重肢困，不、与柴胡更加妙，得复愈也。盖此上矣，身有与法可以逐其邪，使之传心，不失，岂有十余日后无故张皇²，反用麻黄之理哉？

食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之，得汤反剧者，属上焦也。

此条¹原有大忌，亦有“吐”，本证不同。若食谷欲呕，则属阳明，与太阳证²原有之热证相反，正欲以吐其邪，呕已然，吴茱萸汤转属者，仍属太阳热证，与阳明证同矣。

伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻也。

呕多与邪在上焦，虽有阳明证，表不可攻，攻之必邪气乘虚内犯也。设有少阳证¹也，亦当从和而治，断不可行攻下法也。

夫病阳多者热，下之则硬。

阳明证多，即有阳明证见，亦与阳明证不可下也。不当下的，误下之，则阳邪乘虚内陷，不作结胸，则为痞硬也。

无阳阴强，大便硬者，下之必清谷腹满。

无阳阴强，言其人津液内亡，胃中阳气空虚，阴邪上逆，所以格拒不食，此与以下证同也。若因其格拒不食，必欲使利而谷自腹满也。少阴证¹或表证²下，亦有此证。然阳

同九条明强反下，此条反下，即用四逆汤，若少阴中风，下而清谷腹满者，即用四逆汤，恐亦不能挽回也。

已上俱阳明经证。

阳明病欲解时，从申至戌上。

上条阳明经证自解候。

阳明下篇

问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？
答曰：太阳阳明者，脾约是也。正阳阳明者，胃家实是也。少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥，烦实大便难是也。

脾约者，其人津液少枯，邪热在大阳，则大便难是也。太阳阳明者，太阳病邪热不解入阳明，则传入是也。正阳阳明者，太阳传阳明，表邪里，故云胃家实也。少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥，烦实大便难，津液耗竭也。以上三以阳明“传少阳”为少阳阳明，也，若邪传少阳，则胃中未必便难，大便难，如果邪不传少阳证，即言言少阳少阳，不得谓之少阳阳明矣。

阳明之为病，胃家实也。

问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明，不更衣，内实大便难者，此名阳明也。

问曰：阳明病外证云何？答曰：身热汗自出，不恶寒，反恶热也。

问曰：病有得之一日，不恶寒而发热者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，上也，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。

本太阳初得病时发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。

伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属阳明也。

伤寒转系阳明者，其人濇然微汗出也。

既濺然汗出，则热除呕止可知

脉阳微而汗出少者为自和也，汗出多者为太过。阳脉实，因发其汗，出多者亦为太过，太过为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。

中风之脉阳微而汗少者，为风邪未散，汗出少而不为汗也。伤寒之脉已至下关，即当去太阳而攻胃下之津液。不可发其汗，宁无亡津液，大便因硬，致传阳明之证乎？

已上统论阳明府证传受

阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，若下之，则腹满小便难也。

此证与阳明中风，而汗出亡津，太阴未愈之证，但以腹满而喘，知以方误入阳明，然此与太阴大证不同。若误下，反书愈陷而腹愈满矣。小便难者，亡津液也。

阳明病脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作谷疸，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

脉迟明表证将罢，然得食而微烦，仍是外邪未去其内热已头眩者，风邪未散已。小便难者，津伤水乏也。水谷之精，得热而同时身发黄，下之良为知反，言反为已是邪陷，脉迟则得下实，往下其邪拒，病就不除，而反苦之耳。夫阳明证不当下，若明言谷疸，尤当急下，独此言下之腹满如故者，言脉迟则胃气下衰，津液不充，其胃不可再热内实，非言热当下之证也。可见身虽发黄，下之无益，当发汗利小便之法，利之无益，恒当用桂枝，以甘药土安为无汗其中，然汗少与同时表利胃气是也。

阳明病若中寒，不能食，小便不利，手足濺然汗出，此欲作固瘕，必大便初硬后溏，所以然者，以胃中冷，水谷不别

故也。

清泄久而不止，则固痼，言如微痼固结不散也。

阳明病，欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濈然汗出面解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。

其人寸脉迟，言胃虚也。言然如有热状，热即已。言热相火，乃奄然发狂。濈然汗出面解者，以其人欲食，胃气有权，能驱邪出之。水与热，故水热不结，与汗共并而汗出。脉紧则愈者，以元阳未亡，所以脉紧不去，分主胃气胜邪，所以得汗出并，濈然大汗而解，则脉之紧亦自和也。

阳明病，不能食，攻其热必嘔，所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，故攻其热必嘔。嘔，于月切。

脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。若胃中虚冷，不能食者，饮水则嘔。

表热里寒，法当先救其里，大阳经中已明白也。汤，其在阳明，更可知矣。此条比前条言非更甚，故不但攻其热必嘔，即饮水亦嘔矣。

此五条，一云食难用饱，一云欲食，似乎指中风而言，一云中风不能食，及言一条又明指中寒而言，所以后人执其说而误为主释也。不知此五条言胃气之强弱，主外邪也，故五证中，惟水不胜谷气脉紧则愈一证为胃气胜，其四条俱是脉迟胃冷，反为水热互结之证。大阳经言热证也，而其人言中言冷者，又未与一证相推。言胃虚里寒，言水谷虚寒无引，热邪传久，必不能遂变为寒也。言不食，明不可下，即下之而水热不

1 权：职责范围内支配和指挥的力量，此指功能。

人，况令胃气不化乎？（伊原）曰：是也，曰：下利而不下，主以泄下药，其有较甚者，下之，以泄下，更不待言矣。胃气虚之人，升邪入之，必冷言泄下，其水反泄，心热，气化不行，小便因之不行，则尽言大便下利，下利者谷止。小便不利，未当热而泄下者，其泄下必已色黄，乃全胃气反其胃气谷止也。于是散外得汗，则泄下之，其行，而色黄谷止也免，但下利，是胃出，水谷之气不化，胃气虚，不可少分人胃气虚之妙，故不方泄下，曰方泄下，凡泄下之人，小便不行，亦泄下为化也，泄下其水亦泄下之小便因之不行，能九此一种之妙了。

伤寒人吐下之，极虚复极汗出者，以其人外气拂郁，复与之水，以发其汗，因得哕，所以然者，胃中寒冷故也。

伤寒，嘔而腹满，视其前后，知何部不利，利之则愈。

一为胃气虚寒，一为胃中实热，不可不辨。虚寒者温之，四逆、理中是也。实热者利之，承气、五苓是也。

二条旧在“厥阴”末，今入此。

得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医反下之，不能食而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重。本渴而饮水呕者，柴胡汤不中与也，食谷者哕。

六七日无大热，手足温，邪气将入于里也，以脉迟浮弱，故邪留于肌表，恶风未除，反下之，使人因之邪内陷，与气相争不能食，胁下满痛，如里非里，面目及身黄，颈项强，小便难者，上下利未得下也，下利者邪气利。若从少阳，又与柴胡寒剂，必下重呕哕，皆亡津液胃寒之征也。

1 渍（Zi自）：浸；沾染。此有“蔓延”之声。

病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗令阳气微，病内虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

凡脉见数者，必喜出言。其人阳气既微，何得脉反数？脉既数，何得胃反冷？此不可不求其故也。盖脉之数，由于误用辛温发汗而得其客热；胃之冷，由于阳气不足而生其内虚也。盖见其脉数，反以辛温助其无主，必致上下之阳俱损，其脉从阴而变为弦，胃气无余，变为反胃也。

阳明病，发热汗出，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，颈项而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。

热在里而用茵陈蒿汤，与太阳里证身黄如橘者同。然彼因发微汗，此时有欲求浆，所以用大柴胡汤，驱热利湿也。

阳明病，面合赤色，不可攻之，攻之必发热，色黄，小便不利也。

下利之人，才感水邪，则挟水人而面色正红，在大阳时即不可妄用发汗，况在阳明可发下乎？盖有直利索时，无根之火随表为之日上升，即下利，如躁，是令，随里药之件下降，则发热，色黄，小便不利也。

阳明病，无汗，小便不利，心中懊恼者，身必发黄。

外不得汗，下不得利，而热在里中不得泄，势必全身为黄也。

阳明病被火，额上微汗出，小便不利者，必发黄。

1 黄：锦章书局本作“义”

合四条观之，太阳与阳明俱热伟时厥渴有邪，势必发汗。然汗出热从外感，与手足厥。小便多热从下注，则又手足厥。若误下之，则热邪愈乘，津液愈伤，则上与小便不可得矣。误火之，则热邪愈熾，津液上炎，则身虽汗，而身才之汗与小便亦不得矣。发黄之证，安在免乎？发汗与自汗不同。汗，但微因脉迟胃冷而得，则与固瘕及哕同源异派。

阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濇然汗出则愈。

妇人经水适来二逆，则邪热乘之而入于血室。男子下血而谵语者，下为热入血室，亦是邪热乘虚而入也。盖血大吐则止，停食愈而发热，全夜谵语者，亦以热入血室言之而可明理论。[1]冲是血室，妇人属阴经司人，男子由阳明而入也。

阳明病，其人善忘者，必有衄血，所以然者，本有久瘀血，故令善忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之。

太阳热结膀胱，证者如狂，但头汗出者，宜下也。发狂，用抵当汤。此阳明证亡之证，本为阳明发狂，乃用抵当汤峻攻之者，以阳明多在，阳明之证亡，与较大阳为证为故也。

按：大便色黑，虽曰瘀血，而热邪燥结之色未尝不黑也，但瘀血则粘黑如漆，燥结则晦黑如煤，此为明辨也。

病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者，有瘀血，宜抵当汤。若脉数不解而下不止，必协热而便脓血也。

病重七八日，尚发热，脉浮数，仍属太阳表证，因误下引

[1] 明理论：即《伤寒明理论》四卷，金代成无己撰。

邪内入，所以脉数不解，再经全邪，有见消谷喜食，分入既多，反至六七日不大便，而不口渴，足知其证非气证，而力拒也，以其表证虽下，而邪太阳阶段之热未尽，故以抵当力下之也。若“脉数不解，下利不止”，乃对“假令已下，脉数不解”五句之又一证。已下脉数不解，六七日不大便，不可抵当。若下利不止，又当视其下血不下血而别异治。热身分之热邪不分，必协热而使脓血也。

此条文系仲景按度而下之设旨，盖谓当有九日表证，但发热至七八日，虽脉数，盖谓不可下之，谓其证数即久，邪气已入于里，可下而已，言其谓此证有可下也。仲景立人之卒至，而九脉浮发热，表证未罢，主教人下之理。一奇论。以力七八日为时既久，势不得不用下法，殊觉昧昧¹。

太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也，如其未下者，病人不恶寒而渴，此转属阳明也，小便数者，大便必硬，不更衣，十日无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之，渴者宜五苓散。

寸缓关浮尺弱，发热汗出，复恶寒，纯是太阳中风未罢之证。反下以下，包得心下痞结邪。如不以下，则心下亦不痞，而太阳证必渐传里，乃全不口渴口渴，邪入阳明里矣。然阳明里证既见，其热何碍于小便，则大便必其日，而大便之便与长中皆热，于是不同，所以每日不更衣，亦无一苦也。以法救之，去其里热，散其里实，言与水及与五苓散去也。今世用五苓，但引水谷气，于大抵，用之利水而止，至于津液何碍于小便，用之消渴而回津者，非仲景不能也。更衣，言易衣而如厕也。

1 昧昧(mèi mèi)：暗处；不明白。

病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也，脉实者宜下之，脉浮虚者，宜发汗，下之与承气汤，发汗宜桂枝汤。

病人有汗而反烦热者，以表证未除之邪未尽，其人复见疟状，日晡时发热，则邪入阳明里矣。发热即谓风，与阳明之本候也。然邪入阳明，与邪未入阳明，故必审察其脉，脉实者，乃为阳明可下，宜下之。若脉浮虚者，乃为太阳未入阳明证，更宜汗而不宜下矣。

阳明病，心下硬满者，不可攻之，攻之利遂不止者死，利止者愈。

心下硬满，邪聚阳明气分，证未入里也，故不可攻。攻之利不止，则邪气未去，真气先脱，故先利止而邪气去，则正气犹存，故愈也。

脉浮而大，心下反硬，有热属脏者攻之，不令发汗。

伤寒以脉浮为表证，为满为阳邪，此脉大为热内结于里，必五六日。脉反浮大，要非初为表证脉浮之比，心下硬为燥结于里，必先腹硬，而后反心下硬，亦非初为阳邪上结之比，故仲景持重之曰“有热属脏”，言内有实热燥屎，又重戒之，曰“不令发汗”，急当攻之，此所谓凭证不凭脉也。

属府者，不令溲数，溲数则大便硬，汗多则热愈，汗少则便难，脉迟尚未可攻。

邪入阳明之府，必自汗，小便多，以其实热内结，津液乃竭也，是以仲景有“身重下重，禁利小便”之戒。此热邪入阳明，尚未作里实，犹在和气，如小柴胡证服小柴汤后，汗多则邪从汗而自热愈，汗少则邪热内结而便难。若脉迟为热尚少，结未定硬，须俟脉数结定，然后攻之。

一条旧在《脉法篇》¹中，今归此。

太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。

本太阳中风，误用麻黄发汗，汗出过多，反伤胃中津液，所以不汗。热邪乘虚内入，成为里热之证也。蒸蒸者，热势自内为透于外也。里热在胃，故用承气以调其胃，胃调则热涣然除矣。

伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。

吐后腹胀，则邪不在胃，其为里实可知。但腹胀而不痛，说明表邪入里未实，故不宜峻下，少与调胃承气和之可也。

阳明病，不吐，不下，心烦者，可与调胃承气汤。

胃气及中夜既不由吐下而伤，则心烦可系胃中热以，故可用调胃承气以安胃自全一证也。可与者，欲人喻为裁可，不可竟行攻击也。

太阳病，过经十余日，心下温温欲吐而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者，与调胃承气汤。若不尔者不可与，但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡证而呕，故知极吐下也。

太阳病，过经十余日，心下温温欲吐而不吐，其人胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦者，此有三证：若曾经大吐大下，是胃气受伤，邪乘虚入，故用调胃承气之法。若不极吐下，但欲呕不呕，胸中痛，微溏者，是病非吐所伤，溏非攻所致，调胃之法不可用矣。但调胃不可用，则柴胡亦不可用矣。以邪尚在太阳高位，徒治阳明少阳，而邪不暇耳。解太阳之邪，仲

¹ 脉法篇：见本书下卷

景言之已悉，故此但示其意也。若其人欲下，而是为吐下所伤而致，又不在太阳矣。

伤寒十三日不解，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微紧，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。

此条原无表证，虽丸药误下，其脉调和，即为内实也。

按：仲景下法，屡以用丸药为戒，惟治脾约之麻仁丸一条，因其人平素津枯肠结，故虽邪在太阳，即用丸之缓下润其肠，使外邪不因峻攻而内陷。若俟阳明腑实内下，恐无救于津液也。

阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。

此厚朴主攻之证，下之而尚有热，手足温，不结胸，则外邪原不甚重。若其人头汗出者，亦是胸中郁热上蒸所致，乃因其高而扬之，用栀子豉汤以散其热，是阳得以下至于阴，而周身濺然汗出解矣。

趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。

夫言谓胃强津弱，脾不为胃行其津液，大便难。若果胃强，即当补矣，何为麻仁丸中反加大黄、厚朴、枳实乎？仲景言胃强，原未言脾弱，此其以谓胃强，盖是胃强之强而非，盖约者，省约也，脾气过强，将二五日胃中无变之谷，省约为一二日而出，全是脾土过燥，至令胃中之津液日耗至枯，所以大便为难也。设脾气弱，即当便秘矣，岂有反难之理乎？相传谓脾约不能约束胃中之水，何以反能约束胃中之谷耶？在阳明经中，凡宜攻下者，惟恐邪未入胃，大便难硬，又恐勿使后泄，不可

妄攻。若欲攻之，先与小承气汤，试其转矢气者，方可攻，皆是大承气汤之证，不可用也。若大阳证已下，在太阳证当下矣，更何用阳明耶。

脉浮而孔，浮为阳，孔为阴，浮孔相搏，胃气生热，其阳则绝。

此言证当下下，与言证转为证，津液亡而证下矣。其阳则绝，即阳绝于里，亡津液之互辞。

赵以仁云：胃中无热证，无胃气以和之，孤阳无偶，不至燔灼竭绝不止耳。

已上太阳阳明府证。

阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤，不便者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎，乃可攻之。若不转矢气者，此但初头硬，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，不能食也。欲饮水者，与水则哕，其后发热者，必大便复硬而少也。以小承气汤和之，不转矢气者，慎不可攻也。

腹中之气，得攻而不为转动，则胃气不和，所以虽攻而证反重，不能除其证也。证重者复发热，大便虽可得硬，但为时未久，必不多耳，仍用小承气汤和之。若腹中气仍不转，则不但大承气大差，即小承气亦小差矣。

阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也，手足濇然而汗出者，此大便已硬也，大承气汤下之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤。若腹大满不通者，可与小承气汤微和胃气，勿令大泄下。

仲景既言“脉迟为未可攻”，而此证言“脉迟”，复言

“可攻”者，何也？夫一曰“脉迟而不可攻”者，以腹中热而未甚，邪结未定，故尚未可攻下，攻之必尔为不食，而反当阳结者，宜以中脉实结者，方可攻之。此条又云邪结，即按之必实，正其证也。然星脉者，故当攻下无碍。若以脉迟初时，可下，则古人所以之下星脉者，小承气汤与手行地手。

阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转矢气者，更服一升。若不转矢气者，勿更与之。明日不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。

而条星脉迟，以有腹满短气，所以不得不下，且不答及此条脉滑而疾，即有直谵言热，一云直谵言实，下以小承气下之，下之而脉反微涩，证变虚寒，故为难治。

得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日虽能食，以小承气汤少少与微和之，令小安，至六日，与承气汤一升。若不大便，六七日小便少者，虽不能食，但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏，须小便利，屎定硬，乃可攻之，宜大承气汤。

无太阳，少阳证，寸脉沉，心下硬，属正阳证，不可、无里实。但其人未实，是定证，下，以小承气微和之，和之而心下已硬小安，但六七日再与小承气汤多啜，以助其力，故尔为踏也。至六七日，竟不大便，似乎胃实，乃小便复少，正恐胃实而物犹气化之未一，转成大便，仍以小承气下之，以小便利，未定硬，乃可攻之。此攻之能食不能食，全与阳明无涉。不能食者，不可以胃强而轻下。不能食者，不可以胃中有屎实而轻下也。

伤寒，若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日

晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死，微者但发热谵语，大承气汤主之。若一服利，止后服。

按：少阳阳明谵语脉短者死，盖阳明之脉本长，而反短者，为阴阳不附，故死也。此言脉弦者生，涩者死，盖弦为少阳之脉，虽木胜土，而土气未至于败极，犹能生养木气，故尚可生，涩则津液耗竭，血气尽亡，故死也。

又上衰下畜，木邪难任，故弦为实。此使硬下实，改弦为生。

汗出谵语者，以有燥屎在胃中，此为风也，须下之，过经乃可下，下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之则愈，宜大承气汤。

此条之义，似浅而实深，仲景只人不识，二自为主弹，不识言人何故乱语。言有燥屎，不当早下，以汗出而兼言出，知其风邪在阳，必俟汗下下之，始不结托。所以然者，风性善行数变，下之若早，徒劳之走空巧耳，乱神胡耳。然言有燥屎，下之不为大误，其小误在于未言证果于风。若此者，必当一大下，至大脉乃有风邪得以言出，故曰言。此重因证用之法，亦将差就错之法也。

阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也，宜大承气汤下之。若能食者，但硬尔。

“宜大承气汤下之”，旧在“但硬尔”下，今正之。

此以能食不能食等证结之实甚也。详仲景言，病人潮热而语，皆胃中热盛所致，有热当能消谷，今反不能食，此必热伤

1 空窍：即孔窍

胃中津液，气化不能下行，与屎相攻于胃之故，故宜大承气汤，急从亢极之阳，以救手地之阴。若已食者，胃中气化自行，热邪原不方盛，津液不致大伤，大便虽硬而不久自行，不必用药反伤其气也。若以已食复使而用承气，保大伤胃，卒昌厚也津液之旨。

阳明病发热，汗出多者急下之，宜大承气汤。

汗多则津液外泄，加以发热，则津液尽随热势而越于外，是九他云以止其汗，当有急下。热势从大汤而出，则津液不致尽越于外耳。

阳明病下之，心中懊憹而烦，胃中有燥屎者可攻。腹微满，初头硬，后必泄，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

以小承气汤试其可下，而用大承气汤下之矣。若下后心中懊憹而烦，为热在气分不解，当更下。下多少，或言或否，然下方可下，其不可下。设先下而后下，初硬而后泄，宜更微下，为表邪乘虚入里之证，不可更下，俟结定，方可攻之。若先下而后下，仍是燥屎，为下未尽，即当再与大承气汤，以得齐同药，急驱热邪，则烦满立解矣。

病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。

发作有时者，邪热攻土，燥屎上冲也，宜大承气汤下之无疑。

大下后六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也，所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。

大下后六七日重不大便，反加烦满腹痛，此先前所伤胃中宿食，因下后始得下，则大将有复结也，当再攻之，则热邪与燥屎尽去，方得解散耳。

病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘汗不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。

时有微热，此是汗出不止也，时有微热邪内实也，以其人易脱素有微热，手少阴小便不利，故以大便乍难乍易，汗既多入大肠，则胃气不和，热邪愈盛，故宜急下以救胃为务也。

发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。

发汗不解，反腹中满痛，则邪不在表而在里，虽有汗下法，庶满去而病自解也。

腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。

腹满不减，反知故，力甚满，当可急下。一分未减，即实未去不满，故力减不足言。言减至十分，即减去一分，不足杀其势也，当下无疑。

伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。

此一条，得证最微。目大便难，也非久秘，里证不急也。身微热，则非大热，表证不急也，故曰无表里证。即此可验其热邪在中焦，热邪在下，亦不为急，但其人目中不了了，睛不和，可急矣。以阳明之脉络于目，阳明热甚，则土邪浸水，计惟急下，以救阴为务也。

已上正阳阳明府证

阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此大便必硬故也，以亡津液，胃中干燥，故令大便硬，当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。

此因过汗伤津，以致重不大便，而无所苦，终非热邪固结之证。盖既无热，水谷之余仍随胃气上输，胃气一和，津液自

且，此大与小承气汤同法，但与小承气汤同法，以小便今反数少，洵为津液还入胃中，大便不久自行无疑。

太阳病，若吐，若下，若发汗，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤和之愈。

本太阳病，以吐下伤阴，故令微烦，小便数，大便因硬，皆邪渐入里之机，故少与小承气微和胃气即愈。

伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。

伤寒四五日，正热邪传里之时，是里实已成，而汗已具而反下之，必致里虚而谵语。当反与微汗，类似大承气证，此以汗下伤津，而不致大实大满故也，正宜小承气力能当也。

阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止，更莫复服。

多汗而谵，下证已具。以其人汗出既多，津液外耗，故不下不大下，但当略与小承气之，和其胃气，正其谵语自止。若过服，反伤津液，后必复结也。

发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死，脉自和者不死。

此言太阳经得病时发汗不解，及传阳明，重发其汗，亡阳谵语之一证也。亡阳之人，神脱无主，而发无妄言，与热邪传心之候不同，况汗多则大邪必从汗解，正志虽神飞越难收，故脉短则谓阳不附，脉和则谓阳未竭，其死生但从脉定耳。其脉既短，安问药之所长哉。

夫实则谵语，虚则郑声。郑声，重语也。

重语者，字语重叠，不能转出下语，真气夺之征也。

直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。

涌泉者，心火气极，加以直视，则肾水垂绝，心火无制，故主死。当关者，邪乘阳位而上争，气从下脱，故主死。下利者，邪聚阴位而下夺，气从下脱，亦死也。设谵语内实，下旁流清水者，又不可误认死证也。

伤寒后脉沉，沉者，内实也，下解之，宜大柴胡汤。

按此条，书曰“伤寒后”，必是传过一二日，因汗下太过，伤其津液，所以脉沉而见内实证。然必其人脉虽沉实，而兼见弦紧，或大热虽去，时作微热不除，故主此汤，以少阳阳明内伏之余邪。设见沉实滑数，表证绝无者，又属承气证矣。

脉双弦而迟者，必心下硬，脉大而紧者，阳中有阴也，可以下之，宜大柴胡汤。

前条脉沉者宜下，也以大柴胡解之。此条上言脉双弦而迟，为寒饮内结，次言脉大而紧，为邪留伏，皆阳中伏有阴邪，并可以下，合用大柴胡无疑。不言“当下”，而曰“可以下之”。不言“主之”，而曰“宜”者，以双弦而迟，似乎寒证。至“大而紧”，又与阳紧不殊，以其心下硬，故云可下，与脉浮而大，心下反硬，有热属虚者攻之同例。世本俱作“宜大承气汤”，传写之误也。大柴胡方中有半夏、生姜之辛温，以涤饮散寒，故可以治阳中伏匿之阴邪。若大承气纯属苦寒，徒伐中土之冲和，则痞结下利之变，殆所必至也。

阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。

凡系多汗伤津及屡经汗下不解，或尺中脉迟弱元气素虚人，当攻下而不可攻者，并宜导法，但须分津液枯者用蜜导，热邪盛者用胆导，湿热痰饮固结，姜汁麻油浸栝蒌根导，惟下旁流

水者，导之无益，其大小气峻攻不效，以实结在内而不在下也。至于阴结便秘者，宜于蜜导中加姜汁、生附子末，或刮陈蒿姜导之，此实补仲景之未逮也。

已上少阳¹阳明府证。

咽中闭寒不可下，下之则上轻下重，水浆不下，卧则欲蜷，身急痛，下利日数十行。

言初病使用下闭寒，以其人少阴之真阳素亏，故汗下俱禁，下之则显少阴虚寒，诸证蜂起也。

诸外实者不可下，下之则发微热，亡脉厥者，当脐握热。

诸外实者，为表热里寒，下之则表邪内陷，客于下焦，故脉伏不至，四肢厥逆，但当脐一片热，其面反热不亡也。

诸虚者不可下，下之则大渴，求水者易愈，恶水者剧。

诸虚下之为重虚，内竭津液，故令大渴，求水者，阳气未竭，故易愈。

脉数者不可下，下之则必烦，利不止。

阳寸之脉必浮大，若兼之以数，为邪气方熾，下之则热邪乘虚入里，故内烦而协热利也。

已上宿病禁下

1 少阳：清康熙重刻本作“皆属”

伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。

伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。

此食不呕与言和言欲已义一法不杀人，然言欲已之无在

伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。

身热恶风，太阳证也。颈项强，太阳证也。胁下满，少阳证也。本当从太阳证治之，然其手足温而渴，此证已传于少阳，太阳里之证已著，故更用少阳发散之法，以中其热而大耗其津也，故从小柴胡之和法，以和解其邪而阴津不伤，一举而两得之矣。

伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不差者，与小柴胡汤主之。

阳脉涩，阴脉弦，在似在里之谓也，所以腹中急痛，腹中急痛，乃阳乘于中，而阳气不建矣，故以小建中之安胃和胃，以建其阳，阳建则阴弦自去矣。若不尔，则弦为少阳之本脉，阳涩乃阳气不建，表邪乃邪传入与之证，则用小柴胡以和解其邪而升举其阴分之邪，为的当无疑矣。

伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。

1 辐（fú 福）凑：又作“辐辏” 形容人或物聚集。像车辐集中于车毂一样。辐，连结车辋和车毂的直条。凑，聚合。

2 背：违背；不和谐。

3 的当：恰当；稳妥。

少阳主半表半里之间，其邪入而并于阴则寒，出而并于阳则热，往来寒热无定期也。风邪之外邪，挟身中有形之快，结聚于少阳之本位，所以为胁满也。热与风薄，胃中之水谷亦不清，所以默默不欲食，即昏昏之意，非静默也。心烦者，邪在胸膈是处心司也，或呕或不呕，或渴或不渴，诸多见证，各随人之气体，不尽同也。然总以小柴胡和法为主旨，而各随见证以加减之耳。本方以柴胡为少阳一经之向导，专主往来寒热，谓其能升提风木之气也。黄芩苦白不沉，黄中带青，有去风热之专功，谓其能解风木之邪也。半夏为能涤痰，胃为洁净之用，病则不能自洁净之令，致痰饮结于内，热邪居于外，非此不能扫荡来，为邪终不聚，表终不结也。其用人参、甘草补中者，以少阳气且皆薄，全赖土气以资养，则水气始得安来，即是胃和而愈之意。用姜枣和胃者，不过使土表之邪仍从肌表而散也。独怪后世用小柴胡，一概除去人参，加入耗气之药，此岂仲景立方本意哉？

伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加栝蒌实一枚。若渴者，去半夏，加人参，合前成四两半，栝蒌根四两。若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两。若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两。若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两。若不渴，外有微热者，去人参，加桂三两，温覆取微汗愈。若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

胸为阳分，烦为阳邪，以阳邪留薄于胸中，故去半夏、

1 沃：浸泡。

2 土膏：土中所含的适合植物生长的养分。此指脾土之气。

3 留薄：停留遏迫。

人参之助阳，而加栝蒌实以涤饮除烦也。胃力津液受伤，故去半夏之辛燥，而用栝蒌根之清润，加用人参之甘以益中也。腹中结者，为阳邪攻胃，以黄芩能伤胃中清阳之气，故去之。芍药专主阳邪传胃，为阴中伐木之药，故留之，亦伐用之。设阴寒假证，利，又为可禁也。肺下不利，为饮结于少阳部分，故去大枣之甘辛，而加牡蛎以软坚逐邪为务也。心下悸而小便不利，为水停心下，故去黄芩之苦寒药，而加茯苓以淡渗利水也。若不满，外有微热者，知热邪未入于里，故去人参而加桂枝，以温散阳气以解表也。若脉沉者，为肺气受邪，故去参、枣之益气，生姜之辛气，而加干姜之辛散，枳实之散收，以散邪敛肺也。

凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。

下之证证不罢，复与柴胡以升平之，使邪不致陷入胃分也。设见腹满、烦燥等证，必当从去黄芩加芍药法矣。

本发汗而复下之，此为逆也。若先发汗，治不为逆，本先下之，而反汗之为逆，若先下之，治不为逆。

本表证而用表药，汗不透，故未愈，当再与轻表，则立愈矣。医见热未除，疑为前药未当，反与下药，则误矣。然虽误下，以其先前曾用过表剂，邪势已杀，故不为逆，但未尽表邪，因下药引入半里，所以从少阳例治也。邪气已入于里，与里药下之矣。其下未尽，故热不去，当更与里药则已。医见下之不愈，疑前药未当，反与表药，则误矣。以其先前曾服过下药，里邪少杀，故不为逆，但未尽余热，因表药提出半表，所以亦从少阳治例也。

伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲

食，大便难，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也。脉沉亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病。所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解。

按此言者，言于之邪未全结聚，不能传之于表也。作高气表证，故曰气结胸，大凡，阳邪，则入于少阴，结之证，半在表半在里之证矣。然尔，则方书又无气表证矣。此本文“以食也言者”等语，谓邪若不聚者，则是邪在内部，则不得复有外证，其义说明。得屎而解，即言汗下十余日，用大柴胡分提使传之法也。

妇人中风，发热，恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟，身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室，当刺期门，随其实而泻之。

按中风七八日，热邪传里之时，因经水适来，邪气乘虚而入血室，却不入于胃也。经水适来而即止，必有瘀结，此为实证，故宜刺期门以泻之。

妇人中风七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。

中风七八日，表证已罢，经水不应断而适断，复见寒热如疟，必经行未尽而有结血，经行既行而适断，此为虚证，故不可泻，宜小柴胡和之。

妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室，无犯胃气，及上二焦，必自愈。

伤寒邪热在表，故经水来而不断，虽为热入血室，以气分

不足邪，故下利自止，以夜阳气衰，邪亦去，故身自愈，不可刺期门，妄犯胃气，及用柴胡犯上二焦也。

血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下，正邪分争，往来寒热，休作有时，默默不欲饮食，裁有相连，其病必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

和明曰：予读入自下之上，而思“表邪入里”四字，字字不尽，重以裁病相连，邪高痛下，默默有时，不欲饮食，中邪也，下利相连，邪高痛下之上，以少阳之证与邪相搏，有邪在上，或邪在下，或口苦，是邪之证，以少阳证不欲饮食，但下利取耳。

太阳病，十日已去，脉浮细而嗜卧者，外证已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，与麻黄汤。

太阳病，十日已去，脉浮细，嗜卧，外证已去，其证有两：为邪入以里，为邪传里之候。一为表邪解而不传之时。以九为“阳数”，故以少阳，十日十分表证九分，十日十分里证一分，是少阳，与少阴同其数，乃反为里，但六经之候，仍以营分一散也。

已上少阳经证

本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕，不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。若已吐下，发汗，温针，谵语，柴胡汤证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。

尚未吐下，虽脉沉紧者，犹与与小柴胡汤，言表邪尚在里，未变方也，但言提其邪气升出耳。若已吐下，发汗，温针，是为坏病，邪气已入里，正气内伤，不可用小柴胡也。

1 重：清康熙重刻本作“致”。

然必柴胡证罢，乃为少阳坏证，不可与太阳证同治也。

伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

此系少阳之里证，诸家主作心经病，误也。盖少阳有一禁不可妄犯，虽八九日过经下之，当日邪气内犯，胃土受伤，胆木失荣，痰聚胆上，故有胸满惊悸。惊者，胆不安，非心虚也。小便不利，谵语者，胃土已败也。一身尽重者，邪气结聚痰饮于胁中，故令不可转侧，主以小柴胡和胃内斗，遂饮通津，加龙骨牡蛎以镇胆胆之惊，即是虚劳大补之人参汤，用桂枝汤加龙骨、牡蛎同意。

太阳病，过经十余日，反下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。

过经十余日，不知少阳证未罢，反下之，因而致变多矣。后四五日，柴胡证仍在，未有他变，不当为解表里，任其入之邪，按六经下而深入不能传散，故必先用小柴胡，提其邪出半表，然后用大柴胡为合法也。

伤寒十二日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之而不得利，今反利者，知医以丸药下之，非其治也。潮热者，实也，先宜小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。

过经不解者，言表里俱已传过，故其治在半表半里之间，胸胁满而呕，邪在少阳也。发潮热，里可攻也。反下利，便不硬也。以大柴胡分解表邪，荡涤里热，则邪去而微利亦自止耳。若误用丸药，则徒引热邪内陷而下利，表里俱不解也，故先用小柴胡分提以解外邪，加芒硝以荡涤胃中之实热也。

已上少阳府证

服柴胡汤已，渴者属阳明也，以法治之。

风寒之邪，从阳府而传少阳，起先不渴，里证未具，及服小柴胡汤已，重加口渴，则邪至阳明，当用胃以存津液矣。然不曰“攻下”，而曰“以法治之”，其意无穷。盖少阳之邪热往来，间有渴证，向少阳未罢而遽言攻下，不有犯少阳之禁乎？所以少阳重转阳明之证，但云“以法治之”。

上条少阳转阳明府证

伤寒七八日，身大热，其人躁烦者，此为阳入阴故也。邪气传里则躁烦，不传里则安静也。

上条少阳经将传太阴证。

少阳病欲解时，从寅至辰上。

上条少阳经证自解候

太阴篇

太阴篇云：「天之运，本无外中之别，即有中风，亦必系饮食所乘理之入，故太阴但有桂枝的无麻黄证也。」盖论以为但一桂枝的以盖不符言者，亦未去此义。或言：太阴证无中寒，何得有证云「当温之」？此盖得言邪乘之人，因伤饮食得之，故太阴更证，但证微寒，不引中寒。其他传经之证，或缘无伤饮食，或缘攻下所致，故太阴传经之邪，无大热证，十分同，或引之比。盖桂枝大黄汤一证，乃系以下，邪邪内陷可致，用以证病内之阳邪，盖太阴有可下之证也。即无伤饮食致传者，亦必不传自可，乃可攻下。大率当下当温，以温之或温散之，盖其言寒者之方当已。若论经或少阳传次太阴，不过往来寒热等少阳证罢，而它证证不示，假高时高，于是自高，肌肉重按则热，肌表却不热，脉沉细或微畏寒是冷，当从传经例随证分解之。

太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸下结硬。

腹满自利，太阴之本证也，吐与食不下，是邪迫于上。利甚自腹结，是邪迫于下。上下交混，胃中不和，此但可行温散，设不自利而下之，其在下之邪可去，而在上之邪始矣，故胸下结硬与当利之证不同，与中津液亡证，腹中阳气不存，卒难开涤也。

自利不渴者属太阴，以其证有寒故也。当温之，宜服四逆辈。

自利不渴者属太阴，太阴主水谷，故病自利。内有真寒，

故不利。注谓自利不利，皆指已，故用四逆散，以燠土以厚湿，土已，仲景大已以自利不利者属太阴，以自利自满者属少阴，分个证，所入其已。盖太阴属湿土，邪热入而扰动其湿，则湿有余，故不利而多发利。少阴属肾水，热移入而消耗其水，则水不足，故自利而多烦渴也。今自利不利，知太阴藏寒，故当温之，宜用四逆散，则理中与可不言而奇已。太阴湿土之藏，有寒不用理中自用四逆者，水土同土一理，冬月水暖则土亦暖，夏月水寒则土亦寒，所以土所以时为阴外，故用四逆以温土也。

已上太阴藏寒证。

本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。

太阳之误下，其病皆在太阳以上，非邪传阳分也。此因误下而腹满时痛，无胸胁等证，则其邪已入阴位，所以属太阴也。腹满者，太阴里气不和已。时痛者，有时而痛，主大实大满之病也，故仍用桂枝加芍药之法，以升举阳邪，但倍芍药以收太阴之逆气，本方不增一药，斯为神耳。

大实痛者，桂枝加大黄汤主之。

大实痛，盖非有时而痛者可例矣，故内方但倍芍药，自此则加大黄，加大黄者，取其苦寒泄实热已，以其大实大满，宜从急。然阳分之邪初陷太阴，未可峻攻，但于桂枝汤中少加大黄，七表三里以分杀其邪可也。

太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。

比较明时与《伤寒论》中方发，其言曰不转矢气，曰先硬

① 燠（yù 玉）土：温脾。燠，暖；和。

后黄，且未定成硬，皆是恐伤太阴脾气。此太阴证而脉弱便利，减用大黄芍药，又是恐伤阳明胃气也。

伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴，太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄，至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。

太阴脉本缓，故乎缓是类太阳之中风，手足自温则不似太阳之发热，更不似少阴之四逆与厥，所以系在太阴，尤为恰当也。太阴脉见乎缓，其里热交感，势必举身为黄。若小便自利者，里热从水道而泄，不能发黄也。至七八日暴烦下利日十余行，其证又与少阴无别。而利尽腐秽当自止，则不似少阴之烦躁有加，下利漫无止期也。况少阴之厥而下利，手足反温，脉紧反去者，仍为欲愈之候，若不可断而误以四逆之法治之，几何不反增危困耶？虽阳明与太阴有表里相连，其便硬与下利自有阳分、阴分之别，而下利中又有湿里实证之别，湿里宜四逆汤，实脾宜五苓散，利水即所以实脾，脾实则腐秽不攻而去也。

已上误下热传太阴证。

伤寒，脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄。若小便自利者，不能发黄，至七八日大便硬者，为阳明病也。

此太阳转属阳明证也。脉浮而缓，本为表证，然无发热恶寒外候，而手足自温者，是邪已去表而入里，其脉之浮缓，又是邪在太阴，以脾脉主缓故也。邪入太阴，势必举身为黄。若小便自利，则浮行时发黄之患可免。但脾运既行，胃益上荣，胃燥则大便必硬，因复转为阳明内实，而成可下之证也。下之

1 势：文化本作“热”

宜桂枝大黄汤。

伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日至阴经上，转入阴必利，本呕下利者，不可治也。欲似大便而反矢气，仍不利者，属阳明也，使必硬，十三日愈。所以然者，经尽故也。

霍乱为胃中邪气内动，故其脉当微涩，今伤寒是外邪，脉当浮盛而不当微涩也。四五日为转入阴之时，为利者利，脉当微涩者，也是邪气内动，胃气弱也，其势内动，故不可发汗，非不汗也。若欲似大便而反矢气，仍不利者，此太阴转属阳明，必使硬可攻，至十三日过经而愈也。

下利后当使硬，硬则能食者愈，今反不能食，到后经中复能食，复过一经能食，过之一日当愈，不愈者不属阳明也。

此言下利止后，必能食而愈也，言胃气有权也。若利止而反不能食，邪热去而胃气亦去也，但过一日，胃气复也，自能食矣。设日久不能食，将成痼疾，非愈也。反能食而久不愈，此热气有余，必发痈脓也。

已上太阴转阳明府证。

太阴病，脉浮者可发汗，宜桂枝汤。

太阴脉尺寸俱沉细，今身言，则邪还于表可知矣，故仍用桂枝击其邪之情归也。

太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者，为欲愈。

四肢烦疼者，脾主四肢，邪风在于脾之故也。阳脉微阴脉涩，则风邪已去而脾不足之象。但脉见不足，上恐元气已离，

1 则：清康熙重刻本作“至”

2 濡：浅薄；微弱

病从亡也，或心气亡之一，或肺气亡之而不利，亡心气未聚，其力为自愈耳。亡系未去未复，谓其力未聚也，大忌。已有血凝气滞反为欲愈之理耶？

已上太阴转阳明经证

太阴病欲解时，从亥至丑上。

上条太阴经证自解候

少阴上篇

伤寒邪在三阳，太阳为首，邪在三阴，少阴为先。少阴虽居六经之末，然实为三阴之表，以其与太阳表里，又与少阳相表里，故大经又多，受邪最易，证候亦不一，大抵自少阴有传经、直中两种，数经、三阳、三阴，不同者中虽当以经，然有微、中、洪、大之别，传经者以微细，受有补虚、攻邪之别，包于脉微者，即少阴者九针形。言传者热邪，先伤少阴之气，其者邪未除而经已竭，犹是传入少阴，其经下之证，反下之一，包下之证，反下之七。而直中者，又有次序不同，它如千里祖上不能，是于甲纪另求之。如最利后，反下。为当治之证又不能下，由是未与七等其经水者，不可因是遂认为当治也，必其大经中之直中者，复因证下后，挽之外证而不能内改，势必借其以引其经，方得内挽，所以伤寒中，下证之言最多却在太阳，已有利和不利，至传少阴，其下证之言，但言多少以证其志，不得从下治之法，言热者利，以有引为危等也。今言为热者下之证，与夫下大证，元气受病，从权以治下之去者，此为下证，正合有问之云，下为下证，此证热者之发于少阴者，另自为篇。庶泾渭攸分，根蔓不乱耳。

少阴之为病，脉微细，但欲寐也。

此言少阴之证是也。少阴者水主静，即使热邪传至此经，其在无之脉虽洪大，亦必变为微细，在无之证虽极热亦下，亦必变为昏沉嗜卧，但仍不得妄辨为异证，况夫少阴不主热之证也。但知以无见表证，至五六日后反出脉证无数，口

1 从权：采用权宜变通的办法

中寒，不在卧者，为热证。始病微恶寒，口中和，但欲卧者，为寒证。以此观之，方无入误耳。其所以但欲卧者，以卫气行阳则寤，行阴则寐也。

少阴病，始得之反发热脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。

始反发热，乃少阴从太阳之表邪，行在表也。少阴为四脏之阴，同各经阳，故反发热之证。但一方之表证，与一方阴证，何必以一二之药为表，与少阴无方乎？故麻黄与附子合用，使外邪出而真阳不出，才是少阴表法之正也。

少阴病，得之一二日，麻黄附子甘草汤微发汗，以无里证，故微发汗也。

得之一二日，无利，恶寒，无里证，其当从外解。无少阴色无发汗之法，汗之必至亡阳。此一二日，其反发热无汗，其口不吐利，恶寒，取阳，乃可微发汗，取其微似之汗。此又其意，在大阳不但有桂枝加附子之法，而无麻黄加附子之方，盖大阳与无恶寒。恶寒之证，即不当用附子，反见恶寒，此非口利，恶寒为证，亡阳已在其中，又不当用麻黄。因此推之，凡有少阴证而用麻黄者，其杀人不转睫矣。

少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。

口中和者，不渴不燥，全无里热之证。况背为督脉统诸阳主阳之地，他处不寒，独见其背恶寒者，则阳微阴盛之机已露。故灸之以火，助阳而温之，主之以附子汤，温经而散寒也。不知者谓伤寒才一二日，非证轻，何反尔早若此？此

① 一斑：即“一斑”，比喻事物中的一小部分。斑，通“斑”。《楚辞》：“纷总总其离合兮，斑陆离其上下。”

以仲景正以——日即——日而邪入少阴之日，早从太阳治之。若待四日，势必极盛难返，不可救药矣。

按：少阴自感之寒，有始得之反发热脉沉者，有初入太阳不作郁热便入少阴者，二证似不甚相远。若详究病情，大相悬绝。一则阴经独困而太阳不至于失守，故脉虽沉，尚能发热，即延至二三日，热犹在表，而无吐利欬逆里证，可见尚有太阳经外垣可恃¹也。一则太阳表气大虚，邪气即得入犯少阴，故得之二三日，尚背恶寒，不发热，此阴阳两亏，较之两感更自不同，两感表里皆属热邪，犹堪发表攻里，此则内外皆属虚寒，无邪热可以攻击，急当温经补阳，温补不足，更灸关元以协助之，其证虽似缓于发热脉沉，而危殆尤甚，若利延缓，或遇庸工不敢用大剂峻补，多致不救也。

少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。

身骨节俱痛者，大阳证已也。若手足更见沉寒，则言中真阳之告匮矣。身骨节痛者，皆阳虚所致，而与生心不相乱也，故用附子汤以助阳气，骨节之一层除也。若以其痛为外感之邪，宁不杀人耶？

少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。

外邪入少阴，首与肾气内相打击，乃脉见沉而不鼓，即与夫——所谓肾气独沉之义，其大阳证表证已解，故当急温以助其阳也。

少阴病，下利，白通汤主之。

下利无阳证者，纯阴之象，总以善利与在其宗，最危之证也，故于四逆汤中去甘草之甘，以泄肾阳于安一外之中，以和其阳而和其利，故名其方为“白通”，取其通阳之义也。

1 外垣可恃：外垣可以依仗。喻此时太阳经犹如屏障，使邪气不致马上侵入少阴经。

少阴病，下利，脉微者，与白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。一服汤脉暴出者死，微续者生。

与白通汤，反全厥者无殃，下利自止，此药为之不能甘也，以九阳子之力，使其不入耳，故复增人尿、猪胆汁之同，以引药力深入。脉微者生，脉必微者生，暴出反死，甚哉！太阳之药出在阳也，少阴之药出在阴也，利下利，早用白通，图功于未著，真良法也。

少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。

阴寒甚而水停，由虚不能摄水，复不能生土以制水，以故腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利，或小便利，或咳，或呕，水性之病，无阳不之，盖真武坐镇北方之水，子有武父。太阳之中，以肾为内，以心为阳者，用真武汤之云以表明之矣。盖少阴之水居土位，得用真武一去以镇摄之，可见太阳与水与少阴居一。盖一阳，同居北方家水之位，有邪为阳邪，借用麻黄为青龙，无邪为阴邪，借用附子为真武。得此一汤以序水与火，言习最习，其他汤药各，真有不思议者。

按：真武汤方，本治少阴病水饮内结，所以首推水附，兼茯苓生姜之运脾渗水为务，此人所易明也。至用芍药之微旨，非圣人不能。盖此证虽曰少阴本弱，而实缘水饮内结，所以腹痛，自利，四肢疼痛，而小便反不利也。若极虚极寒，则小便必清白无禁矣，安有反不利之理哉？盖知其人不但真阳不足，真阴亦已素亏。或阴中伏有阳邪所致，若不用芍药固护其阴，岂能胜附子之雄烈乎？即如附子汤、桂枝加附子汤、芍药甘草附子汤，皆芍药与附子并用，其温经护营之法与保阴回阳不殊，后世用药，能获仲景心法者几人哉？

若咳者，加五味子半升，细辛、干姜各一两。若小便利者，去茯苓。若下利者，去芍药，加干姜二两。若呕者，去附子，加生姜，足前成半斤。

按加生姜、白术，乃承上“当用附子”而言，以去附子者，何以反去之耶？盖真武汤原方去附子外，更无热药，乃为阳虚素有积热欲饮，故以白术去之，又以外之白术。观后通脉四逆汤，若但加生姜，不去附子，已不甚明。所以真武之方，以真武尚不相当也。

少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤色，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，通脉四逆汤主之，其脉即出者愈。

下利清谷，种种危象，其外反热，其面反赤，其身反不恶寒，而手足厥逆，脉微欲绝，明系阳格阳于外，不能内反也，故于四逆汤中信用干姜，大温其里以拒外邪，更效白术之法，加葱白以入阴而阳可复其脉也。前条云脉暴出者死，此条云脉即出者愈，其理最细。盖暴出则脉已离根，即出则脉已返舍，由是外反发热而不恶寒，其阳尚在躯壳，然必重其脉，而脉即出，始为体健。设脉出很迟，其阳已随热势外散，又于死矣。

面色赤者，加葱九茎。腹中痛者，去葱，加芍药二两。呕者，加生姜二两。咽痛者，去芍药，加桔梗一两。利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。

面色赤者，非格于上，加葱以通阳气，故名通脉也。腹中痛，白术不足也，去葱，是其阳阻，加芍药以收胃也。咽痛，阳气上结也，去芍药，恶其微阴，加桔梗，以利其也。利止脉不出，阳气未复，其心血未充，故加人参以补其气血，去桔梗者，恶其上载而不四通也。

少阴病，吐利，手足厥冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。

此少阴兼厥阴之候也。吐利，厥冷而至烦躁欲死，肾中之阳气上逆，将成危候，故用吴茱萸汤以下其逆气，人参、姜、枣以厚其脾土，乃温经而兼温中，则阴气不复上干矣。

少阴病，吐利，躁烦，四逆者死。

上条下利，阳致躁烦，此吐利，抗拒阳药也可见，更见四肢厥冷，阳亡之兆，故曰，吐利交作，中气必绝，故曰死也。使早用温中之法，宁至此乎？

上条言吐利，手足厥冷，烦躁欲死者，用吴茱萸汤，此吐利，躁烦，四逆，与上条不同，何故可治，而此不可治耶？必是已用温中，转加躁烦，故为死耳。

少阴病，饮食入口即吐，心下温温欲吐，复不能吐，始得之一手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮上取者，不可吐也，急温之，宜四逆汤。

饮食入口即吐，犹言胃中不能容谷也。若不饮食之时，复欲吐而不能吐，与系邪邪上逆，此等处必加引邪。若始得之使手足寒而脉弦迟，即上传各经邪可拟。然少阴邪固有是证，而或饮亦有是证，故谓邪中实也，当吐发抗之。今无欲吐不吐，尚为邪邪上，无是证却使邪上有寒饮上取，亦属邪邪用事，上取与扶阳之药可施。设以吐药去，必致转增其病，故急温之，以助阳气也，此所以不可下也，一证而两经之证。

少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

欲吐不得，心下硬，甚者可见之也。自利而渴，所以引水，舌上，引水自救，似手热证之形，然肾热引水盖黄也。若小便色白，又非肾热，乃下焦虚寒，不能制水，仍当从事温法，不可误认为热而轻投寒下也。

自此条而下，凡十余条，皆是传次少阴寒坏证，证虽俱不立方者，以其阴阳两伤，血气并竭，多死少生故也。

病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛而复吐利。

阴阳俱紧，伤寒之脉也。伤寒九十，反汗出者，无汗以出其外，所以汗不出而汗出也，少阴之邪不解，易汗出，亡利，即当用少阴温经散寒之法，不言可知也。

少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也，阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。

亡阳不可发汗，与上条互发，“亡”与“无”同。无阳则其邪方内陷，引邪本自下，然其大邪已去，尺脉弱涩者，复不可下，其当急行温法，又可见矣。

厥而脉紧，不可发汗，发汗则声乱，咽嘶，舌萎，声不得前。

少阴之客入脏中，脉微，引舌本，筋力之标，本虚则筋弱，故声乱，咽嘶，舌萎，声不得前也。

前四条皆少阴证，并汗证也，但引证不立方，然犹可治，曰“少阴病欲吐不得”一条，且真武方救之。“病人脉阴阳俱紧”一条，且附子汤加枳实。亦有汗。“少阴病脉微不可发汗”一条，宜白通加人尿、猪胆汁。此条厥而脉紧，为当用四逆汤温之，反误发汗，致声乱，咽嘶，舌萎，不可救矣。

少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六

目自利，复烦躁，不得卧寐者死。

脉微欲沉，欲吐，少阴之本证也。目自利者，阳已先绝，顷刻即悉去，自当急治其寸关。然寸中寸关脉微，寸关脉微，六七日余阳微上绝，正当急治之时，大则不至，至六七日脉微有汗，复烦躁，不得卧寐，寸中脉全微绝，寸关脉全微绝，此乃阴阳之气微绝也，顷刻即去，微绝之脉无复矣，此微绝之脉，乃微绝之脉，微绝之脉，今更不得卧寐，所存一线之阳，扰乱若此，可复收乎？

少阴病，恶寒，身蜷而利，手足逆冷者不治。

阳微无阳，即阳回也。身去，阳微气于九旬有之少，其不能回者多矣，故曰不治。

少阴病，四逆恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者死。

脉不至，阳已先绝，不烦而躁，孤阴顷刻自尽矣。

少阴病，下利止而头眩，时时自冒者死。

下利既止，且大便可得，乃为阳回利止者，反为死候。人身阴阳相力依靠者也，阳回于下，而诸阳之上聚于大者，乃然而功，所以头眩，时时自冒，阳微于上而亡死也。可见阳回利止则生，阴尽利止则死矣。

少阴病，六七日，息高者死。

诸阳上炎，息高即直阳上炎于胸中，本实无按，高不至反目，反目，故主死也。“六七日”三字，脉微最细，少阴病而息高，至六七日，真气于上已尽，不死何待？与人阳病一日作，二日作，三日作，殊也，此少阴证气，来于脉之微，脉必微微无力，若太阳证气，上炎于头之微，脉必于脉有力，自是不作也。

少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者，

1 脉（móu 谋）：齐等。

当温其上，灸之。

下利，脉见沉微芤者，乃真阳衰而清阳之邪外出者，即邪上逆也。吐者，阴寒不止生阳，阳气不克内守也。数更衣又少者，阴寒则气下泄，为阴寒努责也。盖阴阳皆不当用温，然阳复不可下泄，一病之中，得数数证，又欲辨别，最难区别，故于脉上之白会穴灸之，以温其土而升其阳，则阳不致下陷以逆其胃，然二阳得安则不吐，而下利自止耳。此证设用汤药温其下，必是逆转下，下利不止而身重耳，故不用汤药，但用灸法，有如此之回护也。

少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者，灸少阴七壮。

少阴病，手足不逆冷而反发热，似乎阳复复阳之兆，但吐利不止而脉不至，又似真阳发外，故于少阴本穴用灸法以引其阳内返，斯脉至而吐利亦得自止耳。

前条言恶寒之证，灸后用附子汤者，因更内凝，定非一条所能胜，此条手足反热，正是阳内阳外，故灸本经以招之内入，不必更用温药也。

已上少阴虚寒证。

少阴病，恶寒而蜷，时时自烦，欲去衣被者，可治。

自烦欲去衣被，真阳扰动不宁，尚未至出阳在外，故可用温法。然必微烦即止，阳气不乱，手足渐温，脉来沉微不绝，方为可治。设见躁扰间乱，扰攘不宁，手足反冷，脉反躁急，或散大无伦，皆死证也。

少阴病，下利，若利自止，恶寒而蜷卧，手足温者，可治。

① 努责：形容虽努力排便，却排不出大便的现象。

是理越下，由本传来，利止，手足温，则阳气渐复，其邪寒亦易散，故可用温，以助其阳之复也。

少阴病，脉紧，至七八日自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自愈。

少阴病，脉本紧，至七八日自利，则邪气行以下走，故脉反和，而手足反温，阳气渐复也，虽烦下利，必自愈。

条互见，此与邪气相争，可勿药自愈之证，即“紧去人安”之互辞也。

少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。

风邪传入少阴，仍见阳浮阴弱之脉，是其势方盛，必先脉反微，则脉反浮，乃为自愈。盖阳微则外邪不复内入，阴浮则内邪尽从外出，故欲愈也。

少阴负趺阳者，为顺也。

少阴，水也，趺阳，土也，诸病悉土克水，而伤寒少阴见证，惟悉土不能制水，其水反得以泛滥，故可见下利，无妨不至，充令土厚土收，而真阳外越，神丹莫救矣。此脉法中消息病情之奥旨也。

已上少阴回阳证。

少阴病欲解时，从子至寅上。

各经皆有子午土之时，而少阴独解于阳生之时，阳进则阴退，阳长则阴消，正所谓阳得阴而解也。即是推之，而少阴所重在真阳，可不识乎？

上条少阴经自解候。

少阴下篇

少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。

沉相中加之以数，正邪热入里之征，邪热入里，即不可发汗，发汗则动其经，而有夺血亡阳之变，故示戒也。

少阴病，四逆，其人或咳或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。

四肢为诸阳之本，阳邪传至少阴，陷入于里而不能交通阳分，乃至四逆下利，其中土之阳气亦伤，所以咳用柴胡升举内之阳邪，枳实破内部之结热，甘草助脾胃之阳气，芍药收大位之阴津，允为和缓少阴阴阳否塞之定法，慎不可以其阳热内结，而用下法也。盖伤脾以泄为主，自应有阴泄之象，若复用苦寒攻之，则陷者亡，故以有“诸四逆者不可下之”之戒。

咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。腹中痛者，加附子一枚，炮令折。泄利下重者，先以水五升，煮薤白二升，煮取一升，去滓，以散三方寸匕，内汤中，煮取一升半，分，温再服。

此证虽属少阴，而实脾胃不和，故尔清气之气不能至于四末，是用四逆散清理脾胃，而散阴分之热滞，乃正治也。至于腹中痛者加附子，于此不能无疑。盖阳邪内陷之腹痛，只宜小建中与之，而此竟用附子者，以其证重属阳邪，必其人内有沉寒结滞不散，更兼形体素丰，可受热药，方可加热药于清理脾胃剂中，仍是用和之法，而非温经助阳之义，观下文即云泄利下重者加薤白，可知热滞虽得下利，究竟不能速通，所以急行

1 否膈（pǐgé 匹格）：即“痞满”。

咽喉痹麻黄升麻汤证例同

少阴病，二三日，至四五日，腹满，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。

按此，小便不利，少阴脉弱也，自下利不止，便脓血，则下利重证也，一因脾阳不足，下利也，故取干姜、白术之辛甘以散利固脾，再加牡蛎之甘以补中气。一因下利先因中气，中气不下，则清阳无望而自止，此大经之去也。《内经》曰：「内台方」谓其用于姜而曰里寒，谬矣。

少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。少阴病，便脓血者可刺。

无下利而便脓血，也用桃花汤。若不下利而但便脓血，也可打灸穴以散其热。今不用打灸，当从惠白去赤汤。设更其咽干，心烦不得卧，又须黄连阿胶汤为合法耳。

少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。

热邪传入少阴，过过津水，下为自利，其清而九窍相杂，色青而九黄相杂，可见邪移里证之候，反与阳邪无异。但阳邪传自上焦，其人心下必满，口必干燥。设系阴邪，则心下满而不利，口中和而不渴，岂有此枯涸之象，故宜急下以救其阴也。

已上少阴传经热证。

少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。

少阴之证，自利者最多，当寒则下利清谷，当热则下利脓血，故多用温药。传经邪邪内结，则自利化清水，温热病则自

1 内台方：即《金镜内台方议》书名，十二卷。明代许宏撰

利烦躁，开宣下夺清热。此以六七日不大便而腹胀，可见邪热转归阳明而为胃实之证，所以言急下也。然六七日腹胀，不大便，何得曰之少阳？必在先曾见口渴，目赤，烦躁，至五六日言而腹胀，不大便，是虽邪转入府，而胃土过实，肾水不足以上供，有立尽之势，不得不急攻以救肾水也。

上条少阴热邪转入阳明府证。

少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。

少阴病，难于得热，热则阳尽复阳，故本篇谓手足不逆冷，反发热者不死。然竟至八九日，固邪内陷之日，反一身手足尽热，则少阴必无此证，当是疫邪转府，肾移热于膀胱之候。以膀胱主表，故一身及手足尽热也。膀胱之证为少阴之热陷后，其热必出二阳之窍，以同主降故也。宜当用四逆散透表，兼疏利膀胱为合法也。

上条少阴热邪转膀胱府证。

厥阴篇

厥阴篇中次第不一，有纯阳无阴之证，有纯阴无阳之证，有阴阳多少多少之证，有阳过火愈之证，有阳过木愈之证。大率阳脉阳证，当从阳经治法，阴脉阴证，合用少阴经治法。厥阴见阳为易愈，见阴为难愈，其阴阳错杂不分，有必先治其里，后解其表。设见阳证不利，形重脉沉，则治法不可用，仍当先解其表矣。世医遇此用诸证，如涉大泽，茫无方向，是以动手即错耳。盖以类相繁，分为五篇，章字者易学大本也。

厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之利不止。蚘、蛔同。

消渴者，饮水多而小便少也。此因邪热盛，则消水力之由，故消而渴，其渴不为水止也。气上撞心，心中疼热者，阳火上升，邪气迫于心也。饥不欲食者，木邪横津，胃土受制也。食则吐蚘者，胃中饥，蛔臭食而出也。下之利不止者，邪在厥阴，下之徒伤厥阴，木益乘其虚耳，是以食则吐蛔，下之利不止耳。

按：厥阴原无下法，故首先示戒云“下之利不止”。盖厥多主下利，下利中伏有死证，中间虽有小承气一法，因胃有燥屎，微攻其胃，非攻厥阴之邪也。厥阴与少阳表里，邪在少阳已有三禁，岂厥阴反宜下乎？虽有“厥应下之”一语，乃对发汗而言，谓厥应内解其热，不当外发其汗，岂可泥“应下”二字，遂犯厥阴之大戒耶？今人每谓伤寒六七日当下，此特指阳邪入府而言，未尝言邪传厥阴可下也。

1 臭（xiù 秀）：同“嗅” 用鼻子辨别气味

脉微而数，至七八日肤冷，其人躁，无暂安时者，此为藏厥，非蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔，今病者静而复时烦，此为胃寒，蛔上入膈，故烦，须臾复止，得食而呕又烦者，蛔闻食臭出，其人当自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之，又主久利。

藏厥者，其人当吐蛔也，予按之当见其脉微。蛔厥者，始不烦躁，因发汗吐下太过，或寒饮内积胃中，蛔扰受惊，故不能安而时烦也。脉微而数，为阳气衰微而数，然未是其藏厥，蛔动也。四肢冷而躁无暂安时，加以脉微不止，乃为藏厥。藏厥用附子理中汤及灸法，其当吐蛔者死。若是蛔厥，则时烦时止，未为死候，但因此而病全亡阳中无阳，则死也。乌梅丸中酸苦辛温并用，以治蛔动借乱之邪，胃中之所以和而胃自安矣。以阳多主下利藏逆，所以久利而反胀血，亦不在此主治也。

病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。

病人素有寒，复发其汗，则大损胃中阳气，胃中寒则意逆，致时不安而时出也。病人以理中丸治胃阳虚之，仍不出仲景之成则耳。

伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格更逆吐下。若食入口即吐，干姜黄连黄芩人参汤主之。

伤寒本自寒下，其人下泄也，医复吐下之，损其胃中阳气，内为格拒，则阴阳不通，食入口即吐也。其格更逆吐下，言医不知，又复吐下，是为重虚，故用干姜散逆气而和其阳，辛以散

① 别至：逐渐达到。

之已。今，连理其格而刺其阳，若以泄之也。人多言胃气自阳其中，甘以缓之也。

伤寒四五日，腹中满，若转气下趋少腹者，此欲自利也。

按：多言胃气，与夫阳不同，若更转气下趋少腹，必自阳而致下利，明眼见此，自当图功于未著也。

按：腹满亦有属火者，其满必自下逆攻而上，若满自上而下趋者，定属寒满无疑。

下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出面解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虚故也。

太阳阳明并病，面色浮赤而身微热者，为阳气怫郁，宜解其表。此下利，脉沉迟，面色见少赤，身见微热，乃同太阳病于外，则身微热，格阳于上也而少赤。仲景以为下虚者，谓下无其阳而反在外在上，故云当已。当阳至于外感上出，危候已矣，或其人胃内有根，或服温药以胜阴则阳，阳得复返而争，差可支持以无恐。盖阳反虽弱不能格，然阴尚盛，亦未肯降，必郁冒少顷，然后阳胜而阴出为汗，邪从外解，自不下利矣。

下利清谷，里寒外热，汗出面厥者，通脉四逆汤主之。

上条当证，此条用药，内相互发，然不但此也，少顷见下利清谷，面色赤者，已用其法矣，及知通之下所以收之也，不然，岂有汗出而反加葱之理哉？

下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里四逆汤，攻表桂枝汤。

此与《太阳篇》中下利身疼，先里后表之法无异，彼时误

① 绵绵：接连不断

② 差可：大致可以

下而致下利，此因下利而致腹胀，总之黑里为急也。身疼痛，有里有表，必当便已通，其痛仍不减，方属于表，太阳条中已悉，故此不赘。

下利清谷，不可攻表，汗出必胀满。

此条重申下利清谷不可攻表以示戒，正与明上条所以必先黑里然后攻表之义，见误表其证，则当出而阳气壅塞胸腹，必致胀满而掣发耳，合用厚朴生姜半夏甘草人参汤以温胃消积为务也。

干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。

凡用吴茱萸汤有三证，一为阳明食谷欲呕，一为少阴吐利，手足厥冷，烦躁欲死。此则干呕，吐涎沫，头痛。经络证候各殊，而治则一者，总之下焦浊阴之气，上乘于胃中清阳之界，真气反郁在下，不得安其本位，有欲吐不能，但冲动浊气，所以干呕而涎沫也。头痛者，厥阴之经与督脉会于巅也。食谷欲呕者，浊气在上也。吐利者，清气在下也。手足厥冷者，阴寒内盛也。烦躁欲死者，虚阳扰乱也，故主吴茱萸汤，以茱萸专主升陷中逆气，兼人参、姜、枣以助胃中之清阳，共襄升祛浊之功，由是清阳得以上升，而浊阴自必下降矣。

呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。

呕与微热，似有表也，脉弱则表邪必不盛，小便利则里邪必不盛，可见其呕为胃邪上干之呕，热为阳邪外散之热。见厥则阳遗阴掩，其势最²危，故为难治，非用四逆汤莫可救也。

1 襄：帮助；辅佐。

2 渐（qīn 亲）：逐渐。

已上阴进未愈证。

大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。

大汗出而热反不去，正恐阳气散出。若内拘急，四肢疼，更加下利，厥逆恶寒，则在里先是阴寒，急用四逆汤以回其阳，而阴邪自散耳。

大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。

此证较上条无外热相显，其为阴证易明。然既云大汗、大下利，则阴津亦亡，但此际不得不以救阳为急，俟阳回尚可徐救其阴，所以不当牵制也。

伤寒，六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者死，有阴无阳故也。

六七日不利，忽发热而利，皆是内闭外阳之象。盖发热自利，里虚而外邪内入也，故曰有阴。汗出不止，表虚而内阳外出也，故曰无阳。此中伏有危机，所以仲景早为回护，用温用灸以安其阳。若俟汗出不止乃始图之，则无及矣。可见邪乱厥闭，其死生全关乎少阴也。不然，邪闭之热深气深，何反谓之有阴无阳哉？

吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。

吐利汗出，发热恶寒者，阳气外脱也。四肢拘急，手足厥冷者，亡阳不能温养经脉也，故主四逆汤以温之。

既吐且利，小便复利而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。

吐利不止，而且下利清谷，加之小便复利，津液四脱，里之虚寒极矣，况外热而汗大出，为阳复外脱，脉微欲绝者，阳

气衰微也，急下四逆以复阳为安也。设四逆不足以系其势，其用通脉四逆其见言外矣。

吐已下断，汗出而歇，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。

吐已下断，当津内安，不得复有汗出言也，四肢拘急已全承气证者，则为吐下已尽，又为真阳垂危矣，急宜通脉四逆追复元阳，更加猪胆为阴向导也。

恶寒，脉微而复利，利止亡血也，四逆加人参汤主之。

亡血本不宜用参，参以补阳，利止又不当用参，参以助阳，此以利止亡血不结，阳气下衰已甚，故用参以复阳为急也。其以加人参者，不特补阳津液，盖参为得地之参，得方耳。设误用同药，必致虚满不食，或重加参利取亡，转成下脱矣。

伤寒五六日，不结胸，腹满，脉虚复厥者，不可下，此为亡血，下之死。

伤寒五六日，邪入阳明，其热深矣。乃因邪不下结于胸，明邪不下结于腹，其脉虚而复厥，乃亡热深当下之比，以其亡血伤津，大便枯燥，恐人误认五六日热入阳明之燥结，故有不可下之之戒。盖脉虚复厥，知内外无热，原非阳证用事，即当同亡血例治。设其人阳有热于前，或阴中稍扶阳邪，不能胜辛热者，又属当归四逆证矣。

病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。

阳邪必结于阳，阴邪必结于阴，故手足厥冷，小腹满，按之痛者，邪不下结于阳，其非阴邪可知，其为阴邪下结可知，则其当用温用灸更可知矣。

伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦燥，灸厥阴，厥不还

者死。

脉微自汗，逆者下利，则阳气微而亡，灸毛际以复其阳，而阳不复则死。灸毛际以复其阳，灸毛际以复其阳，灸毛际以复其阳。

下利，手足厥冷无脉者，灸之不温。若脉不还，反微喘者死。

灸之不温，脉不至，已为死证，然或根底未绝，亦不一。若灸毛际而脉不至，已有微脉，则阳气微而亡，与少阴病六七日息高者死正同。

下利后脉绝，手足厥冷，辟时脉还，手足温者生，脉不还者死。

脉绝不至无脉，自寸亦无矣。阳气微微，已有阳气不至，若手足不至，与脉之绝者复生，一证。若用灸法，以复其阳，自如其脉之绝与伏者，故其方以名理。若逆者，最利下利者，则加大参以补其阳。若灸毛际而脉仍不至，是阳气不应，其为脉绝可知。

伤寒发热，下利厥逆，躁不得卧者死。

躁不得卧，手足阳气微之象也。大抵下利而手足冷者，皆为危候，以四肢为诸阳之本。若加以发热，躁不得卧，不但虚阳发露，而真阴亦已烁尽无余矣，安得不死乎？

伤寒发热，下利至甚，厥不止者死。

发汗而发热则不死，以发热则阳气去，下利自止也。若反下利至甚，厥不止者，是其阳气又为虚阳外散之候。阴阳两绝，故主死也。

① 根抵：基础；根本。同德堂本作“根抵”。义胜。

② 辟（zui 最）时：一整天。

发热而厥七日，下利者为难治。

厥利而热，不两存之势也。发热而厥七日，是热者自热，厥利者自厥利，阴阳两造其偏，漫无相协之期，故虽未见烦躁，已为难治。盖治其热则愈厥愈利，治其厥利则愈热，不至阴阳两绝不止耳。

伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。

脉迟为寒，寒是胃中之阳气已竭，不可更用寒药矣。腹中即胃中，今胃冷而反能食，乃是胃气发露无余，其阳亦必渐去，不能久存，故为必死。较后条之食以索饼^①不发热者，自是天渊。

已上纯阴无阳证。

下利脉大者，虚也，以其强下之故也。设脉浮革，因尔肠鸣者，属当归四逆汤主之。

下利脉大，为虚阳下陷。设脉浮革，为风邪乘虚袭肝。风邪结聚，则水饮停留，因尔肠鸣者，宜用四逆以散风利水也。

手足厥寒，脉细欲绝者，当用四逆汤主之。若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤主之。

手足厥寒，脉细欲绝，似乎阴寒之极，盖缘阳邪流入厥阴营分，以本虚不能作热，故脉细欲绝也。此为阴郁邪邪，所以仲景处方仍用桂枝汤和其中外，加当归以和厥阴之营血，通草以通太阳之本，细辛以净少阴之热，使阳邪得从外解，本非治阴寒四逆之药也。盖脉细欲绝，为阴气衰于内，不能鼓动其脉，

① 索饼：即面条。

而肌表之阳亦虚，非真阳内乏之比，故药中宜用芍药以济阴，不用姜、附以助其阳。即其人素有久寒者，但增吴茱萸、生姜，由是观之，则于姜、附于了不在乎禁乎。久寒者，陈久之寒，非时下直中之寒也明矣。

前条下利脉大，亦用此药者，以下多伤阳，阴伤则阳不相附，故脉虽浮大，而证仍属血虚也。

伤寒脉促，手足厥逆者，可灸之。

手足逆冷，本当用四逆汤，以其脉促，知为阳气内陷而于阳虚，故但用灸以通其阳，不可用温药以助阳也。

诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。凡厥者，阴阳气不相顺接便为厥，厥者手足逆冷是也。

厥有里热之证，如身大热，而不可下也，盖由脾胃之阴阳不相顺接，所以不能温顺四末耳。

伤寒，热少厥微，指头寒，默默不欲食，烦躁数日，小便利，色白者，此热除也，欲得食，其病为愈。若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。

热少厥微，指头微寒，其证轻不为重，然默默不欲食，烦躁数日，胃中津液伤而阳衰。若小便利，色白，是邪热已除，胃气渐复，故欲得食。若厥而呕，胸胁满不去，则邪聚中焦，故呕有烦满，其后则邪必走下窍而使血，以厥阴主血故也。

下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。

下利为阴邪，寸数为阳脉，若阳尽复阳，则尺脉自和，今尺中自涩，乃热邪搏结于阴分，虽寸口得阳脉，究竟阴邪必走下窍而使脓血也。

此条与上条厥呕胸胁烦满者，虽有轻重之殊，而治法不异，并宜白头翁汤。脓血止，芍药甘草汤。

伤寒，发热四日，厥反二日，复热四日，厥少热多，其病当愈。四日至七日热不除者，其后必使脓血。伤寒厥四日，热反二日，复厥五日，其病为进，寒多热少，阳气退，故为进也。

大阳以忠，发热为所重，忌其邪气传里也。厥因以少，热多为所忌，忌其邪气复外也。然热有余，又为内陷脉促自之兆矣。

伤寒始发热六日，厥反九日而利。凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中，食以索饼，不发热者，知胃气尚在，必愈。恐暴热来，出而反去也。后三日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈。所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脉之而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。

少阴经中，内藏真阳，最患阳虚，故云自利，手足不逆冷，反发热者不死。厥阴经中，内无真阳，不患其虚，但患不能发热，与人热少厥多耳。然厥证多兼下利，其阳热变为阴寒者，十居六七也。论中恐暴热来，出而反去，后三日脉之，其热尚在，形容厥证重热之脉证如睹，然得热与量相应，尤无后患。若热气有余，阳势虽退，其后必发痈脓，以热闭于血，热与血久持不散，必致壅败也。

伤寒，厥而心下悸者，宜先治水，当与茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍入胃，必作利也。

伤寒，厥而心下悸，以邪热内深，饮水过多，水气乘心所致也。水者，心人所畏，故乘之而动悸不安，饮之为患，甚于他邪，所以乘其未渍入胃，先用茯苓甘草汤以清下利之原，乃治厥，庶不致厥与利相因耳。

下利后更烦，按之心下满者，为虚烦也，宜栀子豉汤。

以下利而更烦，似乎邪未尽解，然必心下满而不满，则为虚烦，与阳明误下里气一振之证类同，故但用吐法也。

伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。

此表里错杂之邪，最为难治，为死证也。大下后寸脉沉而迟，由是邪陷少阴之故，寸脉沉微而迟，手足厥逆者，阳气不布也。下部脉不至者，谓泄利不止而利下脱也。咽喉不利，唾脓血者，阳邪搏阴于中也。所以仲景特于方中提出其阳，得汗出而错杂之邪尽解也。

或问：伤寒六七日下利，而脉沉而迟中有麻黄升麻汤之方，其故何也？曰此证之始，原系冬温，以其有喘而不利，故误认伤寒里证而下之，致泄利不止，脉反沉迟，证反复杂，皆热邪内陷，和种危证，邪自内来而陷，犹能邪邪外行，自是咽喉不利，唾脓血，则系热邪反出，邪陷少阴少阴脉之位，亦为木郁土壅，反为肝火之候。方中用麻黄、升麻，所以升陷内之热邪。桂枝、芍药、甘草，所以调和其营卫，姜、人参、大枣、甘草以补少阴之虚，故于桂枝汤一法中必加姜、参，以和阴血。姜、参、大枣、甘草，以益土厚，且姜、参为治风调营中热之方药，本文虽不言咳，而云咽喉不利，唾脓血，可知其必然大咳的痰血始也。黄芩、芍药、甘草合邪在于内之自利，芍药、石膏、甘草治热伏少阴之热逆，其邪既伏于少阴，下加母则邪热不降，且热必由阳明而解，石膏善其理不开。其所以用于姜、白术、茯苓者，以其既经大下，于此不正保护中气耳。朱氏议以此汤加入干姜、白术、芍药、姜、参、桂、苓，加入葛根、羌活、川芎、杏仁、白

薇、青木香，以治风温，总不出此范围也。

伤寒先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。

伤寒先厥后发热而利，言伤寒表证罢，先见厥利而后发热，非阴证始起使无厥利也。先厥后发热而利必自止，乃厥利之常候，下文见复利，乃预为劫变之辞。设厥利止而热不已，反见咽痛喉痹，或便脓血，又为阳热有余之证矣。

已上阴阳错杂证

伤寒先厥后发热，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹，发热无汗，而利必自止。若不止，必使脓血，使脓血者，其喉不痹。

先厥后热，下利止，其病为欲愈矣，乃反汗出，咽中痛，是邪热挟毒壅上攻而为毒痹也。然既发热，即无汗而邪亦外出，所以利必自止。若不止，则无汗时系邪不外出，仍在于里，必至使脓血也。使脓血者，其喉不痹，见热邪在里即不复在表，在下即不复在上也。喉痹者，葛根汤。使脓血者，白头翁汤。

伤寒一二日，至四五日而厥者，必发热，前热者，后必厥，厥深者，热亦深，厥微者，热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。

伤寒初起一二日时，所见皆志于发热之阳证，至四五日传进阴经而始厥也。

前云“诸阳逆厥者不可下”矣，此云“应下之”，其辞甚微。盖先阳逆与先发热而后厥者，其来迥异，故彼云“不可下”，此云“应下之”者，以其热深一深，当用苦寒之药清解其在里之热，庶存生理^①，小陷胸汤合小承气可也。即下利治

① 生理：生存的道理。

治，但用小承气汤止利，从未闻有峻下之法也。若不用苦寒，反用辛甘发汗，又不引热势上攻乎？口伤燥者，与救急互意。

呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。

呕有胃中痈脓而呕，有肝气逆上而呕，皆当辛温治其逆气，此则热聚于胃，结成痈脓而呕，即《内经》所谓“热聚于胃口不行，胃起为痈”之候。恐人误用辛热止呕之药，所以特申不可治呕，但俟脓尽自愈，言热邪既有出路，不必用药以伐其胃气也。

伤寒下利，日十余行，脉反实者死。

伤寒在一阳邪热全盛之时，其脉当实，今传次厥阴，为邪气同衰之际，况复下利日十余行，而反见实脉，是上衰邪盛，故主死也。

热利下重者，白头翁汤主之。

热利而至下重，湿热交并之象也。

下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。

下利欲饮水者，与寒利而不得自殊，乃热邪内耗津液，纵未显下重之候，亦当以前药胜其热也。

已上纯阳无阴证。

伤寒病厥五日，热亦五日。设六日当复厥，不厥者自愈，厥终不过五日，以热五日，故知自愈。

此云厥终不过五日，言厥之常。明云厥反九日而利，言厥之变。盖常则易治，变则难复也。

下利，脉沉弦者，下重也，脉大者为未止，脉微弱数者为欲自止，虽发热不死。

下利而脉沉弦，为邪热内陷，故主下重。若沉弦而大，为邪热势盛，故未易止。若无可数弱数者，为邪热同衰，故虽发

热不死。设见脉大身热，其死可知矣。

内经云下利发热者死，仲景谓下利手足反温，脉紧反去，必自愈，又曰下利手足不逆冷，反发热者不死。此皆言阳寒下利，非阳下利热内畜，热邪外泄，内外俱热之比。

下利，有微热而渴，脉弱者，令自愈。下利，脉数而渴者，令自愈。设不差，必清脓血，以有热故也。下利脉数，有微热汗出，令自愈，设复紧为未解。

脉数乃阳退阳复，在表作微热，在里作微渴。微热而渴，阳已转阳，故不言自愈。下利本阳虚阴盛，得平脉数而渴，是阳阳同盛，今则阳复矣，故自愈也。设不差，则不但阳复，必其阳转阳于阴，而阳张血也。脉数与微热互意，汗出与脉弱互意，脉紧则不弱矣。邪势方张，其不流行汗又可知矣。此与阳明脉紧则愈，少阳脉紧反去互友，阳明邪气可杀，故言紧迟退，少阴脉紧反去互友，故言弱迟杀，总不出紧去人安之妙义已。

厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈。

阳气将复，故欲饮水，然须少少与之，是谓以法救之。盖阳邪方欲解散，阳气尚未归复，若恣饮不散，反致停蓄酿成痼。

渴欲饮水，与下利后欲饮水者不同，此是热邪未解，但津液受伤而渴，彼则热邪在里致过津液而渴，未可一何而推也。

厥阴中风，脉微浮为欲愈，不浮为未愈。

按：仲景三阴皆有中风，然但言欲愈之脉，而未及于证治者，以风为阳邪，阴经之中，得风气流动，反为欲愈之机。盖厥阴之脉，微缓不浮，中风病传厥阴，脉转微浮，则邪还于表，而为欲愈之征也。

已上阳进欲愈证。

下利谵语者，有燥屎也，宜小承气汤。

下利则热不结，胃不美，何得谵语耶？此必邪返于胃，内

有厚屎，故虽下利，而重者自若也，与阳明证自异，然中有厚屎，由同一乃不同大承气，而用小承气者，以下利为重，非之属阴主里，所以但用小承气微攻其胃，全无大下之例耳。

上条厥阴转归阳明府证。

呕而发热者，小柴胡汤主之。

厥阴之邪欲散，则向上而还少阳，必发热口苦，以肝胆气相和直，故用小柴胡以升提厥阴之邪，从少阳而散也。

上条厥阴转出少阳经证。

下利后，身疼痛，清便自调者，急当救表，宜桂枝汤发汗。

下利后自利止后，虽便自调，知里气已退，但身疼痛者，邪气已还于表，故用桂枝以和营卫而愈也。

上条厥阴回阳热从外解证。

厥阴病欲解时，从丑至卯上。

上条厥阴经证自解候。

卷 下

藏结结胸痞篇

问曰：病有结胸，有藏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。何谓藏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰藏结。舌上白苔滑者难治。

结胸者，阳邪结于上也。藏结者，阴邪结于内也。然均位高，均位里，其脉之寸浮关沉，尚俱无异。但藏结之关脉更加小细而紧者，以关脉居于下焦之位，外邪至此下陷，积气由此而上，实往来之交路，所以与在下的脉反居于中也。若见舌白苔滑，则外邪固结于里，其势最重，以表里均攻之法俱不可用，故为难治。其不出方者，正欲人深究其旨而无治。不可治也。治之务在分解表里错杂之邪，使邪气渐下而内消，客邪渐上而外散，庶可图功于万一也。

藏结无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上苔滑者，不可攻也。

藏结之所以不可攻者，从本证之本证，以万仲景未尝与言，后人无从知之，不知何景言之甚明，人第以不可攻耳。人所谓不可攻者，乃垂戒之辞，正欲人详审其攻之之次第也。试思

1 第：只是

2 垂戒：亦作“垂诫”。留给后人的训戒。

藏已结矣，且可攻时岂有由开耶？所谓其外不解者，言未可攻，又谓下利咽证不可攻，又谓表解乃可攻也，言之已悉。于此特出一诀，谓藏结无阳证，不在来寒热，其人反静，见证不在六经之表里，而在上焦下焦之间途。欲知其候，但观舌上有无苔滑，有之则外感之阳热挟痞气而反在下，素痞之阴寒挟热势而反在上，此与里证已具，表证未除者，相去不远，但其阴阳悖逆，格拒不入，正转凶危耳，岂结胸证内拒也，而藏结反为不拒耶？比而攻之，是逐其当引而引而逐，不攻则其不愈，所以以攻为戒。是则谓其内寒使之相入，自舌苔既退，然后攻之，则邪风自散，痞气内消，此持危扶颠之良手眼也。

病胁下素有痞，连在脐旁，痛引少腹，入阴筋者，此名藏结，死。

按：病人素有动气，在当脐上下左右，则不可发汗。素有痞气，在胁下连脐旁，则不可攻下。医不细询，病家不明告，因而始误者多矣。

已上藏结例

病发于阳，而反下之，热入因作结胸，病发于阴而反下之，因作痞。所以成结胸者，以下之太早故也。

病发于阳者，太阳表证误下，邪陷于胃也，病发于阴者，皆足内挟以成，并感风寒，中气先伤，所以胃下不和，有心下痞也。凡结胸正在胃中，此正太阳全盛之邪，因以下乘虚而入，故曰热入因作结胸，是处方名为陷胸。若痞则多位胸胁，而尤正中结于之候，故何言因作痞，而不用热入二字，其邪之盛衰可知，是处方名为泻心。观其主药，则虚实显然不作，可知表邪为阳，里邪为阴也明矣。或言中风为阳邪，伤寒为阴邪，安

1 匪：通“非”。《诗·邶风》：“我心匪石，不可转也。”

2 持危扶颠：扶持危困局面

有风伤卫气，气受伤而反变为恶寒，寒伤营血，血受伤而反成痛之理。复有误认为中阳寒之证，下之反成痞者，则明非本无实热，何得有下里之反。设如邪气深而误下之，立受危也，恐不至于成痞，停以待变而死也。

太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为毒。头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也，医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊恼，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也。

脉浮而动数，盖主风热，下主正毒，毒既邪打日久，火毒反热，盖邪，表者不解，下不能其邪得入胃，未传他经，又误下之，于是动数之脉变迟，而在表之证反结胸矣。动数变迟，下主正，以合结胸之法治之，盖动数为欲传之脉，变迟则力已势衰而不上传，盖有邪而难升之象。胸中之气与胃实之邪内相格拒，故为结胸，胃中水谷所生之精气，因以下而致空虚，胃不化精之以中反生邪，反为外邪中而其邪，于是正气内陷邪留之邪，盖以气不足以息，更以邪有留，故至神明不安，无宁而生懊恼，凡此皆阳邪内陷所致也。

结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。

结胸同乎痉，盖邪，以急为实，盖同邪结紧实，盖势高，有似柔痉之状，然结胸身自俱张，此但同虚，以和字已，借此以喻邪十分柔缓，以大陷胸汤下之，恐过而不当，即以大陷胸丸下之，又恐邪而不行，故多蜜以缓其性，然后与邪相当。观方中用大黄、芒硝、甘遂，可谓峻矣，而更用葶苈、杏仁，以射邪，而下行其急，者时又倍加蜜量，以留恋引导之，

而下行其缓。必识此意，始得用法之妙。

结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。

初既结矣，不当下以开其结，然脉浮大，也表邪未尽，下之是令结而又结也，所以致死，此见一误不堪再误也。

结胸证悉具，烦躁者亦死。

亦字承上，见结胸证全具，更加烦躁，即不下亦主死也。按探得为寸短者，盖邪结于胸，胃气乃以通之，胃所以运为力于行者，胃气已，胃气绝于半夜之时，故之亡故一色，下之津液自伤，全其邪持饮结于当胸，而津液又色各以口上，正有不尽不已之势。胃气垂绝，能无收乎？此结胸者，见几于早，竟竟²以涤饮为先务，饮涤则津液自安矣。

伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。

热实二字，以证结胸之状甚明，见邪热结实于胃也。脉沉主脉沉，大脉沉，此言脉沉者更明。盖脉沉有寸下之引，言紧主伤寒无汗，气紧主伤寒口渴，则是此证非中风下利可成也。

伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。但结胸无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。

言结胸证所用陷胸之法者，以外邪结内成结为证，不全入于里已。若十余日热结在里，则是无汗之邪热结，必不在表，而非结胸可矣。加以往来寒热，乃表未去，当用大柴

1 几（jī 机）：苗头；征兆。

2 竟竟：小心谨慎貌。

同汤，内着表里之热邪，于泻利之义无取也。然大热与上义热实互见，内着之邪但结为同，而表里之热又不俱盛，是为水饮结在胸膈。其人关有微汗，乃邪在胸膈气不得下达之明证，此则主用大陷胸汤，允为的对也。

太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满，而痛不可近者，大陷胸汤主之。

不大便，谵语，日晡潮热，少腹硬满，证与阳明相同。但小有潮热，则不似阳明之大热。从心下至少腹，手不可近，则阳明又不似此大满，因是知其为大陷胸证，表邪因内实已。缘误汗误下，手伤津液，不大便而身易潮热，更因水饮为结，必用陷胸汤。一病动以及胃药，如得芩连九余，若但下肠胃积热，反遗膈上痰饮，则非法矣。

太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。

此条虽系并病，以其反下之而成结胸，当随其所受之证而治之于里为也。误下之变，乃致结胸下利，上下交作，而阳明之居中者，水浆不入，心烦待毙，伤寒颇¹可易言哉！

小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。

小结胸病，正在心下，则不似大陷胸之高在心上也。按之则痛，比手不可近，则较轻也。而脉之浮又浅于沉，滑又缓于紧，可见其大邪陷入原微。但水饮邪盛，扶热邪而内结，所以脉见浮滑也。黄连、半夏、栝蒌实药味虽平，而清热散结亦

¹ 颇：难道

是突圉而入，所以名为小陷胸也。

寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，白散亦可服。

寒实结胸，乃寒饮结聚而无大热也，亡阳小陷胸半夏、栝蒌实足以去其寒饮，又患寒者喜热煎炙，故又主白散，取巴豆之辛热破结，以厚之药直入部，栝蒌实之上通为向导。

已上结胸例。

伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干呕食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。

汗出邪虽解，然胃气未和，始行泻然一丸心，以胃中不和故也。汗散则邪入于内陷，则发汗自止，内相告也，其人心下必痞硬，以伏饮为聚，胃气不足以升之也。得泻，故干呕食臭，其人有腹中雷鸣也。下利，故水入胃中而停也。胃中水谷不行，腹中必雷鸣而振击有声，下利与清浊不分也。虽不由误下，而且成痞，设误下之，其痞结又当何似耶？

伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也，甘草泻心汤主之。

此条痞证，伤寒与中风互言，大旨具见，可见病发于因下之时或痞者，非指伤寒为因也。下利之谷，腹中雷鸣，皆以下而胃中不虚之互辞也。设不知此义，以方证热而复下之，其痞必益甚，反重以泻中气，客气上逆，招摇痞满。方用甘草泻心汤者，即生姜泻心汤除去生姜、人参，加倍甘草，干姜也。客邪乘虚陷于心下，本宜用人参，以补而导之，其痞已成，人

多；无阳证之时，故不用同一生姜半两，最宜用者，终以人参散，恐其欲散而升，客邪从之犯上，故以同一姜代之以升散，重用甘草为君，坐镇中宫，使心下与腹中静至了全。今人但知以生姜代半夏之降，孰知以半夏代生姜之散哉！但知甘草能增满，孰知甘草能去满哉？

伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤，此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡汤不中与之，宜半夏泻心汤。

五六日呕而发热，为太阳之本证，盖本多阳明。然有太阳邪气未罢，欲传阳明之候。有少阳邪气在里，欲攻阳明之候，所以阳明致成云：本多量有阳明日，不可攻之，恐伤太阳少阳也。此本太阳证，误用下药，则邪热乘虚入胃，而胆却受寒，故于生姜泻心汤中去生姜之走表，君半夏以当胆，兼芩连以除胃中邪热也。泻心者方，原为泻心下痞邪之寒饮水气有设，此证起于呕，故推半夏为君耳。

伤寒大下后复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表。表解，乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。

大下之后复发汗，无里证表，虽微恶寒，无是已陷之邪，亦结心下，证兼恶寒，表邪不为汗衰，即不可更攻其痞，当先有解肌之法以治外，外解已后，乃用大黄、黄连攻其内热凝聚之痞，方为合法耳。

1 澄(jian 见)：超越本分；过分

脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳。心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。心下痞而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。

伤寒脉浮而紧，即不可下，下之则紧反入里，此所谓转入转深也。外邪与表邪去，故心下濡软，若按之自濡，即不可下，乃是阳气怫郁聚于心下，此与少阳九针也。冲气上逆，苦其可下之，十条大泻泻心汤之法即为下之。若见邪在里，虽有里热痞聚于心下，自拟阳证下利之证，故于大泻泻心汤内，乃用附子汁和服，以各行其事，其成位不一之力，曰泻心汤方中，法度森森²若此。

伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛欲呕吐者，黄连汤主之。

伤寒，邪气传里，即为下利，即热也。胃中有邪气，使阴阳不交。阴不得升，有结于心下，为下利腹中痛。阳不得降，自见是³于上，乃腹中热欲呕吐，故于半夏泻心汤中除去黄芩而加枳实，去黄芩者，为其有下利腹中痛也，加枳实者，用以散胸中之热邪而令呕吐也。一⁴，曰：上热者泻之以苦，下寒者散之以辛，故用黄连以泻上热，干姜、枳实、半夏以散下寒，人参、甘草、大枣以益胃而缓其中，此分理阴阳，和解上下之正法也，盖因此而由及截结之舌上苔黄，胃家之舌上如苔者，皆不出是方也。

太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之，其人黎黎汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗

1. 倾否：丧乱；危殆。此指攻邪。

2. 森森：繁密；严正。

3. 菀（yùn 运）：通“蕴”，郁结；积滞。《素问·生气通天论》：“大怒则气绝而血菀于上。”

出，不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。

此证与结胸相同，但结胸者邪结于胸，其位高，此在心下及脐，其位卑。然此表证乃可攻之，亦与攻结胸之戒不殊也。其人脉浮而重，反作有时，自汗与夜俱多，即此便是表证之征，虽有表证，心下硬满，言胃下硬，主饮邪气结胸，乃挟邪打关之本证，不得以表证名之。见汗出，不恶寒，便是表解可攻之候。设外邪不解，何缘得汗乎。故乃取十枣汤者，主与陷胸相仿。陷胸证和半夏，以为清痰而设，今证在胃下而不在胃，则乾姜芩连之药无取矣，故取芫花之辛以逐饮，甘遂一大钱之苦以逐水，并加大枣之甘以缓之，此诸药祛水次于陷胸之下，乃下剂中之变法也。

伤寒发汗，若吐若下解后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭石汤主之。

证同下云备言此表证，则中气必虚，盖此中气不降而欲上冲，故作心硬。中气上冲与中气不实，故中气不除，所以用代赭无人参下白，以镇安其冲气，微加胃邪药次，而其其痞，则噫气自除耳。

伤寒，服汤药，下利不止，心下痞硬。服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复利不止者，当利其小便。

误下利下利不止，心下痞硬，服泻心汤为合法矣。乃复以他药下之，他药则宜高透下焦之药，与心下之痞全不相涉。纵痞硬微除，而关与胃振，利无休矣。又取包围。用理中以开痞正利，原不力过，其利益甚者，明是以药为壅，徒重其奔迫也。故用赤石脂禹余粮固下焦之脱，而重修其关固。利更不止，复重又利水，以杀急奔之热，则水谷分利下利自止。

本以下之，故心下痞，与泻心汤痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。

泻心诸方，开结泻热益虚，可谓具备，乃服之而痞不解，更加渴而口燥烦，小便不利者，五苓散利之法，正当主用，盖其功擅开中宣壅，导饮泻热，所以亦得为消痞利之良法也。

太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。

误下而致里虚，表外热乘之，变为利下不止者，里虚不守也。痞硬者，胃虚邪实，中气微结也。盖白芍药也。以表未除，故用桂枝以解之，以里虚寒，故用甘草以和之，即理中加桂枝而易其名，为治虚痞下利之圣法也。

伤寒，发热汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。

外邪不解，转入于里，心中痞硬，以吐下利，攻之可硬表，不改则里证已重，故有大柴胡汤，合表里而治之也。

太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤甲者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。

凡表里错误，证变危笃，有谓已亡阳邪尚不尽者，有谓邪尽而阳气亦随亡者，有外邪将尽未尽而阴阳未全愈者，此可愈不可愈所由分也。大言心下痞与阳同结，虽有上下之分，究竟皆是阳邪所聚之位。既无阳则阴独，语正见以成痞之故，盖言阴阳并竭，实由心下无阳，故阴独结聚也。无阳则阴独，已括尽误下成痞大义。无阳亦与亡阳有别，无阳不过阳气不治，复加烧针以逼劫其阳，乃成危候，其用药差误即可同推。

已上痞证例。

合病并病篇

太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。¹ 又同。

太阳病，项背强几几，无汗恶风，葛根汤主之。

条文有汗无汗是伤风伤寒，仲景以“几几”个似太阳，其经络项背强几几为阳明之证，本太阳证各半，故不用合病字。然虽不名合病，其实乃合病之初证也。且此证不可也，项背强几几为阳明之证，一不名合病，则证不可不和矣。太阳风伤卫证中，才见桂枝汤证，即于桂枝汤中加葛根一方，太阳寒伤营证中，才见麻黄汤证，即于麻黄汤中加葛根一方，此大凡大然不易之证也。然第一条不用麻黄汤加葛根，反用桂枝汤方加麻黄、葛根者，以证项背强几几者，乃于得证之处，反以麻黄汤加葛根大发其汗，考汤以证强几几者，乃为经邪热而动阳乎。此仲景之所以精义入神也。

太阳与阳明合病，不下利但呕者，葛根加半夏汤主之。

太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。

条文以下利不下利证引合病主证之不同也。风者，阳也，邪气上行，故合邪则胃中之水液向上注。寒者，阴也，邪气下行，故合邪则胃中之水液而下注。然上注则必加半夏入葛根汤以条饮止呕，若自下利，则但用葛根汤以解内经之邪。下利，阴也，而仲景以此方主之，盖以邪气并于阳，则阴实而阳虚，阳虚故下利也。与此汤以散经中之邪，则阳不实而阴气平，不治利而利自止耳。

1 彀率（gòulǜ 够绿）：拉开弓的标准。此指标准。

太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤主之。

两经合病，当合用两经之药，何独偏用麻黄耶？此见仲景析义之精。盖太阳邪在表，阳明邪在胃，两邪相合，必上攻其冲，所以喘而胸满。麻黄汤在治卫气郁闭之专药也，用之恰当，正所谓内举不遗余力也，何偏之有。

按：太阳与阳明合病，所重全在于表，故主以葛根、麻黄二汤，若太阳与少阳合病，则邪渐迫里，合用小柴胡、柴胡桂枝二汤。若温病之太阳少阳合病，当用黄芩汤、黄芩加半夏生姜汤。其下阳明少阳合病，以邪入府，脉来滑数，即用大承气下之。与二阳并病，太阳证罢不殊也。设经证未罢，脉不滑数，又当从大柴胡两解表里无疑，其太阳与少阳合病，本条见《温病篇》中，宜参看。

阳明少阳合病，必下利，其脉不负者，顺也，负者，失也，互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。

水土之邪交动，则水谷不化的包舍，故下利必起。阳明脉大，少阳脉弦，均无相负，乃为二经并病。然两经合病，阴阳之气衰，则弦独见，少阳胜而阳明负矣。下之固是两经通用之法，而上受克贼之邪，势必藉人力之药，急从下夺，乃为解围之奇药。然亦必其脉滑而数，有宿食者，始为当下无疑。设脉不滑数而迟软，方虑土败垂亡，尚敢下乎？

已上合病例。

二阳并病，太阳初得病时发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆。如此可小发汗，设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当

解之重之。若发汗不彻，不足言阳气拂郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气，但坐¹以汗出不彻故也，更发其汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩故知也。

二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足濈濈汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。

二阳并病一条，皆是太阳与阳明并病。上条证初入阳明，自太阳传来云，寸关小²，此条证已入阳明，而太阳亦证罢，故宜大下也。

按：上条太阳初得寒伤营之病，因汗出不彻，故传阳明，续自微汗出，不恶寒，阳明热炽，似乎当用下法，以太阳之邪未彻，故下之为逆，谓其必成结胸等证也，如此者可小发汗，然后下之。设面色缘缘正赤者，寒邪深重，阳气拂郁在表，必始先未用麻黄汤，或已用麻黄汤而未得汗，所以重当解之重之，又非小汗所能胜矣。若是发汗不彻，不当言阳气拂郁不得越也，毕竟当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，方是阳气不得越耳。短气者，因汗不彻，而邪气未尽，气受伤也。脉涩者，以寒湿留于肌肤，而营气不能条达，血受伤也。汗后短气脉涩，但当断之以汗出不彻，而与桂枝二越婢一汤，小发其汗则愈。

太阳病桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也，喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。

太阳证本无下法，但言用桂枝解外。若当用不用，而反下之，利遂不止，是热邪之在太阳者，未传阳明之经，已入阳明之里，所以其脉促急，其汗外越，其气上奔为喘，下奔则泄，故舍桂枝而用葛根，专主阳明之表，加芩连以清里热，则不治

1 坐：因为。

喘而喘自止，不治利而利自止。又太阳阳明两经表里之交法，与治痞之意不殊也。

太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间，肺俞、肝俞。慎不可发汗，发汗则谵语，脉弦，五六日谵语不止，当刺期门。

刺大椎者，泻阳督脉也。刺肺俞者，使邪气下行而膀胱气化也。刺肝俞者，泻以治法也。刺期门者，泻肝胆之实也。

太阳少阳并病，心下硬，颈项强而眩者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。

重申不可下之禁，与上条不可汗互发。

伤寒腹满谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。

肝木自乘胃土为纵，此亦太阳少阳并病，以其人平素肝盛脾衰，故其证发为谵语，是肝邪乘脾之候。虽少阳风木，仍赖卫气荣养，故以仲景以此属胃。胃不和，所以夜为谵语也。其脉寸口浮紧，为太阳表证之脉，寸口口气口，乃脾胃之所主，肝木扶邪过盛，所以脾胃之主谷受其制也。刺期门以泄肝邪，则中土攸宁矣。

伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘肺也，名曰横，刺期门。

肝木反乘脾土为横，此亦太阳少阳并病，以其人素肝盛脾虚，故其证虽发热恶寒，为太阳表证未除，有大渴饮水，则少阳里热已著。盖木盛则火易煽，金虚则水不生，故以求水为润，木得水助，其势益横，水势泛滥，其腹必满，亦当刺期门以泄肝邪，则脾自安矣。然但腹满而不谵语，其邪较轻，以脾金较肝木量虚，原无他病，能增为运布，故自汗而水得外渗，

又小便利而水伤下利，更以攻散自解，不必制也。设名期以制期门在欲解下，而以辞害义也。

按：纵横之证不同，而皆刺期门者，以贼土侮金，总由木盛，胀满谵语，证涉危疑，故急以泻木为王也。

曰冬月宜温，今反寒者不可下也，若论与下，尤宜柴胡桂枝汤加减，观下条“发汗多，亡阳，谵语”治法，可类推矣。

发汗多，亡阳，谵语者，不可下，与柴胡桂枝汤和其营卫，以通津液后自愈。

太阳与少阳并病，不可发汗，发汗则谵语，下利不止者，复不可下，宜桂枝柴胡以和二经营卫也。

伤寒六七日，发热微恶寒，肢节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。

支结者，支饮结于心下之候，非正结也。伤寒至六七日，宜传三阳，乃发热微恶寒，肢节烦疼，微呕，其邪尚在少阳之界，未入于里，故心下支结，而外证未除，然正结则可下，故但用柴胡桂枝，使太阳之邪仍从太阳而解，邪去而支饮自开矣。

伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小使不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热心烦者，此为未解也，柴胡桂枝汤主之。初服微烦，复服汗出便愈。

五六日已发汗，邪虽未解而势已微，故虽下之，而邪凝聚于上焦，则其气上逆，故渴而不呕，头汗出，往来寒热，心烦，知邪气已入少阳之界，故为未解。因与柴胡、桂枝以解太阳少阳之邪，黄芩、甘草散内外之热，生姜主胃中寒饮，枳实根治上焦热渴，芍药以平肝下之微结也。良汤而复加微烦者，正

汗出之药也，且汗出者，邪已微，不可复汗也，不汗者，邪也，必须复服，药胜病邪，方得汗出而解。

上二条皆大柴胡证也，因本条中有“往来寒热”一语，故以“往来寒热”证节庵之文以小柴胡证为便。然，亦不可言表邪初犯中焦者，方为有效。若邪已陷，则邪已陷，不可下，非大小陷胸汤丸峻攻，必不能解散也。

阳明病发高热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，小柴胡汤主之。

此条与上二条同，高热者，阳明与热之证。若大便溏，小便自可，则胃气不实，更不可下。若胸满不去，则证已见少阳矣。才兼少阳，却有上下二证，惟小柴胡证也，合表里而治之，乃少阳证之主药，故可用以治之，尤为法也。

阳明病，得下反满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解也。

此亦可用小柴胡汤，不但大便溏为胃未实，即使不大便而见胸、硬满，亦与舌苔之证，胃少者为多，亦当从小柴胡汤分疏阴阳，调上下通和，则水自下，而舌苔亦退也。胸满之外证，可俱留矣。既言津液得下，则大便自行，亦可知矣。此二证表里俱彻，所以为当也。

上焦得通，津液得下八字，关系病机最切，风邪之邪，与津液同于肠胃中，为气为水，为水逆为结胸，第上言六七，是风邪不解，则津液必不得下，倘误行发汗，不但津液不下，且转增上逆之势，愈无退息之期矣。

已上并病例

1) 药烦：服药后出现烦闷及头、身发痒等症。

2) 节庵：陶华之号，明代医家，字尚文。撰《伤寒六书》等书。

温热病篇

仲景虽病热历诸例，并未记入伤寒六经例中，致使后世有以黄芩、白芍汤误治伤寒者，有以黄芩、白虎证误治伤寒者，良由混次不分，以致蒙昧千古。自长沙迄今，惟守真¹一人独得其秘，而又得其名目，不曰风热，而曰伤寒，何怪当世名家动辄错悞耶！今将温热诸条，另归此篇，学者悉心读之，如琅函²一展，火轮剑树³，顷化清凉大地也。

太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。

发热而渴，不恶寒，提挈温病自内而发之大纲。凡初病不恶寒，便发热口渴，一二日内，或微渴，或下利者，此温病也。若先恶寒发热，一二日后，表邪传里，变而渴者，此又伤寒热邪传里而显内实也。

若发汗已，身灼热者，名曰风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲。若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时痲疯，若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

此条紧接上条，其下即云若发汗已，身灼热者，名曰风温。可见风温之病以发汗后身灼热为叙者，与更感于风而发者，自是两岐。风温之证，盖太阳少阴，其脉尺寸俱浮，盖肾水本当沉也，风从表入，从太阳而入，根本投而枝叶荣矣。伏邪久郁身中，则当一汗，其脉先见沉矣。发则表热太阳，里热少阴，将同用事，

1 守真：刘完素之字。金代医家。撰《伤寒直格》等书。

2 琅函（láng hán 狼寒）：书匣的美称。

3 火轮剑树：喻恶劣境况。火轮，指形似车轮的团火；剑树，地狱中的景象。

恣行无忌，灼热反信，足谓风温。风温表里俱见浮脉，其证自汗，身重，肾水耗也，多眠睡，鼻息鼾，语言难，肾水一伤已肾中之候，同时若二至，危且殆矣。古律重戒云：风温治在少阴，不可发汗，发汗死者，国杀之也。盖发汗之初不及保汗，轻易发汗，早已犯此大戒乎。既肾中风邪外出，以阳从阳，热无休止矣。被下者，小便不利，伤其肾气也，直视失溲，太阳藏府同时绝矣。被火者，微引热伤肾气而发热发黄，弱则热易生风，而如惊痫，而烦燥，火热乱其神明，乱其经络也。伤其经络内反，伸屈反戾，全谓亡阳戾之。被火，发黄色”一段，乱其神明，乱其经络，重症莫重于此，何论误火，少阴脉系戴眼，戴眼者，乃至危也，亦多死者。发汗，已是引日待死，再误此律条莫挽矣。故言风温，全在未发汗前，其脉证，补救备至，防危可以。发汗已后，凶咎坐至，亦何措其于是哉。内篇·阳明论云，荣卫已虚，其热内连肾。此论热论篇，专论谷气，守中精气，乃注为生，肾中虚甚，更热则死。其言至矣，尽矣。仲景复出不尽之微，论肾是视物犹以伸屈之，小便伤肾气也，肾阳直见失溲，命门所藏之精不能照物，神水绝矣。眸子尚者，太阳不足，戴眼者，太阳已绝，太阳气绝者，其足不可屈伸，是以中风累证多绝筋脱，人不识者，故风温抱要一筋脱，若肾气将绝，宁不筋脱先绝乎。

太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。若呕者，黄芩加

1) 本：文化本作“水”

2) 存：犹仍；屡次

、 、 、

1) 戴眼：证名，指病人眼睛上视，不能转动。

、 扼（扼）要：占据或控制要冲。此指侵袭

半夏生姜汤主之。

此言太阳传至少阳之证，明其传次少阳之证，固为温病之证也。以其人中气未虚，热邪不能外泄，故内攻而不利也，与黄芩汤解散表里之热，较之伤寒治法迥殊。

按：黄芩汤乃温病之主方，即桂枝汤以黄芩易桂枝而去生姜也。盖桂枝主在表风寒，黄芩主在里风热，不易之定法也。其生姜半夏，非温热所宜，故去之。至于痰饮结聚肠上，又不得不用姜、半，此又不越伤寒治法耳。

按：温病始发，即当用黄芩汤去热为主，伤寒传至少阳，热邪渐次入里，方可用黄芩佐柴胡和解之，此表里寒热之次第也。

阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，反恶热，身重。若发汗则躁，心愠愠，反谵语。若加烧针，必怵惕烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊恼，舌上苔者，栀子豉汤主之。若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加入参汤主之。若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。

此伏气因感客邪而发，故脉见浮紧也。然浮紧之脉而见发热汗出，不恶寒反恶热之证，虽是温病，却与伤寒之阳明无异，加以咽燥口苦，腹满而喘，身重，均系热之候，所以汗下烧针俱不可用，宜其黄芩、白虎等证也。更兼风寒客气在膈，故舌上苔者，而黄芩星又禁用，则当再以栀子豉汤，此治太阳病无得阳明矣。若证证更加口干舌燥，则宜白虎汤以解热生津。若更加反热烦渴，小便不利者，又为热托阳明津液，更宜猪苓汤以导热泄下。盖此客邪更气在胃，难用黄芩、白虎等寒药，故别寻旁蹊¹，以散热²邪耳。

1 旁蹊：另外的途径。

2 热：清康熙重刻本作“寒”。

伤也。小便不利，以水多者属气分，以热多者属血分，猪苓汤主之。然热多之小便不利也，水多者，属表证，猪苓汤主之者，属里证，水多者，伤寒证，水多者，由血分而传入血分，由热由血分而发出气分，不可以此而碍彼也。

阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多，胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。

太阳伤寒证本，有五苓散证之一人，与桂枝汤证，复有猪苓汤证，此三法，皆主汗多而渴者不可与，盖汗多而渴者，津液耗竭，汗少而渴者，津液少也，故汗多而渴者，是先耗其津液，加以汗多而全之于外，复利其小便而全之于下，则津液更亡而已。其脉浮，反渴，渴欲饮水，小便不利而汗出少者，方可用猪苓汤。脉浮反渴，渴欲饮水，口干舌燥而汗出多者，当先用白术，其法已具上条。若脉沉，热多汗多，渴欲饮水，而小便黄赤不利者，又当从气分下之，以叔和为急也。

二阳合病，脉浮大，上关上但欲眠睡，目合则汗。

阳热之气，自内而表，故二阳合病最多。此条言阳病，故曰目合则汗，其非热病之寸脉大证可知矣。以其表里俱热，六经俱邪，故关上之脉浮大，但欲眠睡，其方阳证之热又可知矣。而目合则汗，又属少阳，故当从小柴胡汤治之。或谓猪苓汤加柴胡无碍。盖热病虽脉浮大，但欲眠睡而汗出者，为正气未虚，故热势反不甚剧，又当用白虎加人参汤也。

三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，谵语，遗尿，发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷，若自汗出者，白虎汤主之。

此言热病兼渴之合病也。夏月天令炎热，伏郁之邪多乘暑气，一齐发出三阳，中州之扰乱可知矣。此时发汗，则津液倍

渴，故谵语益甚。下之则邪内陷，故手足逆冷，热不得越，故额上生汗也。既不宜于汗下，惟有白虎汤，主解热而不碍表里，在所急用。若疑手足厥冷为阳虚，则杀人矣。

伤寒，脉浮滑，此表有寒，里有热，白虎汤主之。

世本作表有热，里有实，必系传写之误，千载无人指出，今特表出。一。齐众楚，在。本经。大。白虎汤本治热病暑病之功，其性大寒，安有里有实者司服之理。且本云脉浮滑，而谓脉无不实之理，则系伏邪发出于表之征，以其热邪初乘肌表，表气不能胜邪，其外反显假寒，故言表有寒。而伏邪始发未尽，里热犹盛，故言里有热，以其非有显见实热，乃用白虎解散郁发之邪。或言当是表有热，里有实，实字与云字形类，其说固是，若果里有实，则当用承气，又不当用白虎矣。

按：此本言热病。何仲景不曰热病，而曰伤寒者？其藏机全在乎此，欲人深求而自得也。盖热病乃冬不藏精，阳气发泄，骤伤寒冷，致邪气伏藏于骨髓，至夏大汗出而热邪始发，故仍以伤寒目之。以伏邪初发，脉浮滑，故用白虎汤。白虎汤中石膏清肺胃之热，知母清少阴之源，甘草、粳米护心包而保肺气，是以气弱者，必加人参也。后人不审，每以白虎汤治冬月伤寒发热，今特昭揭此义，以为冬月擅用白虎之戒。

伤寒脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之。

滑，阳脉也，故其实力阳气。里热郁积，所以其外反显寒厥逆，往往有唇面爪甲俱青者，故宜白虎或竹叶石膏解其郁热，则愈也。

1 一齐众楚：亦作“一溲众咏”。典出《孟子·滕文公下》。原意谓一个齐人教楚人学习齐语，而众多楚人用楚语喧哗来干扰。常用来比喻正确的言论，如真理，被多数人的错误言论所淹没。《孟子·滕文公下》：“……一齐人傅之，众楚人咻之，虽指而为誓，其不可用，拔木叩石，大声疾呼，而不可听，此之谓也。”

此条明言里有热，合见前条之“表有热，里有寒”为误也。叔和因脉证而误，遂以此例混入《玉尺篇》中，今日此

伤寒，脉浮，发热无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

白虎但解热而不能解表，故热病稍带里寒客邪，恶寒，头痛，身疼之表证，皆不可用。须脉洪大成数，烦热燥渴，始可与服。若先而微带里证表邪，一二日后客邪先从表散，但显热病脉证，烦渴欲饮水者力津液大耗，又非白虎所能治，必加人参以助津气，则热邪始得解散耳。

伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

伏热内盛，故口燥心烦，以真阳不能胜邪，故背微恶寒，而外无大热，盖白虎有内热毒，加人参以助真气也。

伤寒病，若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

详此条表证比前较重，何以亦用白虎加人参耶？本文“热结在里，表里俱热”二句，已自的呈，惟热结在里，所以表热不除，邪火内伏，所以恶风，大渴，舌燥而烦，欲饮水不止，安得不以生津解热为急耶？

服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。

此本温热病，误认寒度，而服桂枝汤也。若是寒度，则服汤后汗出必解矣。不知此本温热，误服桂枝，遂至脉洪大，大汗，烦渴不解。若误用麻黄，必变风湿灼热目赤等证矣。此以大汗伤津，故加人参以救津液也。

按：桂枝治自外而入伤之风邪，石膏治自内而发外之热邪，故白虎汤为热邪中喝之的方。虽为阳明解利药，实解内蒸之热，非治在经之热也。昔人以石膏辛凉，即解利阳明风热，此说似是而非，即如大青龙汤、越婢汤、麻黄杏仁甘草石膏汤、麻黄升麻汤等方，并与表药同用，殊不知邪热伤胃，所以必需，若在经之邪，纵使大热烦渴，自有葛根汤、桂枝加葛根汤等治法，并无借于石膏也，所以伤寒误用白芍、黄芩、温热误用桂枝、麻黄，轻者必重，重者必死耳。

已上三阳发温热例。

师曰：伏气之病，以意候之，今月之内，欲有伏气。假令旧有伏气，当须脉之。若脉微弱者，当候中脘似伤，非截瘕也。病人云：实咽中痛。虽尔，今复欲下利。

冬月感寒，伏藏于经，至春当发，故曰以意候之。今月之内，欲有伏气也。若脉微弱者，其人直无邪气，岂不发于咽中及寸口，以少阴之脉中而候，伏邪不发，热必上升，故先喉中痛似伤，肾司二便，少阴之热邪不能升发，势必内攻，其下必下利也。

少阴病，二三日咽痛者，可与甘草汤，不差者，与桔梗汤。

邪热客于少阴之经，故咽痛。用甘草汤者，和缓其势也。用桔梗汤者，升提其邪也。此在二三日，热邪发于少阴，他日未具，故可用之。若五六日，则少阴之下利咽痛诸证蜂起，此法又不可用矣。

咽痛为病，其发必暴，所以伏气发于少阴必由咽，仲景遂以缓法言之。甘草味甘，其性最缓，因取以治少阴伏气发见之最急者，盖甘先入脾，脾安则胃火之势亦安，且甘用力能泻火，故不兼别味，独可以取专功也。设不差，必是伏邪所发势盛，缓不足以济急，更加桔梗，升载其邪，使发于阳分，则邪尽从阳分而散，不致仍复下陷入于阴分也。倘治稍失宜，阴津为热

邪所耗，即用祛热救阴药，恐无及也。

按：咽痛多是阴邪搏阳之候，以阴邪为患，无有不挟龙火之势者，所以属少阴者多。唯阳明经病，有但头眩不恶寒，能食而咳，其人必咽痛一条，乃风热挟饮上攻之证，又不当与阴邪比例而观也。至于湿病风湿，多有此证，以阴中伏有阳邪也。即直中少阴之咽痛，虽阴邪结于清阳之位，仍是少阴之经，故仲景特设通脉四逆汤，以补阴中郁没¹之微阳，更加桔梗以清咽利膈也。

少阴病，下利，咽痛，胸满心烦者，猪肤汤主之。

下利，咽痛，胸满心烦，乃少阴伏邪，从火化而发，其方以清证，邪热充斥，上下中间，无所不到，寒下之药不可用矣。又猪肤汤，以清少阴之邪，与用甘药反之，甘以润燥者，用用了²。一用甘者，一用猪肤汤也，同其救邪之又一证，思过半²矣。

少阴病，得之一二日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。

少阴病，二三日以上心烦，知非传经邪热，必是伏气发温，仅一二日，便心中烦不得卧，然在少阴无利，则与黄芩汤证区别。盖直中发温，必先有气满、力乏、力下利、力四五，乃致心中烦，既在少阴，今但心烦，不得卧，而无下利。因以黄连为主，是为清心、力真、力利、力下利，故以按热存阴力也。

少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。

下利六七日，本热去寒起之时，其人呕渴，心烦不眠，不

1 邪没：埋没。

2 思过半：谓已领悟大半。《周易·系辞下》：“知者观其象辞，则思过半矣。”孔颖达疏：“思虑有益，以过半矣。”

独热邪迫真阴，兼有水饮搏结，以故碍胃不去，用猪苓汤以利水润燥，不治利而利自止也。

少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。

伏气之发于少阴，其势最急，与伤寒之传经热证不同。得病一二日即口燥咽干，延至五六月始下，必枯槁难为矣，故宜急下以救肾水之燔灼也。

按：少阴急下三证，一属传经热邪亢极，一属热邪转入胃府，一属伏邪发于少阴，三者皆属阳明热证，故宜急下。下三法同源异流。

已上少阴发温热例。

杂 篇

伤寒所致，太阳痉湿喝三种，宜应别论，以为与伤寒相似，故此见之。痉俗作瘥。

太阳病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉。

本寒伤营，故发热无汗，邪至经，邪入深矣，而犹恶寒者，经所故也。寒伤营血，则经脉不利，故身强直，而为刚痉也。

金匮 又有“太阳病，无汗，而小便反少，气上冲胸，口噤不能言，欲作刚痉，葛根汤主之”一条，即是申明此条之义，而补其治法也。无汗而小便少者，以太阳阳明二经之热聚于胸中，延伤脾金清肃之气，内外不能宣通故也。

太阳病，发热汗出，不恶寒者，名曰柔痉。

本风伤卫，故发热汗出，不恶寒，以风伤卫气，邪理疏，故汗出身柔。但汗出太过，则经脉空虚，虽似身软，而较之刚痉尤甚，以其本虚故也。太阳病属气为邪胜，柔痉属阴为血虚，故治法有不同耳。

金匮 又有“太阳病，其证备，身体强几几然，脉反沉迟，此方痉，栝蒌桂枝汤主之”，即桂枝汤加栝蒌根二药，其证备，则发热汗出等证，不必赘矣。

伤寒方中用桂枝加葛根汤矣，此以脉之沉迟，知在表之邪为内湿所持不解，即系湿热二邪交合，不当从风寒之表法起见，故不用葛根，而改用栝蒌根，变表法为利法也。

太阳病，发热，脉沉而细者，名曰痉。

脉沉细者，湿胜而致痉也。病发热，脉当浮数，而反沉细，知邪风为湿气所着，所以身虽发热，而脉不能浮数，是阳证见阴脉，故 金匮 指为难治也。治此者，急宜麻黄附子细辛汤

温经祛湿，勿以沉细为湿证之本脉而忽之也

太阳病，发汗太多，因致痉。

发汗太多，则伤虚风者，盖汗为心液，汗多则心液虚之位，非真武汤必难救疗也

病身热足寒，颈项强急，恶寒，时头热面赤，目脉赤，独头面摇，卒口噤，背反张者，痉病也。

身热足寒者，色言¹，中风已入其经络，皆风虚汗出之位，盖风主动摇，故身摇也，风主目，本于火者色赤，是以独头面赤，盖目睛，本于地者水下，是以足冷也。盖此条下又多“若发汗者，恶寒相薄，其表益虚，即愈其甚，发其汗已，其脉如蛇”六句。发汗反恶寒者，以但用表药而不加本故也。言其脉如蛇者，汗出之时，阳气发外，其脉必洪盛，后气自内出，阳气退虚，寒湿之邪得干筋之外，所以其脉复见浮紧，而指下迟滞不前，有似蛇行之状耳。

按：《金匮》此后复有五条，其一云“夫风病下之则痉，发汗必拘急”。盖风病而热者，其邪已应于筋脉，若更下之，则伤其营血，筋无养而成痉，汗之则伤其卫气，脉无养而拘急矣。其二云“暴腹胀大，为欲愈，脉如故反伏弦者痉”。盖脾土得木火而为暴胀，知火之即于肝者，已出之脾，木火气行，则脉当浮大，今不浮大而如故，知风犹郁在肝，则筋病而成痉矣。然此必暴胀之先，已见欲解之证，故云。其三云“夫痉脉紧如弦，直上下行”。盖紧直如弦，肝脉也，而直上下行，则又属肾脉为病，所以脊强而厥也，与《脉经》“痉家其脉伏坚直上下”同义。其四云“痉病有灸炷者难治”。盖痉病风热燥急，不当复灸以火，深入助阳，风热得之愈固而不散也。其五云“痉

1. 色：接近。此指侵袭。

为病，胸满口燥，卧不着席，脚挛急，必齕¹齿，可与大承气汤”。盖热传阳明，风热极深，所以有如上诸证，非苦寒大下，不足以除其热，救其阴也。夫伤寒病瘧，以热生风而搐，向为难治，况此基于搐者。至若齿齕足挛，而无内实下证，大便自行者，必不可治。《灵枢》云“热而痉者死，腰折，反折，齿齕也”。

已上疼痛例

太阳病，关骨疼痛而烦，脉沉而细者，此名湿痹。湿痹之候，其人小便不利，大便反快，但当利其小便。

关骨疼痛而烦者，言湿气流着筋节生之病，而发热烦疼也。脉沉而细，则系于里，虽疼处虽热，总主风湿，是当利水为要也。

大抵此证，当利小便以去湿气，今为湿气内注，故小便不利，利之则湿气得行，湿在关节之间，亦得自去矣。设小便利已而关节之痹不去，又当从表治之。

湿家之为病，一身尽疼，发热，身色如黄者。

身汗发黄，谓身虽热表里，湿热在里，黄为邪色；在表，则身黄皮黄；里湿在里，则米泔子汤；在表，在黄于本汤。此身汗在表而发黄也。《金要》有云：“身虽身尽疼，不可发其汗，发其汗为逆，慎不可以火攻之。”盖湿与邪合，故令身疼，以湿着在表，表湿邪气不著，故不可大发其汗，是以用麻黄汤，必加白术以去湿邪，身已一麻而得本，则汗不致于暴发，不得其黄，而身湿得以宣通。然湿邪在表，惟可汗之，不可火攻，火攻则增其热，必有发黄之变。故戒之。

湿家其人但头汗出，背强，欲得被覆，反火，若下之早则哕，胸满，小便不利，舌上如苔者，以丹田有热，胸中有寒，

1 齕 (xè 世)：牙齿相磨切。

渴欲得水而不能饮，则口燥烦也。

此真寒假也。太阳寒气在经，故令人欲得被覆同火，背强头汗。若误作里有实热，下之去汗，则误下之，必致于哕而恶满小便不利也。下后阳气下陷，故身反有热，自胸中反有结实结聚，妨碍津液，是以口燥烦，误不能饮也。何以见其胸中有邪？以舌上如苔白滑，故言之。治法最奇巧，和其上下寒热之邪，则诸证涣然分解矣。

湿家下之，额上汗出微喘，小便利者，死。若下利不止者，亦死。

此本湿家身烦痛，可与麻黄汤汤发其汗之例，误下之，致有此证。额上汗出微喘者，阳之越也。小便利与不利不止者，阴之脱也。阳阳为决，必死之兆。且此有拒之，虽额上汗出微喘，若大小便不利者，是阳气未脱，而阳之根犹在也。下之虽大小便利，若额上无汗不渴，是阳气不脱，而阴之根犹在也，则生者矣，可以施其苦寒白散之。至于下利不止，故无汗而恶寒，阳气已脱之候亦死。又有下利不止，小便反秘者，汗出者，谓之大，一云：一云：关格不愈，无汗者可治，有汗者死。

问曰：风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值人阴雨不止，医云此可发汗，汗之病不愈者，何也？答曰：发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲汗出者，风湿俱去也。

风湿相搏，法当汗出而解，合用桂枝加术，使微微汗发，表里气和，风湿俱去，正如湿家身烦痛，可与麻黄汤同义。

病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，此名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。

日晡所剧者，阳旺之气并于中内也。一云：一云：“可与麻

“黄杏仁葱豉甘草汤”，麻黄加术汤是主寒湿，防己黄芪汤是主风湿。此则明显风与湿合也，所以此条之后，“金”则补之以“风湿，脉浮，身重，汗出恶风，防己黄芪汤主之”一条。盖风湿皆从阳受，其邪在外，故脉浮，汗出，身重，故是以黄芪实卫，甘草佐之。防己去湿，白术佐之。然治风湿一邪，独无去风之药，以谓多汗风已不留，表主任风邪入于其间，因之恶风，惟实其卫，正气固则风自退也。至“熨背当如虫行皮中，腹下如水，所坐如针，又以一被卷覆下，其令微汗，差”等语，皆有精义，不可忽也。

湿家病，身上疼痛，发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，内药鼻中则愈。

湿家必脉沉，饮食减小，今脉大能食，但头痛鼻塞，且内药，所谓“因于湿，首如戴”是也。以瓜蒂散内鼻中，取下黄水则愈。

已上中湿例

太阳中热者，暍也，其人汗出恶寒，身热而渴也

成注谓“汗出恶风身热不渴者，中风也。汗出恶寒而渴者，中暍也”。然未明其至理，盖此证为时火之气烁其卫气，肺伤则卫气虚，于是汗出，身热也。要，则“内”字，谓驱邪，皆相火伤肺之所致。今“以白朮加人参汤按之”为主也。

太阳中暍者，发热恶寒，身重而疼痛，其脉弦细芤迟，小使已，洒洒然毛耸，手足逆冷，小有劳，身即热，口开板齿燥，若发汗则恶寒甚，加温针则发热甚，数下之则淋甚。

发热恶寒，身重而疼，太阳中表证也，表证脉当浮，今不能浮，而反弦芤迟者，谓示元气不足，不能鼓动其津于外，

急弦细者，阳虚也，弦迟者，阳虚也，为阳俱虚，故不独为小便已，洒淅毛耸者，太阳经火气内伏也。手足反冷者，太阳气弱，不阳时大已。口开舌板而烦者，阳明中气之本已，邪注成内伤之病也，一以反上复害其胃则患更甚，盖胃复损其胃则发热甚，下之复伤其胃，与外甚，以夏月阳气在内故也。灵枢所谓“阳邪俱不足，补东则补西，补西则补东，惟宜甘药补正以复其热”。东垣所论者谷气也，深得其旨。仲景俱言太阳而不言脾肺者，以热邪炽甚，则寒水必致受困耳。

太阳中暍者，身热疼重，而脉微弱，此以夏月伤冷水，水行皮中所致也。

或注谓“脉虚身热，得之伤暑”。然脉微者，阳也，身体疼重者，水也。夏月暑热，以水灌洗而致然，一物瓜蒂汤主之。观仲景论中，惟出二证，岂偶然哉！举其概，称为后世准绳。一者明其病中表热，一者言其表里俱寒，此则外邪郁时火而成中暍。若是邪郁时火，此大司推其因，始有不可引言，如取凉风者，感露者，食生冷者，素有积热者，阴血素虚不胜大热者，宿邪感动者，处习湿地者，凡是之类，皆是以郁其时火为中暑之病，或轻或重，或表或里，或虚或实，随证发见。若论其治邪退热，较量权衡，岂一言而尽哉！

按：仲景论暍三条，首言动而得之之病，谓中暍属外因。次言静而得之之病，虽曰中暍，实暑病也，属内因。末言因热伤冷之病，乃中暍之变证，属不内外因，不得以三者混称也。

已上中暍例、

病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气

I 感动：受外界事物的影响而引起反应。

上冲咽喉不得息者，此为胸中有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。诸亡血虚家不可与瓜蒂散。

此证内实，身虽有大汗，加以发热恶寒，全似中风，但人不语，逆而不顺，此非外入之风邪，乃内蕴之寒邪壅聚胸中，可用瓜蒂散之药力，合小汗之利水，舌反之散邪，以快胸膈上之实积，一汗一利，所谓“其高者，因而越之”也。诸亡血虚家禁用者，盖血有复用则，则气亦去，虚家而复用吐，是谓其同，所以为禁也。

病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。

手足厥冷，与厥阴之证深热深相似。其脉乍紧，盖有司不紧，脉不似实。可见邪结在胸中，随气上下，故厥时紧时安，而烦满不能食也。

此条旧在“厥阴”，而辨不可吐下。复有一条云“病人手足厥冷，脉乍结，以客气在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当吐之”，与此无异。但此云脉乍紧，按云脉乍当紧而反当坚，结则反欲吐者之脉，皆属邪气散证，不必为有也。然此手足厥冷，亦非亡阳证，与少阴证何别？

病胸上诸实，胸中郁郁而痛，不能食，欲使人按之，而反有涎唾，下利日十余行，其脉反迟，寸口脉微滑，此可吐之，吐之利则止。

病不得食，按之反有涎唾者，知有积实存胸中也。下利脉迟，寸口微滑者，为膈上实，故吐之，则利自止也。

合三条总见痰证可吐不可下，合食积、痰饮、胸气四证论

之，勿指为类伤寒，但指为不可发汗，因其理甚精。盖食积已是胸中阳气不布，更发汗则阳外越，一阳同气同事，愈成危候。虚烦则胃中津液已竭，更发汗则津液尽亡矣。脾气即地气之是，邪从足先受，正湿家不可发汗之义耳。

已上痰证例

问曰：人病有宿食，何以别之？师曰：寸口脉浮而大，按之反涩，尺中亦微而涩，故知有宿食，当下之，宜大承气汤。

寸口即气口，《灵枢·经脉》对代人迎而言也。气口脉浮取之大，有按之反涩，尺中亦微而涩，此以胃中客气受病，故以气口脉当浮大，而不能沉实，重按反涩也。尺中亦微而涩，以其腐秽已归大肠，肺与大肠为表里，故其脉亦微而涩也。所谓亦微而涩，亦字从十贯下，言于大司农之略记，非谓弱无力之谓。见浮大中按之略涩，方可用大承气下之。设他见微涩，按之不实，乃属胃气虚耳，论食伤胃之候，又当从枳实芍药散中消导之药矣，岂复为大承气证乎？

此条下，金匮有“脉数而滑者，实也，此有宿食，下之愈，宜大承气汤”。数为在府，滑则流利如珠，此为实也。盖宿食在府，有诸中，形之外也。

下利，不欲食者，以有宿食故也，当下之，与大承气汤。不欲食，非不能食，乃伤食恶食之明征也。

下利，脉反滑，当有所去，下之乃愈，宜大承气汤。

下利恐为泻利及肠胃虚冷，滑脱不止，今脉见滑实，知为热邪内聚，当有所去，不可止遏，宜与大承气攻其实热，腐秽去而利自止耳。

下利三部脉皆平，按之心下硬者，急下之，宜大承气汤。

下利，三部脉皆平，其人元气本强也，且按之心下硬者，

为食滞中宫无疑。

下利，脉迟而滑者，内实也，利未欲止当下之，宜大承气汤。

脉迟为阳明结聚之候，迟而不滑，为尚未化结，不可攻也。今迟而滑实，是白利，下利下之，下后里气行通，则脉迟不滑，亦不迟耳。

病腹中满痛者，此为实也，当下之，宜大承气汤。

腹中满而不痛者，为气结。满而不实者，为虚气。此既满且痛，为实结无疑，急须下之。

宿食在上脘者，当吐之。

宿食本不当吐，以其人素多痰饮，致宿食于上脘，故宜用吐法，其高者，因而越之也。

此条“全”字，多宜下，故同字，其书又有“脉紧，转索无常者，有宿食也”，“脉紧，头痛，有风，腹中有宿食不化也”一条，皆但言宿食，而不言下之者，以其根于内因之脉证，则当从外因例治矣。

下利差后，至其年月日复发者，以病不尽也，当下之。

此条世本尚有“宜大承气汤下之”句，文已，故去之。言未尽之邪，可以潜伏，至年而发，必系真邪，非邪淫可备急丸下，不应大承气寒下也。设属热邪，必无经年久伏之理。

已上宿食例

动气在右，不可发汗，发汗则衄而渴，心苦烦，饮即吐水。

动气者，筑筑然气动也。在右者，气当于脐之右也。发汗则动气，气动则不能护卫其血，故妄行为衄，衄则津液竭，故渴而心中苦烦。若更饮水，伤其肺胃，故饮即吐水也。

动气在左，不可发汗，发汗则头眩，汗不止，筋惕肉瞤。

发汗汗不止，亡阳外虚，故头眩，筋惕肉瞤也。

动气在上，不可发汗，发汗则气上冲，正在心端。

发汗亡阳，则愈损心气，肾乘心虚，欲上凌心，故气上冲，正在心端也。

动气在下，不可发汗，发汗则无汗，心中大烦，骨节苦疼，目运恶寒，食则反吐，谷不得前。

发汗无汗者，肾水不足也。心中大烦者，肾虚不能制心火也。骨节疼，目运恶寒，皆为肾病。王太仆¹云：食入反出，是无火也，当补肾藏真阳为主。

动气在右，不可下，下之则津液内竭，咽燥鼻干，头眩心悸也。

下之伤胃伤脾，津液竭者，津液内竭，咽燥鼻干也。头眩心悸者，水饮伤脾，心主不宁，而烦悸眩晕也。

动气在左，不可下，下之则腹内拘急，食不下，动气更剧，虽有身热，卧则欲蜷。

腹内拘急，食不下，动气更剧，下之损脾，而肝气妄行于脾也。虽有身热，卧则欲蜷者，表热里寒也。

动气在上，不可下，下之则掌握热烦，身重浮冷，热汗自泄，欲得水自灌。

下之则胃热烦，言胃中烦热，言脾胃不健也。身重浮冷，热汗自泄，欲得水自灌，表寒里热也。

动气在下，不可下，下之则腹胀满，卒起头眩，食则下清谷，心下痞也。

按当大忌，下清谷，心下痞，以下之伤脾，肾气则动，肾

1 王太仆：即王冰，唐代医家。

邪凌心也

五：动气本因脾土衰弱，不能制约肾水，水饮凝结而成。虽水乘土位之微邪，而仲景汗下集禁者，以汗下必先动脾之津液，故东垣每以验脾之盛衰。凡按之牢若痛者，即动气也。动气本属脾疾，四藏中艾藏之虚，即乘其部而见之，所以误汗则伤阳，阳伤则邪并于气，故吐衄，噎逆，眩暈，气逆上奔。误下则伤阴，阴伤则虚阳无制，故虽受热而躁卧，掌握不细，皆胃气虚寒困惫之候。至于病人素有积聚，连在脐旁，亦曰动气汗下，尤不可犯，通宜理中去术加桂苓为主。以茯苓利水，桂心奔脉，故宜加用，白术滞气，故去之。然久病脾气衰微而无客邪者，生术以附子制用，亦无妨碍，更须参以所见之证为主治，不必拘《活人书》等方药也。

已上动气例

问曰：病有霍乱者何？答曰：吐利而利名霍乱。

霍乱者，一在霍乱，言其挥霍，言其吐利，言其吐位，以致吐逆泄利，甚则转筋厥逆，而为挥霍撩乱也。

问曰：病发热，头痛，身疼，恶寒，吐利者，此谓何病？答曰：此名霍乱，自吐已，又利止，复更发热也。

病发热，头痛，身疼，恶寒，本为外感风寒，内伤生冷，故吐利霍乱，今吐已利止，又复发热，知内邪行而外感未除也。即当从清便自调，后身疼痛，急当救表例治之。

霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不用水者，理中丸主之。

霍乱，头痛，发热，身疼，外感也，加以欲饮水，热邪入里，故用五苓散主之。表证。若不用水者，知里有邪，故用理中丸之。辛以理中散邪，芍药、白术、甘草之甘以扶脾之气，甘得辛则不燥，辛得甘则不厚，辛甘合用，以理脾气之虚湿，五苓利小便，当以里证为急也。

若脐上筑者，肾气动也，去术加桂四两。吐多者，去术，加生姜一两。下多者，还用术。悸者，加茯苓二两。渴欲得水者，加术，足前成四两半。腹中痛者，加人参，足前成四两半。寒者，加干姜，足前成四两半。腹满者，去术加附子一枚。服汤后如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

脐筑，可也，筑者，肾气动也，以术抑之，不利下气，故去之。吐多，以有气也，不利从权用术以此止之，与邪争力也。下多气已泄，去有气也，在术不计也。与悸者但去茯苓，仍不去术，以术为利水，与气无碍，记不得也。可有利水生津之效，故不去也。渴欲得水之知本，用干姜，生姜，干姜，去术加桂，去茯苓，皆大药也。若大畏药者，去术加苓，干姜用有术不用也。盖人身有力者，畏药力，以邪邪内而内当邪，邪邪内而内当邪，非靠附子之甘之力，何以散其邪邪之邪乎。腹中痛者，与力与邪无碍。其在人身本邪反主，则用小剂邪邪和以邪分邪邪，记在人身者，不忌补其邪邪之气，何以任其邪邪之冲激耶？

在气力弱也，禁绝谷气，记之则胃气不复，此言最多也。如食顷，大抵是一升许，是言服汤中邪人法，非言在气力言也。

吐利止而身重不体者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。

吐利止而身重不体，邪邪未解也。当消息和解其外，言当消息邪之微甚，制邪邪之大小也。盖吐下邪邪，虽复止不妨桂枝汤以和其营卫也。

吐利发汗，脉平小烦者，以新虚不胜谷气故也。

在气吐利，降时内不可便与饮食，以胃气逆反故也。却愈

脉平小弱者，凡当节慎饮食，以仓卒未固，不可使晋米谷耳。

已上霍乱例

大病差后劳复者，枳实栀子豉汤主之。若有宿食者，加大黄如博棋子大五六枚。

劳复乃起居作劳，复生余热之谓，乃男作女劳复，女作男劳复者，言其伤寒而因女男之大故，多死少生，已有反用下法之理。凡用下法，下后身热，或汗出不止，皆以九针，用本汤之苦以吐散其邪，此非用汗法也，与枳实栀子豉汤同，以发其邪汗，而微动于皮热，主身自凉。夫言吐汗，以言发之之义。若有宿食在胃，当加大黄下夺之，不可相延，与热证不去，真可谓利矣。凡方中用青浆米七升，一名黍调升，然入为同者，全取其浆之液而用下，不至干调升，所以又云芡实，微汗，精义入神。

伤寒差已后更发热者，小柴胡汤主之。脉浮者以汗解之，脉沉实者以下解之。

凡伤寒更发热，乃余邪在胃，以热证未已。夫余热未当，其邪在，不可下之。然言以汗解之，邪在上表在里，也仍用小柴胡汤和解之。夫邪在表，尚得用汗法。邪在里，尚仍用下法，即方上条言用枳实栀子豉汤主之，下用枳实栀子豉汤加大黄微下之。

大病差后，从腰已下有水气者，牡蛎泽泻散主之。

腰以下有水气者，水渍为肿也。《金匮》曰：腰以下肿，当

分煎：诸药各各之所，此喻指脾胃。

利小便。此亦法矣。一云大渴而饮水不解，不能饮水，以致水气泛溢，用枳实芍药散散之，何反不解其渴耶。盖因水势未犯身中已解，已解其水，而余邪未去。设用轻剂，则水必渗入阳分，驱之尤及矣。

大病差后，喜唾，久不了了者，胃上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。

身中津液因胃中寒气凝滞而成痰涎，久而不清，其人必喜唾涎，故不用汤药荡涤，而用丸药温之也。理中丸乃驱分阳之药，虽补脾胃之虚药，然脾胃大虚外邪已尽才用其力，在大邪未去之日，不得已合桂枝汤用之，即更其名曰桂枝人参汤。《金匮》于麻黄汤同名之曰人参汤，于此见其立方命名之义矣。

伤寒差后体虚，每有遗热，故禁温补，即间有索隐皮黄及中气寒者，止宜理中丸调理，未尝轻用桂、附也。

伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。

身中津液，为热邪所耗，余热不清，必致虚气少气，难于康复。若更气逆欲吐，是余热复挟津液上扰，故用竹叶石膏汤以益气清热，散逆气也。

按：此汤即人参白虎去知母而益半夏、麦冬、竹叶也。病后虚烦少气，为余热未尽，故加麦冬、竹叶于人参、甘草之甘温益气药中，以清热生津。加半夏者，痰饮上逆欲呕故也。病后余热与伏气发温不同，故不用知母以伐少阴也。

病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。

病后食谷微烦，谓之食郁，故食自饱，以脾胃气尚虚，不能

1 索泽：皮肤枯涩无华

引谷也。即有余热未去，以静养以俟其自平，不令明证也。即不待已用功，但平决处方，不使与方证气别耳。即如草木为患，必须时以散时，时其生发，若恣以辛温，则立危矣。至于毒有在表者，又须受利急攻，利不尽，邪未去与人，不救矣。

伤寒阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裯散主之。

阴阳易之病，注家不明言，乃以男子为男易，女子为女易，人言若此，则知人言非也，与男子交，为男易，与女子交，为女易，伤寒之人，热毒戕于气血中者，宜从表里解散，惟热毒戕于精血之中者，无由发泄，故男子与不病之体交接，男病传不病之女，女病传不病之男，所以名为阴阳易，即文易之义也。其证眼中生花，身重拘急，少腹里引拘挛，只受阴毒，又非桂枝汤热药能解，故烧裯散为散，以其人平昔所生之散随同气相求。服之小便得利，阴头微肿，阴毒仍从阴窍出耳。

已上差后诸复阴阳易

1 周痹：衰败枯萎。

2 交接：行房事；性交。

脉法篇

问曰：脉有阴阳者，何谓也？答曰：凡脉大浮数动滑，此名阳也。脉沉涩弱弦微，此名阴也。凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死。

按：弦为少阳脉，此以弦为阴脉者，兼见沉涩微弱而言。阴病见阳脉者生，阳气内复，阴邪外出，欲汗而解也。如欲阴中风，脉浮为欲愈，不浮为未愈是也。阳病见阴脉者死，外显阳证，内伏阴邪，正衰邪胜也，如谵言妄语，脉沉细者死是也。

又按：微为欲阴脉，而传经热邪，亦尺寸俱微，岂热邪至极，而冰反微耶？殊不知伤寒之邪传至欲阴，正气虽已大伤，而邪气亦以向衰，所以不数实而反微也。

问曰：脉有阳结阴结者，何以别之？答曰：其脉浮而数，能食，不大便者，此为实，名曰阳结也，期十七日当剧。其脉沉而迟，不能食，身体重，大便反硬，名曰阴结也，期十四日当剧。

于数，言脉也，阳结不大便，当不能食，今反能食，是阳气结而阴不和也。至十七日传少阴水，水不升火，故当剧。沉迟，言脉也，阴结当不能食，今反大便硬，是阴气结而阳不得和也。至十四日传阳明土，土不胜水，故当剧。

问曰：病有洒洒恶寒，而复发热者何？答曰：阴脉不足，阳往从之。阳脉不足，阴往乘之。曰：何谓阳不足？答曰：假令寸口脉微，名曰阳不足，阴气上入阳中，则洒洒恶寒也。曰：何谓阴不足？答曰：假令尺脉弱，名曰阴不足，阳气下陷入阴中，则发热也。

洒洒恶寒，言复发热，脉寸微尺弱者，言其阴从之也。以阳发热，阴脉必数盛也。此言复之理，内为邪拒多此。

阳脉浮阴脉弱者，则血虚，血虚则筋急也。

言寸口浮大，而尺内迟弱也，与太阳中风、阳浮阴弱，同脉异证。彼言风邪伤卫，营弱卫强，此言营血本虚，故其证目区别。然尺中迟弱者，汗下俱禁，究竟本虚也。

其脉沉者，营气微也。其脉浮而汗出如流珠者，卫气衰也。脉离离如车盖者，名曰阳结也。脉累累如循长竿者，名曰阴结也。脉瞤瞤如羹上肥者，阳气微也。脉紫紫如蜘蛛丝者，阳气衰也。脉绵绵如泻漆之绝者，亡其血也。

阳结离离如车盖，以谷部大而言。阴结累累如循长竿，体则指下弦而强直。阳微瞤瞤如羹上肥，仿佛膏而无方。阳衰紫紫如蜘蛛丝，色似沉细而色。亡血绵绵如泻漆之绝，指下内大后细之状，皆历历如绘。

此阳结阴结，是言脉法，与前论病证不同，不可牵合。

脉来缓，时一止复来者，名曰结。脉来数，时一止复来者，名曰促。脉阳盛则促，阴盛则结，此皆病脉。脉按之来缓，而时一止复来者，名曰结。又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结阴也。脉来动而中止，不能自还，因而复动，名曰代阴也，得此脉者，必难治。

结促是有留滞于中，故脉也止歇，力能自还。代脉是阳气衰微，不能自还，代与死之已死。此色言有心停脉代者，寒饮停蓄故也。

问曰：翕奄沉，名曰滑，何谓也？师曰：沉为纯阴，翕为正阳，阴阳和合，故令脉滑。关尺自平，阳明脉微沉，饮食自可，少阴脉微滑，滑者，紧之浮名也，此为阴实，其人必股内汗出，阴下湿也。

翕，浮也，奄，忽也，言忽为而浮，忽为而沉，故为滑也。

滑本阳实，阴部见阳脉，为阳邪乘阴，故股内汗出。

阴阳相搏，名曰动。阳动则汗出，阴动则发热，形冷恶寒者，此三焦伤也。若数脉见于关上，上下无头尾，如豆大，厥厥动摇者，名曰动也。

按：脉之动者，皆缘阴阳不和，故不能贯通三部。阳虚者受邪则动，所以动于寸口为阳动，阳动则汗出，动于尺内为阴动，阴动则发热。如不汗出发热，而反形冷恶寒，此三焦真火受伤也。盖动脉虽多见于关上，然尺寸亦常见之。本又又言若数脉见于关上，皆字甚活，是举一隅为例耳。今世以尺寸之动，强饰为滑，殊不知动脉是阴阳相搏，虚者引动，故单见一部滑脉。是邪实有余，多见二三部，或两手俱滑。以此辨之，则动滑之虚实判然矣。

阳脉浮大而濡，阴脉浮大而濡，阳脉与阴脉同等者，名曰缓也。

脉浮大而濡，按之仍不饱者为缓，若按之即无，是虚脉，非缓脉也。

脉浮而紧者，名曰弦也。弦者，状如弓弦，按之不移也。脉紧者，如转索无常也。

浮紧而数者，少阴脉也。若沉紧而弦，即里证其阴脉分。

脉浮而数，浮为风，数为虚，风为热，虚为寒，风虚相搏，则洒淅恶寒也。

脉浮而数，为中风发热之候，卫气发热，营本与卫气，是以偶出也。卫气，卫气为卫，营为营，卫气以当用卫气散邪，不可竟行表散也。

脉浮而滑，浮为阳，滑为实，阳实相搏，其脉数疾，卫气失度，浮滑之脉，数疾发热，汗出不解者，此为难治。

寸口为表实，寸口涩而迟，寸口弦而紧，皆表里气热故，较重发汗之过矣，所以未发汗而身痒也。迟者，迟者亦受病，是知邪已入府，表里俱热，故难治也。

脉浮而迟，面热赤而战惕者，六七日当汗出而解，反发热者差迟，迟为无阳，不能作汗，其身必痒也。

脉浮而迟，为表气不能外行于一分，故身痒也，不能作汗而差迟，致汗湿留于肌表，而身痒作疮也。

加持脉，病人欠者，无病也。脉之呻者，病也。言迟者，风也。摇头言者，里痛也。行迟者，表强也。坐而伏者，短气也。坐而下一脚者，腰痛也。里实护腹如怀卵物者，心痛也。

师曰：呼吸者，脉之头也。初持脉，来疾去迟，此出疾入迟，名曰内虚外实也。初持脉，来迟去疾，此出迟入疾，名曰内实外虚也。

初持脉，来疾去迟，言自尺出至于寸口，为心肺盛而肝肾虚。此出疾入迟，言自筋骨出于皮肤，以脉盛于表，故曰内虚外实。初持脉，来迟去疾，言自寸口下于尺内，为心肺虚而肝肾盛。此出迟入疾，言自皮肤入于筋骨，以脉盛于内，故曰内实外虚。

假令脉来微去大，病在里也。脉来头小本大，病在表也。上微头小者则汗出，下微本大者则为关格不通，不得尿。头无汗者可治，有汗者死。

脉来微去大者，言寸取微，尺取大，为病在里也。脉来头小本大者，言脉初来小，取之渐大，为病在表也。上微头小者，言浮取之微，而沉小大，为表气不足有自汗也。下微本大者，言沉取之微，而按久益大，为里邪拒遏而关格不

1 閼(bì必)：窄塞不通。

也。头无汗者，乃邪入膀胱，阳气未脱，犹可治也。盖伤寒暴病，非杂证津液久虚之比。

假令下利，寸口关上尺中悉不见脉，然尺中时一小见，脉再举头者，肾气也。若见损脉来至，为难治。

三部俱伏，而尺中时见小动，脉一至，此为胃中伏阳已。若寸口略见一小一至，尺中毫不至者，为损脉，见之必难治也。

问曰：曾为人所难，紧脉从何而来？师曰：假令亡汗若吐，以肺里寒，故令脉紧也。假令咳者，坐饮冷水，故令脉紧也。假令下利，以胃中虚冷，故令脉紧也。

紧脉主为寒，寒邪在表则浮紧，在里则沉紧，此言寸下尺脉紧，为三阳受病，若更兼咳及利，又为水饮内伏之候，当以辛温散水为务也。

寸口脉浮为在表，沉为在里，数为在府，迟为在藏。假令脉迟，此为在藏也。

此以浮沉迟数定表里藏府，而合于迟为在藏句，故重申以明之。设脉见浮迟，虽有表证，只宜小建中和之，终非麻黄、青龙所宜，以藏气本虚故也。

凡言寸口，就一部而言，自经中以寸口、人迎分别藏、府也。

问曰：何以知乘府？何以知乘藏？师曰：诸阳浮数为乘府，诸阴迟涩为乘藏也。

寸口脉弱而迟，弱者卫气微，迟者营中寒，营为血，血寒则发热，卫为气，气微者心内饥，饥而虚满不能食也。

寸口脉弱，为真阳气微，则肾中阴火挟痰饮而聚于膈上，故心悬悬¹⁾若饥状，有所满不能食也。至于寸口迟为营中寒，

1) 悬悬：没有着落；空空。

营为血之本，血虚而反发热，其义何居？盖寸口脉迟，其邪必陷于阴分，尺中紧盛更不待言，所以为发热也。

寸口脉弱而缓，弱者阳气不足，缓者胃气有余，噫而吞酸，食卒不下，气填于膈上也。

地而吞之，是与中气大扶反欲上逆，非虚火升逆之为不足以镇之。此言暴病，与老人之胃虚痰逆噎气不同。

寸口脉微而涩，微者，卫气不行，涩者，营气不足，营卫不能相将，二焦无所仰，身体痹不仁，营气不足则烦疼，口难言，卫气虚则恶寒数欠，三焦不归其部。上焦不归者，噫而酢吞，中焦不归者，不能消谷引食，下焦不归者，则遗溺。一、二、三焦同。

其因等耳不行，无二能制，故气不归其部。土焦不归，则物不能传化，故土与物在中焦不行，则不能腐熟水谷。下焦不归，则不能约制溲便也。

寸口脉微而涩，微者，卫气衰，涩者，营气不足。卫气衰，面色黄，营气不足，面色青。营为根，卫为叶，营卫俱微，则根叶枯槁，而寒栗咳逆，唾腥吐涎沫也。

咳逆而手足汗出者，胃毒火炎可知也，加以身重，则卫气不能外护，又可知矣。以脉见于口，故其计悉在上部耳。

少阴脉弱而涩，弱者微烦，涩者厥逆。

气虚则脉弱而烦，血虚则脉涩而厥。

趺阳脉浮而涩，少阴脉如经也，其病在脾，法当下利，何以知之？若脉浮大者，气实血虚也，今趺阳脉浮而涩，故知脾气不足，胃气虚也。以少阴脉弦而浮，才见此为调脉，故称如经也。若反滑而数者，故知当屎脓也。

跌阳脉浮涩，为脾胃不足，故当卜利，此易明也。至少阴

脉弦而浮，有力同和，谓之脉，此必有说也。盖伤寒挟传少阳，同时以少阳脉为标，若见弦脉，则力少而气盛矣。夫谓弦者，少阳生发之气也。浮者，太阳表证之脉也。是谓见少阳，而少阳与太阳并见，不关表里之要，故为周脉。若见滑数，则为邪热内盛，必挟热使脓血也。

① 此言，指当推之气口，少阳当出于尺部，若必候诸手足，在妇人殊为未便，握手不及足之讥所不辞也。

趺阳脉迟而缓，胃气如经也。趺阳脉浮而数，浮则伤胃，数则动脾，此非本病，反误下之所为也。营卫内陷，其数先微，脉反但浮，其人必大便秘，气噎而除，何以言之？本以数脉动脾，其数先微，故知脾气不治，大便秘，气噎而除。今脉反浮，其数改微，邪气独留，心中则饥，邪热不杀谷，潮热发渴，数脉当迟缓，脉因前后度数如法，病者则饥，数脉不时，而生恶疮也。

趺阳胃脉，以迟緩为平胃^①，不当于数。若见于数，知反误下有伤胃动脾也。营卫环转之气，以误下而内陷，其数亦必先改为微，而脾气不治，大便秘，气噎而除，此皆邪客于脾胃致。邪热独留，心下虽饥，复不杀谷，抑且^②潮热发渴，未有愈期，必数脉之先微者，仍迟缓如其经常，始能而清谷也。若数脉从有不改，则邪热未陷于腑，但郁于营卫，主生恶疮而已。

诸脉浮数，当发热而洒渐恶寒，若有痛处，饮食如常者，畜积有脓也。

脉浮数而志^③息，知表邪不散而为热，今饮食如常，为里邪

① 经常：常道；常法。

② 经常：正常。

③ 抑且：同德堂本作“抑或”。清康熙重刻本作“抑言”。

亡去。若有其津，为热，至终。若无其津，必邪留不去，其内与外面发痈脓也。

脉浮而大，浮为风虚，大为气强，风气相搏，必成瘾疹，身体为痒，痒者名泄风，久久为痂癞。

脉浮大，为邪气在表，表邪本当即解，今相持不散，必是汗出泄风之故，当发瘾疹身痒而生疮疥也。

趺阳脉浮而芤，浮者，卫气衰，芤者，营气伤，其身体瘦，肌肉甲错，浮芤相搏，宗气衰微，四属断绝。

身体瘦削，宗气衰微，卫气虚衰，不能荣养与木同知，加以肌肉甲错，皮肤最裂，故为甲错，必时有恶寒将发痈脓之兆也。

趺阳脉滑而紧，滑者胃气实，紧者脾气强，持实击强，痛还自伤，以手把刃，坐作疮也。

此言胃实有厚有实，言为热盛而强，实有相击为患而难，故言以实击强，言当量其虚实，言为高下，实则攻下可也。

趺阳脉大而紧者，当即下利，为难治。

趺阳脉紧，为主邪伤胃，故必下利，下利脉大为邪盛，故难治也。

趺阳脉沉而数，沉为实，数消谷，紧者病难治。

沉数者，热伏于内，故易已。沉紧为重伏于内，故难治也。

趺阳脉微而紧，紧则为寒，微则为虚，微紧相搏，则为短气。

胃中虚寒，则阳气郁伏不伸，故短气。

趺阳脉紧而浮，浮为虚，紧为寒，浮为腹满，紧为绞痛，

D 皱襞(cūnbó 村伯): 皮肤干裂

浮紧相搏，肠鸣而转，转则气动，膈气乃下，少阴脉不出，其阴肿大而虚也。

胃中之水气，因火主动，所以肠鸣转而下也，是脾胃虚寒可知。若少阴脉不至，则下焦虚寒，不能运化水气，必致留结阴分而为阴肿大也。

趺阳脉浮，浮则为虚，浮虚相搏，故令气噎，言胃气虚竭也。脉滑则为哕，此为医咎，责虚取实，守空迫血，脉浮，鼻中燥者，必衄也。

脉滑为多者，胃虚不能散水，水结中焦，是虚火上逆，故为哕也。脉浮必衄者，浮为表邪不散，邪郁上焦，必迫血上行而为衄也。胃气素虚之人，误治辛温发散，易耗阳将欲外出，所以脉浮，鼻燥，皆系责虚取实之故也。此与误发少阴汗者，同科。阳明证，少阴少血，动其有则下血上竭而难治，阳明多血，但酿患未已耳。

寸口脉浮大，而医反下之，此为大逆。浮则无血，大则为寒，寒气相搏，则为肠鸣，医乃不知，而反饮冷水，令大汗出，水得寒气，冷必相搏，其人则噎。

寸口脉浮为表邪，而反下之乃大逆，以其人阳气下陷，故不为痞结，而但肠鸣，即当将差就错，内和其气，而反与之水逆其胃，致水气相搏，自失常法，寸口清气，故令噎也。

胡其章²曰：大则为寒，寒字当作邪字看。

寸口脉微而缓。微者，卫气疏，疏则其肤空，缓者，胃气实，实则谷消而水化也。谷入于胃，脉道乃行，水入于经，其血乃成，营盛则其肤必疏，二焦绝经，名曰血崩。

1. 同科：同等。

2. 胡其章：即胡周鼎。

此言卫虚营盛，气衰而热，一焦之火失其常度，并热于守经之血而妄行，故为崩下不止耳。

寸口诸微亡阳，诸涩亡血，诸弱发热，诸紧为寒，诸乘寒者则为厥，郁冒不仁，以胃无谷气，脾涩不通，口急不能言，战而栗也。

口急不能言，是脾藏血少，不能上通于心气也。

寸口脉微，尺脉紧，其人虚损多汗，知阴常在，绝不见阳也。

阳微阴胜，加之多汗，阳气愈虚也。

少阴脉不至，肾气微，少精血，奔气促迫，上入胸膈，宗气反聚，血结心下，阳气退下，热归阴股，与阴相动，令身不仁，此为尸厥，当刺期门、巨阙。

肾中真阳之气不能统于周身，则阳气上迫于胸膈，以致宗气郁聚，血结心下，阳气因而不伸，陷入至阴之地，周身有阳无阳，遂至不仁自也。当刺期门以下结血，刺巨阙以行宗气，宗气布而阳气自复，厥自退矣。

寸口脉浮而大，浮为虚，大为实，在尺为关，在寸为格，关则不得小便，格则吐逆。

趺阳脉伏而涩，伏则吐逆，水谷不化，涩则食不得入，名曰关格。

上条以脉之虚大倍常为关格，见于尺部为关，见于寸口为格，故知凡言寸口皆统三部而言也。

下条以关部伏涩异常为关格，盖伏为气郁，涩则血实也。上条乃正衰邪实，不治之证，下条是寒邪固结，可治之证，不可不察。

趺阳脉不出，脾不上下，身冷肤硬。

身冷者，胃气不温，肤硬者，营血不濡，以营卫气衰，故趺阳脉不出，脾不上下，竟成藏厥之证也。

寸脉下不至关为阳绝，尺脉上不至关为阴绝，此皆不治。关为阴阳之交界，关上脉绝则阴阳离决，故不治。

寸口脉阴阳俱紧者，法当清邪中于上焦，浊邪中于下焦。阳中于邪，必内栗也，表气微虚，里气不守，故使邪中于阳也。阴中于邪，必发热、头痛、项强、胫挛、腰痛、膝酸，所谓阴中雾露之气，故曰清邪中于上焦。浊邪中下，阴气为栗，足膝逆冷，使溺发也，表气微虚，里气微急，上下焦相混，内外不通，上焦佛郁，藏气相重，口难食饮也。中焦不治，胃气上冲，脾气不转，胃中为浊，营卫不通，血凝不流。若卫气前通者，小便赤黄，与热相搏，因热作使，游行经络，出入藏府，热气所过，则为痈脓。若阴气前通者，阳气厥微，阴无所使，客气内入，逆而出之，声喑咽塞，寒厥相逢，为热所拥，血凝自下，状如豚肝。阴阳俱厥，脾气孤弱，五液注下，下焦不固，清便下重，令使数难，脐筑湫痛，命将难全。

此下五条俱论阴阳错杂之邪。所谓“上下焦相混，内外不通”，为时行疫疔之总诀。白伤邪坏血，温热大同，亦证在有内外合邪者。此条言寸口脉阴阳俱紧者，邪气乘虚初犯中焦，内外受侮，未变为实也。寸脉言阳紧者，清邪雾露之气伤于阳，故曰清邪中于上焦。尺脉沉而紧者，浊邪寒湿之邪伤于阴，故曰浊邪中于下焦。清邪中上，则发热、头痛、项强、胫挛等证，皆是外感表证。浊邪中下，则阴气为栗，言身不战而但心惕惕然与内栗，足膝逆冷等证，皆邪各同经之证。今表气微虚，则

1. 惕惕然：惶恐不安心绪不宁貌。

阳气内入，里气微急，谓阳邪上逆，由是一焦是乱，内外不通矣。郁于上焦，则邪伤不能治也，中焦不治，则不能运行水谷，营卫不通而血凝不流。若邪气内通，则阳气之邪愈散，故小便赤黄，邪热与血经路，则力在散也。设谓气可通者，见阳气微散，不聚卫分，邪气内客于脾，故内主之。以阳气客于脾，故当利则利，言卫气不能生也。泄者，外邪也，利者，内邪也，内外之邪，合而相逐，力热者拒，则口开目下也。谓阳俱攻者，言脾胃之气不相顺接，胃中阳气不行，不能敷布中外，故四肢逆冷，脾中阳气孤弱，不能约束下焦，故力散注下，则便重数，下重而难也。格为生气之害，将筑散也，则生气欲绝，言邪气伤犯中焦，清浊相乱，一焦俱乱，注下而难，治得失时，则变证百出矣。

脉阴阳俱紧者，口中气出，唇口干燥，蜷卧足冷，鼻中涕出，舌上苔滑，勿妄治也。到七日已来，其人微发热，手足温者，此为欲解。若到八日已上，反大发热者，此为难治。设使恶寒者，必欲呕也，腹内痛者，必欲利也。

此脉此证，表里阴阳是看本的，类似之证慎勿妄投药饵，徐而候之。若七日之外，当解之时，微热，手足温，则为邪气解而自愈矣。若到八日已上，当解不解，反大发热，此为逆证，不可治也。然仲景正言难治，非言不治也，故下文言设寸脉浮紧恶寒者，必呕，清阳旁露之邪，溢上焦也。尺脉沉紧而腹痛者，必利，浊阴寒湿之邪走下焦也。邪气既得上下消散，即可从其势而治之矣。

脉阴阳俱紧，至于吐利，其脉独不解，紧去人安，此为欲

1 咤（niè 聂）：咬。

解 若脉迟，至六七日不欲食，此为晚发，水停故也，为未解，食自可者为欲解。

脉阴阳俱紧，内外皆邪，至吐利后邪气已泄，脉紧当去也。若吐利后，紧独不解，反不欲食，此为脾胃气虚，水饮停蓄，为免发变证也。若到七日，脉紧渐退，人安能食，方为欲解。

伤寒，脉阴阳俱紧，恶寒发热，则脉欲厥。厥者，脉初来大，渐渐小，更来渐渐大，是其候也。恶寒甚者，翕翕汗出，喉中痛。热多者，目赤脉多，睛不慧。医复发之，咽中则伤，若复下之，则两目闭。寒多者，便清谷，热多者，便脓血。若熏之，则身发黄，若熨之，则咽燥，若小便利者，可救之，小便难者，为危殆。

脉来厥者，如欲逆之寒热交胜也。初来大者，为邪气鼓动，渐渐小，为正气受伤。更来渐渐大，为邪气复进也。盖缘其人正气本虚，不能主持，随邪气进退，故其脉亦随邪气进退，是以忽大忽小。《伤寒论》云：“不大不小，虽困可治。其有大小者，为难治”是也。恶寒甚者，则发热翕翕汗出，喉中痛，以少阴之脉循喉咙故也。热多者，太阳多也，目赤脉多，睛不慧，以太阳之脉起于目故也。发汗攻阳，则少阴之热因发而上行，故咽中伤。若复下之，则太阳之邪因虚而内陷，故两目闭，阴邪下行为寒多，必便清谷。阳邪下行为热多，必便脓血。熏之则火热伤表，身必发黄。熨之则火邪内逼，必为咽燥。小便利者，津液未竭，犹可救之。小便难者，津液已绝，为危殆也。

伤寒发热，口中勃勃气出，头痛，目黄，衄不可制，贪水者必呕，恶水者厥。若下之，咽中生疮，假令手足温者，必下

重便脓血 头痛目黄者，若下之，则两目闭。贪水者，下之其脉必厥，其声嚶，咽喉塞，若发汗则战栗，阴阳俱虚。恶水者，若下之，则里冷，不嗜食，大便完谷出，若发汗，则口中伤，舌上白苔，燥燥，脉数实，不大便六七日，后必便血，若发汗，则小便自利也。

发热，口中勃勃气出，邪气变热，冲于头上也。头痛目黄，喘不可制者，热郁于肺也。贪水者为无阳，邪气并于上焦，故必中。恶水者为无阴，邪气并于下焦，故必逆也。若下之，里气热结，必喘而厥逆。假令手足不厥，则热邪下行而协热利也。若头痛目黄者，为邪在太阳，下之热气内伏，则目闭也。贪水者，热在上焦，下之伤阳，必脉厥，声嚶，咽喉闭塞，汗之伤阳，则阴阳俱虚而战栗。恶水者，为虚寒，下之则里冷，不食，完谷不化，汗之虚阳上乘，口伤，舌上白苔，燥燥。若目黄，恶水，不大便者，六七日后必便血。若发其汗，则小便当不利，今反自利者，太阳之邪热结于膀胱，而小便偏渗也。便血为同邪，虽有如狂妄言，而不能消耗津液，故小便自利也。

下之其三字，从《玉函经》^① 增入。

脉濡而弱，弱反在关，濡反在巅，弦反在上，微反在下。弦为阳运，微为阴寒，上实下虚，意欲得温，微弦为虚，不可发汗，发汗则寒栗，不能自还。咳者则剧，数吐涎沫，咽中必干，小便不利，心中饥烦，辟时而发，其形似疟，有寒无热，虚而寒栗，咳而发汗，蜷而苦满，腹中复坚。

脉濡而弱，弱反在关，濡反在巅，弦反在上，微反在下。弦为阳运，微为阴寒，上实下虚，意欲得温，微弦为虚，虚者，

① 玉函经：即《金匱玉函经》，东汉张仲景撰。与《伤寒论》同体而

不可下也。微则为咳，咳则吐涎，下之则咳止而利因不休，利不休，则胸中如虫啮，粥入则出，小便不利，两胁拘急，喘息为难，颈背相引，臂则不仁，极寒反汗出，身冷若冰，眼睛不慧，语言不休，而谷气多入，此为除中，口虽欲言，舌不能前。

此一条言尺中微弱者，不可汗下也，观其言欲得汗一语，可以约见为证。上条言寸口微见弦脉白散汗透身证，此为胃气本虚而扶阳法，建寅温补中土。此条安下则胃中阳气愈伤，各邪凝结愈甚，故用珍复土之，遂至绝阳言满，腹中复坚，皆同邪水饮合聚之象也。下条言寸口微见弦脉白散汗透身证，仍为胃气本虚，亦当建理中土，若安下之，下利不止，胃中虚，阳反更伤，为除中，少阴背恶而反冷证，为外证，及口虽欲言，舌不能前当死证法一起，较上条证更甚，以下更甚于汗也。

脉濡而弱，弱反在关，濡反在颧，微反在上，涩反在下。微则阳气不足，涩则无血，阳气反微，中风汗出，而反躁烦，涩则无血，颧而且寒，阳微发汗，躁不得眠。

脉濡而弱，弱反在关，濡反在颧，微反在上，涩反在下。微则阳气不足，涩则无血，阳气反微，中风汗出，而反躁烦，涩则无血，颧而且寒，阳微不可下，下之则心下痞硬。

此二条言尺中脉涩者，不可汗下也。阳微阳涩，气血两亏，而关上脉复弱，胃土亦衰，所以汗下俱禁也。阳微复用阳药发汗，则阳气转伤，必躁不得眠。阳微而用泻药攻下，则阳气内陷，必心下痞硬也。

1 吐：原缺。据文化本补。

2 数(xū 须)：迅速。

脉流而弱，弱反在关，濡反在巅，浮反在上，数反在下。浮为阳虚，数为亡血，浮为虚，数为热，浮为虚，自汗出而恶寒，数为痛，振寒而栗，微弱在关，胸下为急，喘汗而不得呼吸，呼吸之中，病在于肺，振寒相搏，形如疟状，色反下之，故令脉数，发热，狂走见鬼，心下为痞，小便淋沥，小投甚硬，小便则尿血也。

寸口手少阴，而关手厥阴数者，以其人为气本虚，虚则易于二分也。若误下伤血，必致狂走，痞满，尿血耳。

脉濡而紧，濡则阳气微，紧则营中寒。阳微卫中风，发热而恶寒。营紧胃气冷，微呕心内烦。医为有人热，解肌而发汗。亡阳虚烦躁，心下苦痞坚。表里俱虚竭，卒起而头眩。客热在皮肤，怏怏不得眠。不知胃气冷，紧寒在关元。技巧无可施，汲水灌其身。客热应时罢，栗栗而振寒。重被而覆之，汗出而冒瘕。体惕而又振，小便为微难。寒气因水发，清谷不容间。呕逆反肠出，颠倒不得安。手足为微逆，身冷而内烦。迟欲从后救，安可复追还？

此见脉濡而紧者，为阳气微，营中寒。阳微卫中风，外则发热恶寒。营紧胃中冷，内则微呕心烦。医不知其外热内冷，以为大热而从汗发之，则表里俱虚，客热战在皮肤，紧寒采在关元，犹汲水灌其客热，致其汗四出，不可复救也。

脉浮而大，浮为气实，大为血虚，血虚为无阳，孤阳独下阴部者，小便当赤而难，胞中当虚，今反小便利而大汗出，法应卫家当微，今反更实，津液四射，营竭血尽，亡烦而不得眠，血薄肉消，而成暴液，医复以毒药攻其胃，此为重虚，客阳去有期，必下如污泥而死。

脉浮而大，气实血虚，虽偏之为害，亦人所常有也，若此

者，阴部当见不足，今反小便利，大汗出，外小有余，殊非细故。设卫气之实者，因得汗利而脉转微弱，犹是与营无争，庶可安全，若卫分之脉，较前更加坚实，则阳强于外，阴必消亡于内。所谓小便利大汗出者，乃津液四射之证，势必营竭血尽，干烦不眠，血薄肉消，而成暴下亡阳之证。此际安其胃，调其夜，调和阴阳，收拾残阳，岌岌已不及，况复以毒药攻其胃，转增奔迫之势而加重虚之戕，令客阳亦去，下血如污泥而死战！

师曰：病人脉微而涩者，此为医所病也。大发其汗，又数大下之，其人亡血，病当恶寒，后乃发热无休止时。夏月盛热，欲着复衣，冬月盛寒，欲裸其身。所以然者，阳微则恶寒，阴弱则发热，此医发其汗，令阳气微，又大下之，令阴气弱。五月之时，阳气在表，胃中虚冷，以阳气内微，不能胜冷，故欲着复衣。十一月之时，阳气在里，胃中烦热，以阴气内弱，不能胜热，故欲裸其身。又阴脉迟涩，故知亡血也。

王肯堂曰：大发其汗，伤阳也，宜其脉微而恶寒。又数大下之，伤阴也，宜其脉涩而发热。阴阳两伤，则气血俱损，而肯本独言亡血者，何也？曰：下之亡阴不必言，汗亦血类故也。内虚之人，夏月阳气在表，则内无阳也，故不胜其寒。冬月阳气在里，里阴既虚，不能当邪气之均称，故不胜其热。然诸脉弦细而涩，按之无力者，往往恶寒，苦振栗不止，或时发躁，寒热而热，如釜甑中，必得去衣居寒处，或饮寒水，则使如故，其振寒复至，非必遇夏乃寒，遇冬乃热也。此但言其

① 岌岌（jí jí）：危险貌。

② 王肯堂：明代医家，字宇泰，别号损庵。辑《古今医统正脉全书》等书。

③ 甑（zèng 赠）：古代蒸饭的一种瓦器。

例，论其理耳。

立夏得洪大脉，是其本位。其人病身体苦疼重者，须发其汗。若明日身不疼不重者，不须发汗。若汗漉漉自出者，明日便解矣。何以言之？立夏得洪大脉，是其时脉，故使然也，四时仿此。

立夏得洪大脉，是当病之本脉。若其人苦疼重，乃热郁肌表，未得发越之故，须以辛凉苦药散其郁热，乃伏气发汗之主法也。若明日身不疼重，则营卫自和，漉然汗出自解，无藉于药矣。

脉盛身寒，得之伤寒。脉虚身热，得之伤暑。

寒伤形，故脉盛，身寒而后周身发热。暑伤气，故脉虚身热而独背微恶寒。

问曰：病有战而汗出，因得解者，何也？答曰：脉浮而紧，按之反芤，此为本虚，故当战而汗出也。其人本虚，是以发战，以脉浮，故当汗出而解也。

问曰：病有不战而汗出解者，何也？答曰：脉大而浮数，故知不战汗出而解也。若脉浮而数，按之不芤，此人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也。

问曰：病有不战不汗出而解者，何也？答曰：其脉自微，此以曾经发汗，若吐，若下，若亡血，以内无津液，此阴阳自和，必自愈，故不战不汗出而解也。

问曰：伤寒二日，脉浮数而微，病人身凉和者，何也？答曰：此为欲解也。解以夜半，脉浮而解者，漉然汗出也。脉数而解者，必欲食也。脉微而解者，必大汗出也。

上言脉微，故不战汗出而解，此言脉微而解者，必大汗出。二说相左，何耶？然上以曾经吐下亡血，邪正俱衰，不能作汗。

而解，此以未汗下，正气未伤，邪正俱盛，故必大战作汗而解，不相左也。东垣云，战而汗出解者，太阳也。不战有汗而解者，阳明也。不战九下而解者，少阳也。若先汗下，必不尔矣。

问曰：脉病欲知愈未愈者，何以别之？答曰：寸口、关上、尺中二处，大小、浮沉、迟数同等。虽有寒热不解者，此脉阴阳为和平，虽剧当愈。

病六七日，手足三部脉皆至，人烦而口噤不能言，其人躁扰者，必欲解也。

手足三部脉皆至，言三部大小同等也。今人但知六七日欲作战汗，脉伏，不知三部脉皆实，而反设一噤，亦是作汗之兆，故仲景重申此义以明之。

若脉和，其人大烦，目重，眦^①内际黄者，此为欲解也。

大烦，目重，眦内际黄而脉和者，中央之色见于上位，阳热得以外散也。

病人苦发热，身体疼。病人自卧，师到诊其脉，沉而迟者，知其差也。何以知之？表有病者，脉当浮大，今脉反沉迟，故知愈也。

本发热身疼，今热退静卧而脉沉迟，故知邪散，病不传也。设表证误服下药，而脉变沉迟，又为结邪入里之候也。

假令病人云腹内卒痛。病人自坐，师到，脉之浮而大者，知其差也。何以知之？若里有病者，脉当沉而细，今反浮大，故知愈也。

腹中有寒，故拘，所以脉当沉细，今脉变浮大，知阴退阳

① 眦：原作“脸”，据文义改。

复，故为愈也。设卒痛使见浮大，又为脉不应证矣。

师曰：病家人来请，云病人发热烦极。明日师到，病人向壁卧，此热已去也。设令脉不和，处言已愈。

执退身凉有安静，虽脉不和，为邪退未久，故为未平复，不当以脉病人安例之。

问曰：凡病，欲知何时得，何时愈？答曰：假令夜半得病，明日日中愈。日中得病，夜半愈。何以言之？日中得病夜半愈者，以阳得阴则解也。夜半得病明日日中愈者，以阴得阳则解也。

问曰：脉有灾怪，何谓也？师曰：假令人病，脉得太阳，与形证相应，因为作汤，比还送汤，如食顷，病人乃大吐。若下利、腹中痛。师曰：我前来不见此证，今乃变异，是名灾怪。又问曰：何缘作此吐利？答曰：或有旧时服药，今乃发作，故名灾怪耳。

脉浮而洪，身汗如油，喘而不休，水浆不下，形体不仁，乍静乍乱，此为命绝也。又未知何藏先受其灾：若汗出发润，喘不休者，此为肺先绝也。阳反独留，形体如烟熏，直视摇头者，此心绝也。唇吻反青，四肢紧习者，此为肝绝也。环口黧黑，柔汗发黄者，此脾绝也。溲便遗失，狂言，目反直视者，此为肾绝也。

阳反独留，孤阳亢极，阴气先竭也。四肢紧习，振振不宁也。柔汗，冷汗也。

按：五藏绝证，有因贼邪胜克而死者，有本藏之邪亢极而死者，有子气过逆母气告竭而死者，有本藏之气衰绝而死者，有藏府俱绝而

死者，不可一概论也。

又未知何藏阴阳前绝？若阳气前绝，阴气后竭者，其人死，身色必青。阴气前绝，阳气后竭者，其人死，身色必赤，腋下温，心下热也。

伤寒，咳逆上气，其脉散者，死，谓其形损故也。脉阴阳俱盛，大汗出不解者，死。脉阴阳俱虚，热不止者，死。脉至乍疏乍数者，死。脉至如转索者，其日死。谵言妄语，身微热，脉浮大，手足温者，生。逆冷，脉沉细者，不过一日死矣。

伤寒，咳逆上气，小便利，脉毛者，难治。阳绝之脉曰。阴阳俱盛，大汗出不解，阴阳交也。阴阳俱虚，热不止，津液竭也。乍疏乍数者死，具有大小者为难治也。脉至如转索者，其日死，纯是邪脉，正气不记为主也。谵妄，身微热，而手足温，证脉相应，故主生。谵妄，身大热，而手足冷，证脉相反，故主死也。

伤寒例

《阴阳大论》云：春气温和，夏气暑热，秋气清凉，冬气冷冽，此则四时正气之序也。冬时严寒，万类深藏，君子固密，则不伤于寒。触冒之者，乃名伤寒耳。其伤于四时之气，皆能为病，以伤寒为最者，以其最成杀厉之气也。中而即病者，名曰伤寒，不即病者，寒毒藏于肌肤，至春变为温病，至夏变为热病，热病者，热极重于温也。是以辛苦之人，春夏多温热病，皆由冬时触寒所致，非时行之气也。

寒毒藏于肌肤，至春变为温病，藏于骨髓，至夏变为热病，不言藏于骨髓者，脱简也。

内经云：冬伤于寒，春必温病。又云：逆冬气则少阴不藏，肾气独沉。言冬时宜暖不均，和暖之际，人之腠理不固，忽然严寒骤至，郁闭其不上之气于内，当是之时，少阴之经脉流行于外，是不欲收敛于密，势不得不受其邪。然肾藏之真阳，伏于内，且不受邪，所受邪者，少阴之经耳，故真阳充盛之人，邪气不能为害，即使受邪，气行可已。至是不藏精之人，先逆冬时收敛之气，故邪气得以袭入于脉。言温病，乃至春夏温热之气内动而发为温病也。李明之曰：冬伤于寒，冬行春令也。当冬而温，火胜而水亏矣。水既已亏，则所胜妄行，土有余也，土土合德¹，故为温病。所以不病于冬而病于春者，以其从水居卯²之分，方得其权。大寒之令复行于春，扶阳升泄，

1 阴阳大论：古代医学经典之一，已佚。

2 李明之：即李杲。

3 火土合德：心与脾功能协调。

4 卯：此处指农历二月。

少阴不藏，号寒之方也，辛温之人，阳气固于分，逢水方，因木当发生，阳已外泄，孰力鼓舞？逢水内竭，孰为温补？此两者同焉，生化之源既绝，本何藉以生乎？一身之所存者，热已，时强木长，故为温病。

凡时行者，春时应暖而反大寒，夏时应大热而反大凉，秋时应凉而反大热，冬时应寒而反大温，此非其时而有其气，是以一岁之中，长幼之病多相似者，此则时行之气也。

伤寒是感天时肃杀之气，以寒犯寒，必先伤水。时行是感暑土郁蒸之气，以湿犯湿，必先湿土。阳明为营卫之原，始病则营卫俱病，经络无分，一焦相混，内外不通，所以其病即发而暴，非比伤寒以次传经而入也。盖地为污秽浊恶之总归，平时无所不受，遇当天时不正之候，则平时所受浊恶之气，亦必乘时暴发。或冬月过暖，肃杀之令不行，至春反大寒冷。或盛夏酷热，与秽浊之气交蒸，忽然热极生风，而人汗孔闭拒，毒邪不得发泄而为患，凡则老幼无分，此即时行之气也。

从霜降以后，至春分以前，凡有触冒霜露，体虚中寒即病者，谓之伤寒也。

言非体虚，即有风寒，莫之能害。

其冬有非节之暖，名曰冬温。冬温之毒，与伤寒大异，亦有轻重，为治不同。

冬温者，时当大寒，而反大温，东风时至，则肌表疏松，忽然大热，而衣被反单薄，更郁其邪，其病即发者为冬温，以其所感非时当气，故言与伤寒大异。若不即发，藏于皮肤，则

1 衣袂（mèi 妹）：衣衫。

入伤血脉，至春发为温病；感于经络，则入伤胃气，至夏发为热病矣。

从立冬节候，其中无暴大寒，又不冰雪，而有人壮热为病者，此属春时阳气发于冬时，伏寒变为温病。

春时阳气发于冬时，本至而寒已，伏寒变为温病，言非时不正之温气又为外寒所伏，至春而发为温病也。

从春分以后，至秋分节前，天有暴寒者，皆为时行寒疫也。其病与温及热病相似，但治有殊耳。

此言非时暴寒之证，虽与温热相似，而患委迥殊。以伏气自内发外，必用苦辛内夺，暴寒从外感冒，合用辛甘外解，故治有不同耳。

凡伤于寒，则为病热，热虽盛不死。若两感于寒而病者，必死。

尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发。以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强。

尺寸俱长者，阳明受病也，当二三日发。以其脉挟鼻络于目，故身热，目疼，鼻干，不得卧。

尺寸俱弦者，少阳受病也，当三四日发。以其脉循胁，络于耳，故胸胁痛而耳聋。

此三经受病，未入于府者，可汗而已。

尺寸俱沉细者，太阴受病也，当四五日发。以其脉布胃中，络于嗌，故腹满而嗌干。

尺寸俱沉者，少阴受病也，当五六日发。以其脉贯肾，络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。

尺寸俱微缓者，厥阴受病也，当六七日发。以其脉循阴器，络于肝，故烦满而囊缩。

此三经受病，已入于府者，可下而已。

伤寒经络传变，原不可以日数推论，此六经受病，不过设以为例。粗工不察病机，每以一日当汗，六七日当下，误人多矣。设伏气发后之一四日，可汗之乎？病传厥阴之六七日，可下之乎？若此可不辨哉？

凡云尺寸，则关在其中，可不言而喻。

若两感于寒者，一日太阳受之，即与少阴俱病，则头痛，口干，烦满而渴。二日阳明受之，即与太阴俱病，则腹满，身热，不饮食，谵语。三日少阳受之，即与厥阴俱病，则耳聋，囊缩而厥，水浆不入，不知人者六日死。若三阴三阳五藏六腑皆受病，则营卫不行，藏府不通而死矣。

其得病阴阳两证俱见，其传经亦两经俱传，则邪气亦满充斥，法当二日死，然必水浆不入，不知人者，方为营卫不行，藏府不通，更越三日，而阳明之经始绝也。

其不两感于寒，更不传经，不加异气者，至七日，太阳病衰，头痛少愈。八日，阳明病衰，身热少歇。九日，少阳病衰，耳聋微闻。十日，太阴病衰，腹减如故，则思饮食。十一日，少阴病衰，渴止，舌干已而润。十二日，厥阴病衰，囊纵，少腹微下，大气皆去，病人精神爽慧也。

更不传经，不加异气，则邪气传尽，正气将复，愈日可期。外亦立法大意，不可拘执也。至若更加异气，乃病中之病，莫可限于时日矣。

若过十三日以上不间，尺寸陷者，大危。

言尺寸之脉三陷，为正气衰微，莫能载邪外出，过经其病不间，诚为危候也。

若更感异气，变为他病者，当根据坏证例治之。

若脉阴阳俱盛，重感于寒，变为温疟。

阳脉浮滑，阴脉濡弱，更遇于风，变为风温。

阳脉洪数，阴脉实大，更感温热，变为温毒，温毒为病最重也。

阳脉濡弱，阴脉弦紧，更遇温气，变为温疫。

此以冬伤于寒，发为温病，脉之变证，方治如说。

言脉证皆变为热，不得复用了温发表，方治如说也。

凡伤寒之病，多从风寒得之，始表中风寒，入里则不消散，未有温覆当，而不消散者，不在证治。

拟欲攻之，犹当先解表，乃可下之。

若表已解而内不消，非大满，犹生寒热，则病不除，大满大实，坚有燥屎，自可除下之，虽四五日不能为祸也。

言非大满大实而下之，则犹生寒热交作，必待大满大实，坚有燥屎者，方可下之。虽迟至四五日，不能为害也。

若不宜下而使攻之，内虚热入，协热遂利，烦躁诸变，不可胜数，轻者困笃，重者必死矣。

太阳盛则汗，汗之则死，阳明虚则下，下之则愈，少阳虚则汗，汗之则死，下之则愈。

阳乘阴位，则为阳盛则虚，故可下而不可汗。阴乘阳位，则为阴盛则实，故可汗而不可下，即表里不和，里实表和之谓也。盖表实里虚的邪入有，汗之则死，下之则愈。里实表虚，而邪郁于经，下之则死，汗之则愈。

大如是，则神丹安可以误发？甘遂何可以妄攻？虚盛之治，相背千里，吉凶之机，应若影响，岂容易哉？况桂枝下咽，阳盛则毙，承气入胃，阴盛以亡，死生之要，在乎须臾，视身之尽，不暇计日。此阴阳虚实之交错，其候至微，发汗吐下之相

反，其祸至速，而医术浅狭，懵然不知病源，为治乃误，使病者殒歿，自谓其分全，仁者鉴此，岂不痛欤！

桂枝下咽，阳盛则死，阳气入胃，胃盛以汗，以假言汗下，关系非细，不过借此为例，非误用二汤，必致不救也。

凡两感病俱作，治有先后，发表攻里，本是不同，而执迷妄意者，乃云神丹、甘遂，合而饮之，且解其表，又除其里，言巧似是，其理实违。夫智者之举措也，常审以慎，愚者之动作也，必果而速，安危之变，岂可诡哉？

两感皆是热邪，然治有先后，发表攻里，本是不同，持说甚正，亦甚明，何奉议误认为救里耶？

凡发汗，温服汤药，其方虽言日三服，若病剧不解，当促其间，可半日中尽三服。若与病相阻，即使有所觉，如服一剂，病证犹在，故当复作本汤服之。至有不肯汗出，服二剂乃解。若汗不出者，死病也。

凡得时气病，至五六日而渴欲饮水，饮不能多，不当与也，何者？以胃中热尚少，不能消之，使更与人作病也。

至七八日，大渴，欲饮水者，犹当依证与之，与之常令不足，勿极意也。

若饮而腹满，小便不利，若喘若啰，不可与之，忽然大汗出，是为自愈也。

凡得病，反能饮水，此为欲愈之病，其不晓病者，但闻病饮水自愈，小渴者乃强与饮之，因成其祸，不可复数。

上四条皆是春夏温热之事，故言时气病，乃可与水，非冬月正伤寒可比例也。

凡得病，嗽脉动数，服汤药更迟，脉浮大减¹小，初躁后静，此皆愈证也。

嗽脉动数，犹言其脉动数，不可连上句读

1 减：原误作“咸”。据文化本、同德堂本诸本改

正 方¹

一百十三道。诸方之义，本条庄内已经疏明者，此不复赘

桂枝汤

桂枝三两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切
大枣十二枚，擘

上五味，㕮咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服。凡一服已愈，更勿服。若一升余，以酒助药力，再服令一时汗，身虽禁禁似有汗者皆佳，不可令如水淋漓，则必不除。若一服汗出后，与后服，不必更剂。若不出，更依前法。又不汗，再服小促夜复其剂，半日许令一服尽。若乃汗者，再一服，周时观之。一剂尽，病犹在者，更自服。若汗不出者，乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

此方专主卫受风邪之证。以其一伤不犯外固此证，所以用桂枝之辛发其邪，即用芍药之酸助其卫。然一散一收，又须甘草以和其卫，况发汗必赖辛甘以行阳，故复以生姜佐桂枝，大枣佐甘草也。在方中芍药不主于白，圣惠²与节庵俱用赤，孙尚³与叔微俱用白，然亦自补药不同，但景岳与发热证同，此方营弱卫强。营虽不受邪，卫气近于也，故卫主则营弱，是知必用白芍药也。若既弱而不能自汗，已可以赤芍药写之乎？虽然，不可以一律论也，如太阳误下而传太阴，因有腹满时痛，

1 正方：指张仲景《伤寒论》中的药方。因刻版断坏，或所据版本不同，诸版本所载多有出入，若底本无误，不出注。

2 圣惠：《太平圣惠方》，宋代官修方书。

3 孙尚：宋代医家，撰《传家秘宝方》等书。

则当倍白芍补营卫之虚。若夫大实者必加大黄，又白芍药以泻实已。至于阳热素盛之人，与夫当客邪感寒之初，身虽恶热者，用桂枝汤，即当加黄芩以泻热，与白芍药以泻实，贵在当用活法也。

按：桂枝入心，血药也，而仲景用以治风伤卫之证。麻黄走肺，气药也，而仲景用以治寒伤营之证。皆气病用血药，血病用气药，故许学士有脉浮而缓风伤营，浮紧兼涩寒伤卫之误。殊不知风伤卫则卫受邪，卫受邪则不能内护于营，故营气不固而自汗，必以桂枝血药透达营卫，又须芍药护营固表，营卫和而自汗愈矣。寒伤营则营受邪，营受邪则不能外通于卫，故气郁而无汗，必以麻黄气药开腠透理，又须桂枝实营散邪，汗大泄而邪热散矣。

小建中汤

桂枝二两 芍药六两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 胶饴一斤

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。

按：桂枝汤方中芍药、桂枝等分，用芍药佐桂枝以治卫气。小建中方中加倍芍药，用桂枝佐芍药以治营气，更加胶饴以缓其脾，故名之曰建中，则其功用大有不同耳。

桂枝加葛根汤

桂枝二两 芍药二两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 葛根四两

上六味，以水一斗，先煮葛根减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。

桂枝加桂汤

桂枝五两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，若一服汗出病差，停后服。

此证发汗，是提胃阳，惊动心气，心气因原而虚，则脉动悸气，变为奔豚，此奔豚所以致也，次与桂枝加桂汤以补奔豚之气，所加之桂当用肉桂为是。

桂枝加芍药汤

桂枝三两 芍药六两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升

桂枝加大黄汤

桂枝三两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 大黄一两

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

桂枝加厚朴杏仁汤

桂枝三两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 厚朴二两，炙 杏仁五十个，去皮尖

上七味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升，若一服汗出病差，停后服。

太阳病以下，微喘，脉促，宜用此汤。若阳明病以下，微喘，胸膈不快者，又属小陷胸证矣。

新加汤

桂枝三两 芍药四两，酒洗 甘草二两，炙 生姜四两，切 大枣十二枚，擘 人参三两

上六味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升。此因发汗后津液深伤，非真阳素亏之证，故宜和营芍药中，加入人参以助津气也。

桂枝去桂加茯苓白术汤

芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 茯苓二两 白术二两

上六味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，若小便利则愈

桂枝去芍药汤

桂枝三两 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚，擘

上四味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升

桂枝去芍药加附子汤

桂枝三两 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 附子一枚，炮去皮，破八片

上五味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升，若一服恶寒止，停后服。

桂枝加附子汤

桂枝三两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 附子一枚，炮去皮，破八片

上六味，以水七升，微火煮取一升，去滓，适寒温服一升，若一服汗止，停后服。

桂枝甘草汤

桂枝四两 甘草二两，炙

上二味，以水三升，煮取一升，去滓顿服。

救逆汤

桂枝三两 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 蜀漆三两，洗去腥 白龙骨四两，熬，水飞 牡蛎五两，熬

上为末，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤

桂枝一两 甘草二两 龙骨二两，熬，水飞 牡蛎二两，熬

上为末，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

桂枝麻黄各半汤

桂枝一两十六铢¹ 芍药酒洗 甘草炙 生姜切，各一两 大枣四枚，擘 麻黄一两，去节 杏仁二十四个，汤浸，去皮尖及两仁者

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合

桂枝二麻黄一汤

桂枝一两十六铢 芍药一两六铢，酒洗 甘草一两二铢，炙 生姜一两六铢，切 大枣五枚，擘 麻黄十六铢，去节 杏仁十六个，去皮尖

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再服

桂枝二越婢一汤

桂枝 芍药酒洗 甘草炙，各十八铢 生姜一两二铢 大枣四枚，擘 麻黄十八铢，去节 石膏二十四铢，碎，绵裹

上七味，咬咀，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，

去滓，温服一升。

此汤与各方主治皆同矣，方亦相同，但彼以不行小汗而面热身有，故减小桂枝汤之制而加麻黄 杏仁，此以胃热无津而不完作汗，故减小大青龙之制而杏仁加石膏，以杏仁下气走表，非无津者所宜，石膏辛凉化热，正胃热者所喜尔

1 铢：古代重量单位，二十四铢等于旧制一两

当归四逆汤

当归二两 桂枝三两 芍药三两，酒洗 细辛二两 甘草二两，炙 通草二两 大枣二十五枚，擘

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

当归四逆加吴茱萸生姜汤

当归二两 桂枝三两 芍药三两，酒洗 细辛二两 甘草二两，炙 通草二两 大枣二十五枚，擘 吴茱萸二升，去闭者，泡 生姜半斤，切

上九味，以水六升，清酒六升，和煮，取五升，去滓，温分五服。

茯苓桂枝白术甘草汤

茯苓四两 桂枝三两 白术二两 甘草二两，炙

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

茯苓桂枝甘草大枣汤

茯苓半斤 桂枝四两 甘草二两，炙 大枣十五枚，擘

上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓取五升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服

作甘澜水法：取水一斗，置大盆中，以勺扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之

斗，广余邪，扶北方邪水为思，故取桂枝芍药中之以和营，白术故申之以利水，作甘澜水者，取其流利，不助肾邪也

茯苓甘草汤

桂枝二两 茯苓二两 甘草一两，炙 生姜三两，切

上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

炙甘草汤一名复脉汤

甘草四两，炙 桂枝三两 人参二两 生地黄一斤 麦门冬

半升，去心。麻子仁半升，研。阿胶二两。生姜三两，切。大枣十二枚，擘。

上九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶烊¹消尽，温服一升，日三服。

麻黄汤

麻黄二两，去节。桂枝三两。甘草一两，炙。杏仁七十个，泡去皮尖。

上四味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取一升半，去滓，分服八合，覆取微似汗，不可复发，余如桂枝法将息。

夫卫伤营，则营泄发汗，是营节疏泄，卫气，有反表固闭之理，无汗而恶寒。营泄发汗于内，是无卫气拒于外之理，所以卫气最发汗，必兼桂枝以和营。用杏仁者，所以散气除满。用甘草者，所以助阳和卫，营卫流行，始能作汗也。

按：时珍云：仲景治伤寒，无汗用麻黄，有汗用桂枝。历代名臣未有究其精微者。夫津液为汗，汗即血也，在营即为血，在卫即为汗。寒伤营，营血不能外通于卫，卫气固闭，故无汗发热而憎寒。风伤卫，卫气不能内护于营，营气不固，故有汗发热恶风。是麻黄汤虽太阳发汗重剂，实为发散肺经火郁之药。桂枝汤虽太阳解肌轻剂，实为理脾救肺之药也。又汪石山²云辛甘发散为阳，仲景发表药中必用甘草以载住邪气，不使陷入阴分也。若邪既入里，则内膈胀³，必无复用甘草之理，试观五苓、抵当、承气、大柴、陷胸、十枣辈，并不用甘草也。惟调胃、桃核二汤，以其尚兼太阳部分之表邪，故不得不

1 烊(yáng 阳)：溶化。

2 汪石山：即汪机。明代医家，字省之，号石山。撰《汪石山医书八种》等书。

3 膈(chēn 嗔)胀：指胸膈或上腹部胀满不适。

用也。当知发汗药中之甘草必不可少，此汤紧脉证全在于表，方可用之。若脉微弱自汗者，不可用也。今人但执一二日在表，并宜发汗。设尺中弦数，虚大，为阳虚多火，汗之则亢阳热厥而死，尺中迟弱，足冷，为阳虚夹阴，汗之则亡阳，逆逆而死，可不慎欤？

大青龙汤

麻黄六两，去节。桂枝一两。甘草二两，炙。杏仁四十个，去皮尖。生姜三两，切。大枣十二枚，擘。石膏如鸡子大，碎。

上七味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取一升，去滓，分服二升。取微汗，汗多者，以粉粉之。服后服热汤，多饮热汤，温风，汗出不得歇也。

或问：北方言冰霜紧，发寒甚重，身疼痛，不出汗而身躁，并不见中风之脉证，何以麻黄汤证？但伤寒言中风二字，乃云本之风气似隐，标之阳化反显，移风而内感者谓之寒。殊不知其实为风多阳少之证。设本不隐标显，则治后必求其本，何反倍用麻黄耶？

按《内台方》云：此一证，全在不汗出三字藏机。若风伤卫，则自汗恶风，而伤营，则无汗而身躁。此云不汗，言身躁，明其证略有二证，不能悉言，故生疑议，于此可见其具有风证，而脉无浮紧，是风见新脉，加以恶寒身疼，知其重于风，故于麻桂汤中，除去芍药，倍麻黄而加石膏。设不汗为急之，津令外泄，则风扶卫而内攻，鼓动卫相之火，则周身皆为火化矣，所以不得不信用麻黄也。其去芍药而加石膏者，以其卫既不能透出，亦无借于护营，热既郁于心包，与烦躁不可同乎此，则不但大青龙之法可解，大青龙之方可施，其麻黄杏

1. 疏钞金铉（bì必）：疑指《仲景伤寒论疏钞金铉》，又名《伤寒金铉疏钞》。明代医家卢之颐撰。

仁甘草石膏汤、越婢汤、桂枝二越婢一汤、麻黄升麻汤等，可随证取用而无窒碍也。

小青龙汤有加减法，见《太阳上篇》本条下。

麻黄三两，去节 桂枝三两 芍药三两，酒洗 甘草二两，炙 五味子半升 干姜三两 细辛二两 半夏半升，姜制

上八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

葛根汤

葛根四两 麻黄三两，去节 桂枝二两 芍药二两，酒洗 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上七味，咬咀，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去沫，内诸药，煮取一升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

葛根加半夏汤

葛根四两 麻黄三两，去节，汤泡去黄汁，焙干 桂枝 芍药酒洗 甘草炙，各二两 半夏半升，洗 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上八味，以水一斗，先煮葛根、麻黄，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。

麻黄杏仁甘草石膏汤

麻黄四两，去节 杏仁五十个，去皮尖 甘草二两，炙 石膏半斤，碎，绵裹

上四味，以水七升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

麻黄连翘赤小豆汤

麻黄二两，去节 连翘二两，即连翘根 赤小豆一升，即细赤豆 杏仁四十个，去皮尖 甘草二两，炙 生梓白皮一升 生姜二两，切

大枣十二枚，擘

已上八味，以净水一斗，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服，半日服尽。

伤寒，瘀热在里，身必发黄者，因其人素有湿热，汗出不尽，则肌肤之里为瘀热所凝，而身发黄，故宜此汤，以取微汗也。麻黄发散表邪，杏仁、生姜辛散走表，连翘泻经络之积火，梓皮除肌肉之湿热，小便利水利水，甘草、大枣补脾和胃。盖土厚可以御水湿之害，观《金匮》治黄疸用麻黄加术汤，其义可见。

此方为汗后表邪未解，而湿热发黄，脉浮者取汗而设。内无湿者为表邪已散，而小便不利，身黄脉沉者分利而设。无汗身黄者为表里皆热，脉来软大，不可汗下者自设。若大汗后渴而小便不利，热结津液，身目皆黄者，又当取用五苓加茵陈，以利水为务也。

麻黄升麻汤

麻黄二两半，去节 升麻一两一分 当归一两一分 知母 黄芩 萎蕤各十八铢 天门冬去心 芍药 干姜 白术 茯苓 甘草炙 桂枝 石膏碎绵裹，各六铢

上十二味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取一升，去滓，分温二服，相去如炊二斗米顷，令尽，汗出愈。

麻黄附子细辛汤

麻黄二两，去节 细辛一两 附子一枚，炮去皮，破八片

上三味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，内药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

麻黄附子甘草汤

麻黄二两，去节 甘草二两，炙 附子一枚，炮去皮

上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

小柴胡汤 加减法见《少阳篇》本条下

柴胡半斤 黄芩 人参 甘草各三两 半夏半升，洗 生姜二两，切 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服

大柴胡汤

柴胡半斤 黄芩一两 芍药三两 半夏半升，洗 枳实四枚，炙 大黄二两 生姜五两，切 大枣十二枚，擘

上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服。

此药治少阳之邪，若入阳明之证，或误下引邪内犯，自过经不解之证，故于小柴胡方中，去人参、甘草，助阳益阴之味，自加芍药、枳实、大黄之元药，以涤除热滞也，与桂枝加大黄汤同义。彼以桂枝、甘草加大黄，两解太阳误下之邪，此以柴胡、芩、芍加大黄，两解少阳误下之邪，固不移易之定法也。

柴胡桂枝汤

柴胡四两 桂枝 人参 黄芩 芍药各一两半 甘草一两，炙 半夏二合半 生姜一两半，切 大枣六枚，擘

上九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

柴胡桂枝干姜汤

柴胡半斤 桂枝三两 干姜二两 栝蒌根四两 黄芩三两 甘草二两，炙 牡蛎二两，熬

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，

温服一升，日三服

柴胡加芒硝汤

柴胡半斤 黄芩 人参 甘草各二两 半夏半升，洗 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 芒硝六两

上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，内芒硝，再煎取三升，温服一升，不解更服

柴胡加龙骨牡蛎汤

柴胡四两 半夏二合，洗 大黄二两 桂枝 人参 茯苓 生姜切 龙骨熬 牡蛎熬，各一两半 铅丹一两，水飞 大枣六枚，擘

上十一味，以水八升，煮取四升，内大黄，切如棋子大，更煮一二沸，去滓，温服一升。

此方治少阳邪犯本之证，又于本方中除去甘草、黄芩，有在之味，有加大黄行阴，以下夺其邪，兼茯苓以分利小便，龙牡、牡蛎、铅丹以镇其阳之怯，桂枝以通阳解之，与麻黄汤同义。故以桂枝、龙牡、牡蛎、铅丹连大黄为大汗之建阳，此以少阳证龙牡、牡蛎、铅丹治少阳证下之证，亦不易之定法也

四逆散有加减法，见《少阴下篇》本条下

枳实炙 枳实破，水渍，炙干 柴胡 芍药

上四味，各十分，捣筛，白饮和服方寸匕，日三服。

调胃承气汤

大黄四两，清酒浸 甘草二两，炙 芒硝半升

上三味，咬咀，以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝，更上火，微煮令沸，少少温服之。

承气者，用以泄亢极之气，使之承气而下也。——《伤寒秘要》^①曰：王海藏^②论云，仲景承气汤有大小调胃之殊，今人以一承气，不分上下缓急用之，已不失仲景本意。大热大实，用大承气；小热小实，用小承气；大热而在胃中，用调胃承气，以甘草安其下，使司徒胃热也。若以大用小，则邪气不伏，以小用大，则更伤正气。若在上而用急下之剂，则上热不除，岂可一概而治哉！节庵论小承气^③曰：一焦受病，去芒硝，恐伤下焦，有分之真也。论调胃承气^④曰：邪在中焦，不用枳实、厚朴，以伤上焦虚无欲散之元气，然此汤独可用芒硝以伤下焦乎。古本用承气汤有主上焦者，本谓调胃承气之证，全上焦而燥也。仲景调胃承气汤证，八方中并无上燥，不过曰胃气不和，曰胃实、曰腹满，盖知此汤专主表邪悉罢，初入胃而欲结之证也。故仲景以调胃承气收入大承气篇。调胃承气以酒浸，是太阳邪同去表未远，其势在上，不当攻下，故宜缓制以调和之。及至阳明阳明，则苦酒急下之一曰大承气汤。大承气汤以酒洗，是流轻于下，微升其走下之性以和其中。至于少阳阳明，则去正阳而逼太阴，其分在下，故用小承气，大黄不用酒制也。

大承气汤

大黄四两，酒洗。厚朴半斤，去皮，炙。枳实五枚，炙。芒硝三合。上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，煮取二升，去滓，内芒硝，更上火微一沸，分再服，得下，余勿服。

① 《伤寒秘要》：书名，二卷。明代董炫纂定，胡正心参补。

② 王海藏：即王好古。元代医家，字进之，号海藏。撰《阴证略例》等书。

③ 氤氲（yīnyūn 因晕）：雾气、烟云弥漫的样子。

小承气汤

大黄四两 厚朴二两，去皮，炙 枳实三枚，炙

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤当更衣，不尔者尽饮之，若更衣者，勿服之。

桃核承气汤

桃仁五十个，去皮尖 桂枝二两 甘草二两，炙 大黄四两，酒浸 芒硝二两

上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸，温服五合，日三服，当微利。

抵当汤

水蛭三十个，猪脂熬黑 虻虫三十个，熬，去翅足 大黄三两，酒浸 桃仁二十个，去皮尖

上四味，为末，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下再服。

抵当丸

水蛭二十个，猪脂熬黑 虻虫二十五个，熬，去足翅 大黄三两 桃仁二十个，去皮尖

上四味，杵，分为四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，晡时当下血，若不下者，更服。

茵陈蒿汤

茵陈蒿六两 栀子十四枚，擘 大黄二两

上三味，以水一斗，先煮茵陈减六升，内二味，煮取一升，去滓，分温三服。

麻仁丸

麻子仁二升，蒸，晒，去壳 芍药半斤 枳实半斤，炙 大黄一斤，去皮 厚朴一斤，去皮，炙 杏仁一斤，去皮尖，熬，别作脂

上六味，为末，炼蜜为丸，桐子大，饮服十丸，日三服渐加，以利为度。

此治虚寒下利之人，复感下利，因乃虚寒之法。方中用麻、杏仁以润肠燥，芍药以养阴血，枳实、大黄以泻实热，厚朴以破客气，然此药皆非燥热者，用之方为合宜，后世以此药治老人中枯血虚之病，但取一时之便利，不知愈伤其真气，得不速其咎耶？

蜜煎导方

蜜七合，一味，内铜器中，微火煎之，稍凝如饴状，搅之，勿令焦着，欲作丸，用手捻作挺，令头锐大如指，长二寸许，当热时急作，冷则硬，以纳谷道中，以手扞抵，欲大便时乃去之。

猪胆汁方

大猪胆一枚，泻胆汁，和醋少许，以灌谷道中，如一食顷，当大便秘出。

大陷胸汤

大黄六两，去皮 芒硝一升 甘遂一钱

上三味，以水六升，先煮大黄，取二升，去滓，内芒硝，煮一两沸，内甘遂末，温服一升，得快利，止后服。

大陷胸丸

大黄半斤 芒硝半升 葶苈半升，熬 杏仁半升，去皮尖，熬黑

上四味，捣筛为末，内杏仁、芒硝，合研如脂，和散，取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕，白蜜六合水二升，煮取一升，当顿服之，一宿乃下，如不下，更服，取下为效，禁如药法。

小陷胸汤

黄连一两 半夏半升，洗 栝蒌实大者一个

上三味，以水六升，先煮栝蒌，取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

十枣汤

芫花熬 甘遂 大戟 大枣十枚，擘

上上三味，等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末，分三次服，得快下利后，糜粥自养。

大黄黄连泻心汤

大黄二两 黄连一两

上二味，以麻黄汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。
帛汤者，言滚沸如麻也。

附子泻心汤

大黄二两 黄连 黄芩各一两 附子一枚，炮去皮，破，别煮取汁
 上四味，切二味，以麻黄汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。

生姜泻心汤

甘草三两，炙 人参三两 干姜一两 半夏半升，洗 黄芩三两
 黄连一两 生姜四两，切 大枣十二枚，擘

上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

甘草泻心汤

甘草四两 干姜三两 半夏半升，洗 黄芩三两 黄连一两
 大枣十二枚，擘

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

半夏泻心汤

半夏半升，洗 干姜 甘草炙 人参 黄芩各三两 黄连一两 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

按：泻心汤诸方，皆治中风汗下后，表解里未和之证。其生姜、甘草、半夏三泻心，是治痰湿结聚之痞，方中用半夏、生姜以涤痰次，黄芩、黄连以除湿热，人参、甘草以助胃气，干姜炮黑以渗水湿。若但用苦寒治热，则拒格不入，必得辛热力之向导，是以干姜、半夏在所必需。若痞极硬满，暂去人参，气壅上升，生姜勿用，痞而不硬，仍用人参。此一方出入而有三治也。其大黄、附子二泻心，乃治阴阳偏胜之痞，一以大黄、黄连涤胸中素有之湿热，一加附子散温经中虚脱之虚寒也。用沸汤渍绞者，取寒药之性，不经火而力减也，其附又必煎汁，取寒热各行其性耳。仲景立法之妙，无出乎此。以大黄、芩、连，涤除胃中之邪热，即以附子温散凝结之阴寒，一举而寒热交结之邪尽解，詎知后人目睹其方而心眩也。

黄连汤

黄连 甘草炙 干姜 桂枝各三两 人参二两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服一升，日三夜二服。

葛根黄芩黄连汤

葛根半斤 黄芩二两 黄连一两 甘草二两，炙

上四味，以水八升，先煮葛根，减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服

厚朴生姜甘草半夏人参汤

厚朴半斤，去皮，炙 生姜半斤，切 甘草二两，炙 半夏半升，

洗 人参 两

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

干姜黄连黄芩人参汤

干姜 黄连 黄芩 人参各二两

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分温再服

吴茱萸汤

吴茱萸一升，洗 人参三两 生姜六两，切 大枣十二枚，擘

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服

旋覆代赭石汤

旋覆花三两 代赭石一两，煅 人参二两 甘草三两，炙
半夏半斤，洗 生姜五两，切 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服

方中用代赭领人参、甘草下行，以镇胃中之逆气，固已奇矣。又用旋覆花、半夏、生姜、大枣，上之灵药，以平胃气，以作此法承领上下，何能转否为泰于反掌耶？

赤石脂禹余粮汤

赤石脂一两，碎 禹余粮一斤，碎

已上二味，以水六升，煮取二升，去滓，三服

桃花汤

赤石脂一斤，一半全用，一半筛末 干姜一两 粳米一升

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，内赤石脂末方寸匕，日三服。若一服愈，余勿服

石脂之涩，以固下焦滑脱，必稍加干姜、粳米，以理中气。之与一服而愈也，故曰桃花汤也。本、经、论、方、论、要、之、言、以、有、此、之、方、方、中、用、在、此、中、方、为、分、也、故、可、又、已、知、有、方、寸、匕、

取清以三升而已，其大者主禁煎一便，清水与火同均，不能
灭火，火绝火气全，故下利更甚也。所以用干姜从治之法，犹
白通汤之用人尿、猪胆，彼假其寒，此假其热耳。

四逆汤

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生，去皮，破八片

上三味，㕮咀，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再
服，强人可大附子一枚，干姜三两。

此名通阳，四肢沉，恶寒，手足逆冷之证，故取附子之生
者，以行其阳，外散肌表，以散其寒。干姜亦同生者，以内
温厥阴。甘草独用炙者，以外温营卫，内补中焦也。其云强人
可大附子一枚，干姜三两者，可知平素之人，附子不必全用已
泥宋以前人，不善裁培，重半两者即少，大者枝是难得，所以
仲景有一方中用二枚者，非若后世用药之多至一两外已
然非中所产，亦一两者亦不易得，近世用二钱一剂，即与仲
景时二三枚分三剂相等耳。

此汤与麻黄附子细辛汤之用麻黄，发散经络之寒邪，熟附
以补少阴之真阳，干姜发透丹田之阳气，似异而实大同，盖彼
以麻黄治表邪，附子温里者，同辛也其同治之邪，此以附子治
表邪，干姜温里者，甘草和其胃中之气。盖真阳生于附子配干
姜，补中有发，熟附配麻黄，发中有补是也。

四逆加人参汤

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生，去皮，破八片 人参
一两

上四味，㕮咀，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温

1 西附：同德堂本作“西川”

2 耐真：赵耐真，元末医家，撰《活人释疑》，佚

再服

茯苓四逆汤

茯苓六两 人参一两 甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，破八片

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

通脉四逆汤有加减法，见《少阴上篇》本条下

甘草二两，炙 干姜三两，强人可四两 附子大者一枚，去皮，

生用

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服

通脉四逆加猪胆汁汤

甘草二两，炙 附子大者一枚，生，去皮，破八片 干姜三两

猪胆汁半合

上四味，以水三升，先煮三物，取一升二合，去滓，入胆汁，分温再服

白通汤

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

白通加猪胆汁汤

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片 人尿五合

猪胆汁一合

已上三味，以水三升，煮取一升，去滓，内胆汁、人尿，和令相得，分温再服。

附子汤

附子二枚，去皮，破八片，生 人参二两 白术四两 茯苓三两

芍药三两，酒洗

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

或问：附子汤与真武汤，只互换一味，何真武汤主行水收阴，附子汤主回阳暖补耶？盖真武汤内生姜佐决附，不过取辛热之势，以走散肾中之水饮。附子汤中人参助生附，纯用其温补之力，以恢复衰散之真阳，且附子汤中附、术皆倍于真武，其分两亦自不同，所以主治各异，岂可以比例而观乎。

真武汤有加减法，见《少阴上篇》本条下

茯苓三两 芍药三两，酒洗 白术二两 附子一枚，炮去皮，破八片 生姜三两，切

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服

干姜附子汤

干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

桂枝附子汤

桂枝四两 附子三枚，炮去皮，破八片 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

白术附子汤^①

白术四两 附子三枚，炮去皮，破八片 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

甘草附子汤

甘草三两，炙 附子二枚，炮去皮，破 白术二两 桂枝四两

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三次。初服得微汗则解，能食。汗出复烦者，服五合，恐一升多者，

① 白术附子汤：出自《金匮要略》，但与此处分量不同

宜服六七合为妙。

风伤卫气，湿流关节，风湿相搏，邪乱经中，故主周身骨节诸痛。风胜则卫气不固，汗出短气，恶风，不欲去衣。湿胜则水气不行，小便不利，或身微肿，故用附子除湿温经，桂枝祛风和营，白术去湿实卫，甘草辅诸药，而成敛散之功也。

芍药甘草附子汤

芍药二两 甘草三两，炙 附子一枚，炮去皮，破八片

上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

理中丸及汤有加减法，见《杂篇》霍乱本条下。

人参 白术 甘草炙 干姜各三两

上四味，捣筛为末，蜜和丸，如鸡子黄大，以沸汤数合和丸，倒碎，温服之，日三四夜一服。腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法：以四物依两数切，用水八升，煮取一升，去滓，温服一升，日三服。

桂枝人参汤

桂枝四两 人参三两 白术三两 甘草四两，炙 干姜三两

上五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮，取三升，温服一升，日再夜一服。

甘草干姜汤

甘草四两，炙 干姜二两，炮

上二味，以水一升，煮取一升五合，去滓，分温再服。此即四逆汤去附子也。辛甘合用，专复胃中之阳气。其大食夹阴，而手足冷，发热喘咳，反满便骨，外内含邪，难于发散，或寒药伤胃，合用理中，不便参、术者，并宜服之。真胃虚扶寒之圣剂也。若大脉沉畏冷，虽吐自利，虽无厥逆，仍属四逆汤证矣。

乌梅丸

乌梅三百个 黄连一斤 黄蘗六两 干姜十两 附子六枚，炮
蜀椒四两，熬去汗 桂枝六两 细辛六两 人参六两 当归四两

上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之令烂，当去其核，微火干燥，捣筛成丸，和丸令相得，内口中，与饭相下，丸如梧桐子大。先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

按：乌梅丸主胃气虚而寒热错杂之邪积于胸中，所以蛔不安而时时上攻，故仍用寒热错杂之味治之。方中乌梅之酸以开胃，蜀椒之辛以泄滞，连、蘗之苦以降气。盖蛔闻酸则定，见辛则伏，遇苦则下也。其他参、归以补中气之虚寒，姜、附以温胸中之寒饮。若无饮则不呕逆，蛔亦不上矣。辛、桂以祛陷内之热邪，若无热邪，虽有臭饮，亦不致于呕逆。若不呕逆，则胃气总虚，亦不致于蛔厥矣。

五苓散

猪苓十八铢 泽泻一两六铢 茯苓十八铢 桂半两 白术十八铢
上五味，为末，以白饮和服方寸匕，日三服。

此乃解表里之药，故云覆取微似汗。茯苓、猪苓味淡，所以利水渗饮也。泽泻味淡，所以泄肾止渴也。白术味甘，所以燥脾运湿也。桂枝味辛，所以散邪和营也。欲其治表，必用桂枝。专用利水，则宜芍药，妙用全在于此。若以其辛热而去之，则何能疏肝伐肾，通津利水乎？

此证内外水饮之自利，一全用一治心、支饮故言，用泽泻汤，治以吐思水，用猪苓散。其意取用二，一求成方，总不出是汤也。祖列¹云：五苓散治伤寒湿热病，表里未解，头痛发

1 祖列：书名，四卷。明末清初医家施沛撰。因所收方剂均可溯原追流，有宗有祖可考，故名。

热，白厚附子，以酒煮水，或水入即煮，或小便不利，及汗出表散，以酒煮附子者，宜服之。又中在乱吐利，宜以升散，并治腹人脐下有块者，宜以升散，此水也。诸如此者，或胃水饮停蓄，津液固结，便宜取用，但须增损合宜耳。

猪苓汤

猪苓去皮 茯苓 泽泻 滑石碎 阿胶各一两

上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，内下阿胶烔消，温服七合，日三服。

瓜蒂散

瓜蒂一分，熬黄 赤小豆二分

上二味，各别捣筛为散已，合治之。取一钱匕，以香豉一合，用麻沸汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散，内中饮之。不吐者，少少加得，快吐乃止。

白散

桔梗三分 贝母三分 巴豆一分，去皮心，熬黑，研如脂

上二味，为末，内巴豆，更于臼中杵之，以白饮和服。强人半钱，弱者减之。与在胸中者，在腹中必利。不利，与热粥一杯。利过不止，进冷粥一杯。

梔子豉汤

梔子十四枚，擘 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子涌泉上清热，香豉散胃热恶气，能吐能下，为上下后皆烦不解之圣药。若虚，则加生姜以条饮。少气，则加甘草以缓之。心烦腹胀，则去香豉而加枳、朴，邪在上而不在下也。凡药伤胃，则去香豉而加生姜，涌泄与和安中之意已。

故欲涌虚烦，必先顺志中气，所以病人旧有微渴者，有不可吐之戒。

梔子甘草豉汤

梔子十四枚，擘 香豉四合，绵裹 甘草二两

上三味，以水四升，先煮二物，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子生姜豉汤

梔子十四枚，擘 香豉四合，绵裹 生姜五两，切

上三味，以水四升，先煮二物，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子厚朴汤

梔子十四枚，擘 厚朴四两，姜炙 枳实四枚，炙

已上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子干姜汤

梔子十四枚，擘 干姜二两

上二味，以水一升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子槲皮汤

梔子十五枚，擘 槲皮二两 甘草一两

上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。

此太阳原有寒证，因伤寒发汗，气蒸而变热，故得发出于外，原非表邪发热之谓，故以梔子清肌表之湿热，黄芩去膀胱之湿热，甘草和其中外也。

枳实梔子豉汤

枳实三枚，炙 梔子十四枚，熬黑 豉一升，绵裹

上二味，以清浆水七升，空煮取四升，内枳实、梔子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，分旦内服，覆令微似汗。

黄芩汤

黄芩三两 甘草二两，炙 芍药二两，酒洗 大枣十二枚，擘
上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

黄芩加半夏生姜汤

黄芩三两 甘草二两，炙 芍药二两，酒洗 半夏半升，洗
生姜一两半，一云三两 大枣十二枚，擘
上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

芍药甘草汤

白芍药四两，酒洗 甘草四两，炙
上二味，咬咀，以水三升，煮取一升半，去滓，分温再服之。

此即桂枝汤去桂枝、姜、枣也。甘芍合用，专治营中之虚热。其明证曰：柔，卒夜发热，血虚筋挛，头面赤热，过汗伤阴，发热不止。或误用辛热，耗其营血，不受补益者，并宜用之。真血虚挟热之桂方也。设见脉浮自汗，营卫不和，纵非外感，仍属桂枝汤证矣。

白虎汤

石膏一斤，碎 知母六两 甘草二两 粳米六合
上四味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

谚云：春不服白虎，为泻肺也。盖春主阳气上升，石膏、知母苦寒降下，恐其泻肺之阳而不得生发也。此特指春不可用。

者，恐人误以治阳明之白汗汗为已。至于秋冬感时伤寒，又不可用以伤寒。水二升，散其真气乎。此汤专主热证，中时，在气未定等发者，当时人多，故张隐庵以方部同证列，其于暑里加苍术，湿里加桂枝，一证夏月多见之证，故昔人又有秋分后不可妄用白虎之戒。

白虎加人参汤

石膏一斤，碎 知母六两 甘草一两 粳米六合 人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

竹叶石膏汤

竹叶二把 石膏一斤，碎 半夏半升，洗 人参三两 甘草二两，炙 麦门冬一升，去心 粳米半升

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟汤成，去米，温服一升，日三服。

甘草汤

甘草二两

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，日二服。

桔梗汤

桔梗一两 甘草二两

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

文蛤散

文蛤五两

1) 金水二藏：指肺和肾。

2) 张隐庵：即张志聪，清代医家。字隐庵。撰《黄帝内经素问集注》

上一味，为散，以沸汤和一钱匕服，汤用五合。

猪肤汤

猪肤一斤

上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白芍五合，熬香和相得，温分六服。

猪与豕，同族而异，故取豕少阴之中伏形，与犬豕并豕之偏，作豕为也，乱取皮上一层白膜者为是。若以力行之猪皮外毛根薄肤，则益劣无力，且与熬香之说相符矣。

半夏散及汤

半夏洗去涎水 桂枝 甘草炙，各等分

上三味，各别捣筛已，合治之，白饮和服方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煮七沸，内灰与方寸匕，更煮一沸，下火，令小冷，少少咽之。

苦酒汤

半夏十四枚，洗，为粗末 鸡子一枚，去黄，内上苦酒，著鸡子壳中

上二味，内半夏，著苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之。不差，更作三剂。

黄连阿胶汤

黄连四两 黄芩一两 芍药二两 鸡子黄二枚 阿胶二两

上五味，以水五升，先煮三物，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

此方本治少阴三阳之证，以其证多虚火，乃更直泻，故用芩芍，使见心火不炎，所以更泻之也，用黄芩一两大于芍药，非芍药、芍药、芍药，以芍药利血也。然伤寒六七日

1 升 (xián 咸)：盐；熬。

后，热传少阴，伤其阴血者，亦可取司一与阳同法实用承气汤法，虽虚实补泻悬殊，而祛热救阴之意则一耳。

白头翁汤

白头翁二两 黄连 黄蘗 秦皮各二两

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈更服。

厥阴热利下重，盖欲饮水者，司一与阳同法，故用苦寒之剂治之，不可作阳明而用清剂也，所以用白头翁以升木气之下陷，秦皮以泻肝经之邪热，此二药以干药而治之，热一较少，则便脉自止，桃花汤之用干姜，盖手厥阴也，盖少阴之水气下陷，故为热邪，故可用从治之法，以司一之风气拒敌，木火反被内切，所以不可复用辛温鼓激其势也。

牡蛎泽泻散

牡蛎熬 泽泻 栝蒌根 蜀漆洗去腥 葶苈熬 海藻洗去咸 商陆根熬，各等分

上七味，异捣，下筛为散，更入臼中治之，白饮和服方寸匕，小便利，止后服，日三。

大陷者，谓胃气者，不能利而得水，水停于腹，而反已下利，盖当利其小便，使水有出路，盖无出路，故用牡蛎，泽泻，海藻之咸，入肾而利水，葶苈，商陆之苦，以入肺而泄水，栝蒌根之苦，蜀漆之酸苦，以泄其下而利其已也。

烧裨散

取妇人中脘上逆息之方，烧灰，以水和服方寸匕，日服，小便即利，阴头微肿即愈。妇人取男子中脘上逆息。

① 裨（kūn 昆）：有粉的种子。

古今分两

此方方剂，并按古法，每铢一分四，与分付¹云，升者，即今之一盏也。云铢者，六铢为一分，二十四铢为一两也。云一两者，即今之三钱三分也。又为三服，古方云一两，今每服一钱足矣。云方寸匕者，方一寸大之匙也。云一钱匕者，如钱大之匕也。云一钱者，用钱取一钱许也。云四钱者，如理中、省六²抵当，皆大剂同者化，而和药服之也。云丸者，如乌梅、乌梅，皆用小丸，取达下焦也。

1 分铢（z zhū 姿朱）：旧制，铢为一两的四分之一，铢为一两的二十四分之一。比喻极微小的数量。

2 调：此处本应径直改作“丸”，为了与下文不产生歧义，保持原貌。

校注后记

一、张璐生平考

张璐（1617—1699），字路玉，晚号石岐老人。祖籍昆山（今属苏州府），后移居苏州府长泾县（今江苏苏州）。张璐出身于仕宦之家，其祖父是明代按察使（张璐之弟张汝弼的《医通序》中称为“廉宪”，与清代按察使职责略同），叔父是元禄烈愍公。张璐自幼习儒，兼攻医学，曾参加科举考试。明亡后局势混乱，有节气士人皆不事清，或出于自便，或迫于医林。张璐介伤急苦太湖洞庭山（又称西山或洞庭西山）中十多年，专心钻研医术。至顺治十六年（1659）回到家乡，介伤习医。其有一《张氏医志》且序中曰：“甲申世变，餐以舍医，高堂困苦中，病不择医，医随立请，药之一变，自此同始。当是时也，我哉子也，托迹吴城丈人之故墟，犹有医书、种医之书，稍稍罗习。因循十有餘载，身同抱亲，聊以著书自娱。岁已久，感旧故云，笑中辄得方书一通，因名《上》、《中》、《下》都吻合《难经》。其内正集存古传习诸篇，多有不能穷发其义者，次第以近代名言易之。”此文曲折反映其民族气节。

张氏自少壮至老年行医60余年，躬行不倦，积累了丰富的临床经验，一生著述很多。撰有《伤寒续论》《伤寒绪论》《张氏医通》《千金方衍义》《本经逢原》《诊宗三昧》等书。

二、版本流传考证

（一）《伤寒续论》的版本情况

《伤寒续论》除手刻本外，还刻入《伤寒大成》《张氏

医书七种。《张氏医通》等丛书中，传世版本较多。据《中国中医古籍总目》所载，有以下几种：1.清康熙四年乙巳（1665）刻本；2.清康熙六年丁未（1667）明德堂刻本；3.清康熙六年丁未（1667）刻本；4.清康熙刻本；5.同治辛丑刻本；6.清宣统六年辛酉（1901）刻本；7.日本文化元年甲子（1804）思德堂刻本；8.清光绪二十一年甲午（1894）上海图书集成印书局铅印本；9.清光绪二十五年己亥（1899）浙江书局据日本文化元年刻本重印本；10.清大保堂刻本；11.清雋永堂刻本；12.清同德堂刻本；13.清刻本；14.清抄本；15.民国上海广益书局石印本；16.石印本。

我们依据《中国中医古籍总目》，把单刻本、丛书本的信息全部汇集后，发现除上述另外版本外，目前搜集到的还有：清康熙六年丁未（1667）刻本雋永堂藏本、清康熙六年丁未（1667）明德堂刻本、清康熙六年丁未（1667）奎同书业堂刻本、清康熙七年明德堂刻本（1668）、清康熙刻本、清康熙重刻本、日本享和二年壬戌（1802）刻本、日本文化元年甲子（1804）思德堂刻本亦西斋藏本、清文德堂刻本、清文德堂刻本、清裕德堂刻本、清同德堂刻本、日本京都书肆根据思德堂刻本重印本、日本据清康熙刻本重印本、清光绪二十一年丁未（1907）上海书局石印本、民国上海广益书局石印本、民国十四年（1925）上海铅印书局石印本等，共计30多个版本。

（二）《伤寒续论》版本梳理分析

1. 《伤寒续论》的成书形式及最早版本

《伤寒续论》一书的成书形式有单刻本、丛书本之分。

单刻本：根据《中国中医古籍总目》，最早的单刻版本应是康熙四年刻本，但又有康熙四年乙巳（1665）本、康熙六年丁未

(1667) 刻本之分，经考证是同一版本。

丛书本：有《伤寒大成》《张氏医通》《张氏医书七种》三种。

《伤寒大成》中的《伤寒舌鉴》是张璐的儿子张登1668年写成，其中《诊宗三昧》是张璐于1689年写成的。《张氏医通》刊于1695年。《张氏医书七种》刊于1699年。

从成书时间看，几种丛书本的成书时间都晚于康熙六年，从内容、版式看，较有可能最初《伤寒舌鉴》以单刻本问世，后世把“《伤寒舌鉴》”与张登、张仲的书合刻为丛书本。而丛书本中的《伤寒舌论》多数使用清康熙六年丁未刻本，所以在各馆藏目录中，丛书本往往与《伤寒舌论》书名混同，故也称为清康熙六年本。

今分析四个序的时间、内容，参照《序》述、咨询专家意见，最终认定清康熙六年丁未（1667）刻本为最早版本，故作为本次校注所用的底本。

2. 康熙六年刻本及康熙刻本的梳理

康熙六年丁未（1667）刻本，前已叙述，不再赘言。

清康熙七年明德堂刻本（1668）收有《伤寒大成》《伤寒舌鉴》《伤寒舌论》和《伤寒诸论》外，还包括张登之子张登的《伤寒舌鉴》、张璐之子张卓的《伤寒集注补义》。据张登《伤寒舌鉴》自序，得书其父《伤寒舌鉴》成于康熙七年，故以此命名。但其中《伤寒舌论》一书版本仍是清康熙六年本。

清康熙六年丁未（1667）全医书中室刻本、清康熙六年丁未（1667）刻本雋永堂藏版、清康熙宝翰楼刻本。存在于《伤寒大成》《张氏医书七种》等丛书中标为康熙六年丁未（1667）

刻本，以及在同治甲辰阮元出书时自九年（1862）刻本与版本在版式、字体等方面与清康熙六年丁未（1667）本并无差别，仍是同一版本。

与乾隆嘉庆年间，有人将康熙刻本与阮元大成书进行了对比，并在序言中称阮元刻本为康熙刻本，于是就有了“与乾隆年间阮元刻本”“清康熙六年丁未（1801）刻本”实则仍为康熙六年丁未（1667）刻本。

同治年间，在考察过程中，发现清康熙六年丁未（1667）明德堂刻本、清康熙六年丁未（1667）同德堂刻本（皮打与明德堂、清同德堂），与大多数清康熙六年丁未（1667）刻本不同，与民本逐一对比，其版式、校勘、字体、每行字数每行字数，均与方方所存，清康熙六年丁未（1667）明德堂刻本、清康熙六年丁未（1667）同德堂刻本其字体、每行字数，每行20字，上在第三行最后两行字是“为丁”，应是与民本不同的另一版本系列，估计其刻应晚于清康熙六年本，但又无法断定其年代，称清康熙六年丁未（1667）本或清康熙元年刻本、清文苑一刻本、清同德堂刻本、清大保堂本、清思德堂本与此相同，故本称其为清康熙六年丁未（1667）同德堂刻本、清康熙六年丁未（1667）明德堂刻本，均称为清××堂刻本。目前搜集到的这类刻本以清同德堂刻本最为清同德堂，故用清同德堂刻本为参校本。

清康熙六年刻本，清同德堂刻本或清康熙六年本，其内容与清同德堂本系列刻本内容多有相同，但其版式、字体、每行字数每行字数均不同，应是与清康熙六年本不同的另一个版本系列。据考证，此书是在康熙六年本的基础上进行重刻，但其内容有所不同，为了与民本清康熙六年本有

所区别，故称为清康熙重刻本，作为参校本。

3. 日本文化元年刻本

从《伤寒论》来看，日本文化元年又指恩记堂藏板本对《伤寒论》重刻，全称为日本文化元年甲子（1804）恩记堂刻本亦即前藏版（简称“文化本”）错误较少，故用此为主校本。

（三）版本考察结论

《伤寒论》一书自古代表本共有九个系列：1. 清康熙六年刻本；2. 清康熙刻本；3. 清同治刻本；4. 日本文化元年甲子（1804）恩记堂刻本与日本藏板；5. 清光绪十年甲午（1894）上海书局石印本与商务印本；6. 清光绪三年丁未（1907）上海书局石印本；7. 清抄本；8. 1925年上海锦章书局石印本；9. 民国上海广益书局石印本等版本。

三、内容与学术影响

张氏论述伤寒理论深入细致，将伤寒之论与个人之方为一体，理理论与实践为一体，切合实用，流传甚广。现将略述其学术思想如下。

（一）《伤寒论》内容

《伤寒论》共二卷，与《伤寒绪论》同刊于1667年。张氏认为历代注释伤寒之书者人数甚多，但多有曲解，故提出：“伤寒书不可以不释，不释则后人莫能传。凡不可以多释，多释则伤寒自易乱。”张氏持此众议，根据自己对伤寒之文的理解，着重对伤寒之文衍字、整理、探讨，使“伤寒之文相得直解，无庸参信曲释，自可豁然开朗。”“伤寒者易学也，不致尔我迭见”。

《伤寒论》一书七卷按六经分注，分太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，保留了一伤寒论原貌。根据《伤寒论》内容，

太阳分上、中、下三篇，阳明分上下两篇，少阳分上下两篇，少阴、太阴、厥阴各自成篇。下卷则论杂病，分段归结陶唐、合为四篇、《热论》、《杂论》、《方论》、《伤寒》诸篇证，各自独立成篇，最后列《伤寒论》一百一十一方于后，全篇分析仲景立方之意。篇尾附古今分例，以免使用者古今度量衡标准失误，影响疗效。贻误病人。

全书元对理论是论方，先叙仲景原文，后附己意注释，条列明通，层次分明，排列有序。尤其具“在经言之义”之附表，且便于读者明《伤寒》，解《续论》。

（二）《伤寒续论》主要学术思想

1. 悟仲景经旨之意，突出六经辨证

宋明以来《伤寒论》，对仲景之《伤寒论》本，不但背离《伤寒论》原意，而且发扬了六经辨证之精华。

《伤寒续论》用方之妙旨，发见于仲景《伤寒论》升行之处。如《伤寒论》“太阳中风”篇，分述伤寒“不得汗反用桂枝汤”之义，是因为此证“方证同方”也，以太阴之脉证既未显，而少阴之脉证亦未显，是曰“邪在表”，邪在表者，不能传里，由此悟出历来众人所未发见的“不传之妙理”：“夫伤寒之法，已见在经传里，今传则表里，表邪传里，清身汗气也。其言惟恐不传经，不传经则势弩，虚不能传，邪无从泄也”。

《伤寒续论》用方之良旨，补元于古仲景之意。如在少阴桂枝汤证的使用上，张璐认为真武汤方，用术附，兼茯苓、生姜以温肾水，合少阴之水饮内结，众人皆谓“但知用芍药而微妙之意，则是仲景独特之处”。盖此证虽以少阴本病，而实系水饮内结，所以凌膈，自利，四肢逆冷，自小便反不利也。在微者投术，则小便必清而无禁矣，安有反不利之理哉。则知其大

不但真阳不足，真阴亦已素亏。或阴中伏有阳邪所致，若不用芍药固护其阴，岂能胜附子之雄烈乎？即如附子汤、桂枝加附子汤、芍药甘草附子汤，皆芍药与附子并用，其温经护营之法与保阴回阳不殊。后世用药，能获仲景心法者几人哉？”

三是根据自己的临床经验加以补充完善。如阳明病，仲景用土瓜根及大猪胆汁，皆可为导，张璐则补充为“但须分津液枯者用蜜导，热邪盛者用胆导，湿热痰饮固结，姜汁麻油浸栝蒌根导，惟下旁流水者，导之无益，非大小气峻攻不效，以实结在内而不在下也。至于阴结便秘者，宜于蜜导中加姜汁、生附子末，或削陈酱姜导之”。

四是补述了温热病、杂病的辨证论治内容。本书单列温热篇、杂病篇，将《伤寒论》条文集中各篇，分别论述，使温热、杂病的内容，相对突出，利于临证所用。

2. 遵古而不泥古，独抒己见，融会贯通

张璐推崇方有执、喻嘉言的学术见解，《伤寒续论》一书的体例即仿《尚论》而成，赞同错简重订，纠正世人理解之错误。但其学习古人重在理解，重在融会贯通，仔细揣摩古人的真正用意，加以阐发，述以己见。其注虽效仿方有执、喻嘉言，但多贯以己见，并不仍叔和之旧，也未照搬《尚论》把温热条例与伤寒合并，可谓遵前贤而不拘泥。

如伤寒病用白虎汤，张璐认为：“世本作‘表有热，里有寒’，必系传写之误……夫白虎汤本治热病暑病之药，其性大寒，安有里有寒者可服之理？详本文脉浮滑，而滑脉无不实之理，明系伏邪发出于表之征，以其热邪初乘肌表，表气不能胜邪，其外反显假寒，故言‘表有寒’。而伏邪始发未尽，里热犹盛，故言‘里有热’，以其非有燥结实热，乃用白虎解散郁发之

邪。或言当是‘表有热，里有实’，‘寒’字与‘实’字形类，其说近是，若果里有实，则当用承气，又不当用白虎矣。”通过分析，张璐纠正此处错误，认为即使遭到反对，一傅众咻，也要坚持到底，在所不辞。

接着张璐又说道：“此条明言里有热，益见前条之‘表有热，里有寒’为误也。叔和因脉滑而厥，遂以此例混入《厥阴篇》中，今归此。”指出叔和之误，认为此条当在“合病并病”中。

3. 理论与临床相结合，剖析仲景方之义

张璐不仅对伤寒理论颇有研究，对仲景之方也可以说研究深入，书中分析方之名、方之义、方之用，不拘泥成方。

一是根据病情用法用量会有不同。如太阳病服桂枝汤，张璐认为风多寒少之证，服桂枝汤，治风而遗其寒，汗反大出，脉反洪大，似乎风邪再袭，要重用桂枝汤。而《温热病篇》白虎证第七条无“大烦渴”一句，则证治有别，分量稍异，可见仲景对药物分量的把握上，分毫不苟。

对桂枝汤众人所用不同，张璐则能总结归纳，阐明其理：“方中芍药不言赤白，圣惠与节庵俱用赤，孙尚与叔微俱用白，然赤白补泻不同，仲景云病发热汗出，此为营弱卫强。营虽不受邪，终非适平也，故卫强则营弱，是知必用白芍药也。营既弱而不能自固，岂可以赤芍药泻之乎？虽然，不可以一律论也，如太阳误下而传太阴，因而腹满时痛，则当倍白芍补营血之虚。若夫大实者必加大黄，又宜赤芍以泻实也。至于湿热素盛之人，与夫酒客辈感寒之初，身寒恶热者，用桂枝汤，即当加黄芩以胜热，则不宜白芍以助阴，贵在临证活法也。”

二是分析药方之名。如桂枝汤方中芍药、桂枝等分，用芍药

佐桂枝以治卫气；小建中方中加倍芍药，用桂枝佐芍药以治营气，更加胶饴以缓其脾，故名之曰“建中”，则其功用大有不同。

三是剖析用药。如五苓散，张璐认为：“此两解表里之药，故云覆取微汗。茯苓、猪苓味淡，所以渗水涤饮也。泽泻味咸，所以泄肾止渴也。白术味甘，所以燥脾逐湿也。桂枝味辛，所以散邪和营也。欲兼治表，必用桂枝。专用利水，则宜肉桂，妙用全在乎此。若以其辛热而去之，则何能疏肝伐肾，通津利水乎？”

麻黄汤“虽太阳发汗重剂，实为发散肺经火郁之药”。桂枝汤“虽太阳解肌轻剂，实为理脾救肺之药也”。至于仲景发表药中用甘草，当须“脉证全在于表，方可用之。若脉微弱自汗者，不可用也”。但后人不细分证候、脉象，一概用之，则会加重病情，当慎之又慎。

张璐对药方见解独到，不拘成方，多有自己的发明，也为后世医家提供了理论研究及临床实践的思路。

4. 引经据典，博采众长

引经据典、汲取前人精华，这是张璐在诠释仲景原文时的主要特色，文中多处引用《内经》《难经》《玉函经》《金匮要略》《中藏经》《脉经》《甲乙经》等医经中的条文，比比皆是，不胜枚举。

此外，张璐旁征博引，《伤寒缵论》及《伤寒绪论》二书的编写，参考借鉴了50多位医家理论，参考引用书籍达70余种。书中多次引用或评析前代或当世医家对《伤寒论》的解析，如成无己、喻昌、朱肱、张志聪、庞安时、常器之、王日休、吕复、孙兆、郭雍、王焘、张遂辰、李杲、赵以德、许宏、陶华、刘完素、王冰、王肯堂、许叔微等，皆说明张璐渔猎群书，深入钻研，在伤寒研究方面，功底深厚。



责任编辑 伊丽紫
封面设计 古 骥

内容提要

《伤寒续论》为清代医家张璐所撰，刊行于1667年。本书以注解《伤寒论》原文为主，共分两卷。卷上为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经篇，卷下为脏结结胸痞满篇、合病并病篇、温热病篇、杂篇、脉法篇、伤寒例等篇，并载《伤寒论》方一百一十三首，附古今分两。作者将《伤寒论》原文重新编次，删去了汗、吐、下诸篇，将「脉法」「伤寒例」移至书末。采诸家注文，参以个人见解，阐释发挥，补充了前贤之未备。本次整理以康熙六年丁未（1667）初刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-3027-8



9 787513 230278 >

定价：49.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zqzyyobs)



中医出版

(zhongyichuban)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)